
與侵襲性前列腺癌風險呈正相關的暴露因子
膳食攝取研究的統合分析

暴露因子	研究數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
礦物質與微量元素				
鈣	5	98,670	–	1.62 (0.92–2.84)
脂肪酸與脂質				
單元不飽和脂肪（MUFA）	3	144,473	–	1.72 (0.85–3.51)
α–亞麻酸	3	383,989	3,504	1.85 (1.03–3.31)
Omega–3 脂肪酸	3	383,989	3,504	1.85 (1.03–3.31)
多元不飽和脂肪（PUFA）	4	385,026	–	1.97 (1.16–3.35)
飲食模式				
地中海飲食	2	106,146	–	1.02 (0.92–1.13)
其他				
綜合維生素	2	343,481	2,040	1.27 (1.04–1.56)
酒精	4	166,503	–	1.28 (0.73–2.26)
雞蛋	2	869,756	5,123	1.36 (0.87–2.10)
乳製品	3	101,926	744	1.41 (1.14–1.75)
加工肉類攝取量	4	204,990	2,302	1.41 (1.21–1.65)
紅肉	5	129,031	1,575	1.44 (1.13–1.84)



RR > 1 = 與侵襲性前列腺癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: Yes

無已發表的亞型基線風險：採用 HR ≈ RR ≈ OR 近似。不估算缺失的病例總數。