
# 방광암 위험과 양의 관련성을 보인 노출 요인
# 식이 섭취 연구의 메타분석

| 노출 요인 | 추정치 수 | 표본 크기 | 증례 수 | 통합 RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| **카로티노이드** | | | | |
| 라이코펜 | 2 | 222,535 | 1,249 | 1.05 (0.87–1.28) |
| **비타민 B군** | | | | |
| 비타민 B1 | 3 | 575,001 | 3,737 | 1.03 (0.88–1.20) |
| **식물성 에스트로겐** | | | | |
| 대두 | 2 | 32,477 | 181 | 1.51 (0.19–12.07) |
| **대사산물 및 아미노산** | | | | |
| 식이 단백질 섭취 | 2 | 585,408 | 2,402 | 1.12 (1.01–1.23) |
| 동물성 단백질 섭취 | 2 | 585,408 | 2,402 | 1.15 (1.04–1.28) |
| **기타** | | | | |
| 가공육 섭취 | 7 | 938,913 | 6,956 | 1.09 (0.98–1.21) |
| 붉은 고기 | 9 | 1,417,360 | 6,876 | 1.32 (1.11–1.57) |
| 달걀 | 2 | 1,995 | 355 | 3.86 (2.65–5.62) |




RR > 1 = 방광암 위험과 양의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음

Include subexposures: Yes