
신세포암 위험과 음의 관련성을 보인 노출 요인

노출 요인	추정치 수	표본 크기	증례 수	통합 RR (95% CI)
카로티노이드				
루테인	5	881,922	4,765	0.77 (0.68–0.87)
제아잔틴	2	781,129	2,616	0.79 (0.67–0.93)
베타-카로틴	5	881,922	4,765	0.98 (0.70–1.36)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 E	4	127,855	2,404	0.67 (0.45–0.99)
비타민 C	5	128,222	2,559	0.76 (0.61–0.94)
비타민 D	9	153,812	2,840	0.82 (0.67–1.00)
비타민 B군				
비타민 B12	2	1,959	730	0.63 (0.47–0.85)
비타민 B1	2	4,597	1,909	0.71 (0.55–0.92)
비타민 B6	4	4,771	2,002	0.73 (0.52–1.04)
엽산	6	84,212	3,088	0.76 (0.50–1.17)
비타민 B2	3	3,861	1,547	0.84 (0.68–1.04)
무기질 및 미량 원소				
셀레늄	2	3,471	1,543	0.53 (0.04–7.15)
칼슘	2	2,273	154	0.62 (0.16–2.40)
폴리페놀 및 플라보노이드				
차	4	804,643	2,861	0.71 (0.51–1.00)
지방산 및 지질				
다중불포화지방(PUFA)	3	861,316	2,507	0.94 (0.52–1.71)
기타				
알코올	20	3,783,725	11,677	0.72 (0.65–0.79)
총 식이섬유 섭취	2	4,410	1,621	0.85 (0.64–1.12)



RR < 1 = 신세포암 위험과 음의 관련성. | ◆ 통합 RR (크기는 추정치 수를 반영) | ◇ 빨간 윤곽선 = 통계적으로 유의함 (95% CI에 1.0 미포함) | ◆ 흐린 표시 = 통계적으로 유의하지 않음 | 점선 = 95% 예측구간 | N과 증례 합계는 추정치별 합산이며 층 간 중복될 수 있음 | 화살촉 = 구간이 축 범위 밖으로 이어짐

Include subexposures: Yes