
# 與膀胱癌風險呈正相關的暴露因子
## 膳食攝取研究的統合分析

| 暴露因子 | 估計值數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **類胡蘿蔔素** | | | | |
| 茄紅素 | 2 | 222,535 | 1,249 | 1.05 (0.87–1.28) |
| **B 群維生素** | | | | |
| 維生素 B1 | 3 | 575,001 | 3,737 | 1.03 (0.88–1.20) |
| **植物雌激素** | | | | |
| 黃豆 | 2 | 32,477 | 181 | 1.51 (0.19–12.07) |
| **代謝物與胺基酸** | | | | |
| 膳食蛋白質攝取量 | 2 | 585,408 | 2,402 | 1.12 (1.01–1.23) |
| 動物性蛋白質攝取量 | 2 | 585,408 | 2,402 | 1.15 (1.04–1.28) |
| **其他** | | | | |
| 加工肉類攝取量 | 7 | 938,913 | 6,956 | 1.09 (0.98–1.21) |
| 紅肉 | 9 | 1,417,360 | 6,876 | 1.32 (1.11–1.57) |
| 雞蛋 | 2 | 1,995 | 355 | 3.86 (2.65–5.62) |




RR > 1 = 與膀胱癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊

Include subexposures: Yes