
# 與膀胱癌風險呈負相關的暴露因子
# 膳食攝取研究的統合分析

| 暴露因子 | 估計值數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| **類胡蘿蔔素** | | | | |
| β-胡蘿蔔素 | 5 | 366,541 | 1,449 | 0.88 (0.71–1.10) |
| **維生素 A、C、D、E、K** | | | | |
| 維生素 C | 3 | 8,606 | 902 | 0.75 (0.56–1.01) |
| 維生素 A | 2 | 121,519 | 737 | 0.77 (0.39–1.51) |
| 維生素 E | 4 | 157,524 | 1,453 | 0.86 (0.69–1.07) |
| **B 群維生素** | | | | |
| 葉酸 | 4 | 307,597 | 1,465 | 0.73 (0.51–1.05) |
| **礦物質與微量元素** | | | | |
| 磷 | 2 | 1,147 | 522 | 0.97 (0.27–3.50) |
| **多酚與類黃酮** | | | | |
| 茶 | 9 | 580,076 | 9,039 | 0.96 (0.79–1.17) |
| **水果與蔬菜** | | | | |
| 豆類 | 2 | 2,541 | 1,268 | 0.64 (0.43–0.95) |
| 酪梨 | 2 | 112,328 | 1,165 | 0.78 (0.60–1.01) |
| **發酵食品與益生菌** | | | | |
| 優格 | 2 | 101,981 | 906 | 0.64 (0.25–1.66) |
| 發酵食品 | 5 | 203,999 | 2,474 | 0.75 (0.50–1.12) |
| **脂肪酸與脂質** | | | | |
| 單元不飽和脂肪（MUFA） | 2 | 648,914 | 3,592 | 0.95 (0.44–2.05) |
| **代謝物與胺基酸** | | | | |
| 植物性蛋白質攝取量 | 2 | 585,408 | 2,402 | 0.84 (0.70–1.00) |
| **其他** | | | | |
| 全穀物攝取量 | 3 | 219,042 | 1,666 | 0.72 (0.52–1.01) |
| 乳製品 | 8 | 306,953 | 3,788 | 0.73 (0.53–1.01) |
| 總膳食纖維攝取量 | 2 | 676,447 | 3,990 | 0.85 (0.76–0.95) |
| 酒精 | 11 | 1,002,741 | 9,130 | 0.88 (0.76–1.03) |




RR < 1 = 與膀胱癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: Yes