
與膀胱癌風險呈負相關的暴露因子
膳食攝取研究的統合分析

暴露因子	估計值數	樣本數	病例數	合併 RR（95% CI）
類胡蘿蔔素				
β-胡蘿蔔素	5	366,541	1,449	0.88 (0.71–1.10)
維生素 A、C、D、E、K				
維生素 C	3	8,606	902	0.75 (0.56–1.01)
維生素 A	2	121,519	737	0.77 (0.40–1.50)
維生素 E	4	157,524	1,453	0.86 (0.69–1.07)
B 群維生素				
葉酸	4	307,597	1,465	0.73 (0.51–1.05)
礦物質與微量元素				
磷	2	1,147	522	0.97 (0.28–3.42)
多酚與類黃酮				
茶	9	580,076	17,811	0.97 (0.80–1.18)
水果與蔬菜				
豆類	2	2,541	1,268	0.64 (0.43–0.95)
酪梨	2	112,328	1,165	0.78 (0.60–1.01)
發酵食品與益生菌				
優格	2	101,981	906	0.65 (0.25–1.65)
發酵食品	5	203,999	2,474	0.76 (0.51–1.14)
脂肪酸與脂質				
單元不飽和脂肪（MUFA）	2	648,914	3,592	0.95 (0.44–2.04)
代謝物與胺基酸				
植物性蛋白質攝取量	2	585,408	2,402	0.84 (0.71–1.00)
其他				
全穀物攝取量	3	219,042	5,247	0.73 (0.52–1.01)
乳製品	8	306,953	3,788	0.74 (0.54–1.01)
總膳食纖維攝取量	2	676,447	3,990	0.85 (0.77–0.95)
酒精	11	1,002,741	9,130	0.88 (0.76–1.02)



RR < 1 = 與膀胱癌風險呈負相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映估計值數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | N 和病例總數按估計值加總，不同分層間可能重疊 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外

Include subexposures: No