
与膀胱癌风险呈负相关的暴露因素
膳食摄入研究的荟萃分析

暴露因素	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
β-胡萝卜素	5	366,541	1,449	0.88 (0.71–1.10)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 C	3	8,606	902	0.75 (0.56–1.01)
维生素 A	2	121,519	737	0.77 (0.40–1.50)
维生素 E	4	157,524	1,453	0.86 (0.69–1.07)
B 族维生素				
叶酸	4	307,597	1,465	0.73 (0.51–1.05)
矿物质与微量元素				
磷	2	1,147	522	0.97 (0.28–3.42)
多酚与黄酮类				
茶	9	580,076	17,811	0.97 (0.80–1.18)
水果与蔬菜				
豆类	2	2,541	1,268	0.64 (0.43–0.95)
牛油果	2	112,328	1,165	0.78 (0.60–1.01)
发酵食品与益生菌				
酸奶	2	101,981	906	0.65 (0.25–1.65)
发酵食品	5	203,999	2,474	0.76 (0.51–1.14)
脂肪酸与脂质				
单不饱和脂肪（MUFA）	2	648,914	3,592	0.95 (0.44–2.04)
代谢物与氨基酸				
植物蛋白质摄入量	2	585,408	2,402	0.84 (0.71–1.00)
其他				
全谷物摄入量	3	219,042	5,247	0.73 (0.52–1.01)
乳制品	8	306,953	3,788	0.74 (0.54–1.01)
总膳食纤维摄入量	2	676,447	3,990	0.85 (0.77–0.95)
酒精	11	1,002,741	9,130	0.88 (0.76–1.02)



RR < 1 = 与膀胱癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: Yes