
与肾细胞癌风险呈负相关的暴露因素
膳食摄入研究的荟萃分析

暴露因素	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
叶黄素	5	881,922	4,765	0.77 (0.68–0.88)
玉米黄质	2	781,129	2,616	0.79 (0.67–0.93)
β-胡萝卜素	5	881,922	4,765	0.98 (0.70–1.36)
维生素 A、C、D、E、K				
维生素 E	4	127,855	2,404	0.67 (0.46–0.99)
维生素 C	5	128,222	2,559	0.76 (0.62–0.94)
维生素 D	2	4,112	796	0.79 (0.66–0.95)
B 族维生素				
维生素 B1	2	4,597	1,909	0.72 (0.55–0.92)
多酚与黄酮类				
茶	4	804,643	2,861	0.72 (0.52–1.00)
脂肪酸与脂质				
多不饱和脂肪（PUFA）	3	861,316	2,507	0.94 (0.53–1.70)
其他				
酒精	20	3,783,725	24,558	0.72 (0.66–0.79)
总膳食纤维摄入量	2	4,410	1,621	0.85 (0.65–1.12)



RR < 1 = 与肾细胞癌风险呈负相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: Yes