

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ**

вул. Рекордна, 25/ вул. Миру, 16, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69019,
тел/факс (061) 224-06-88, E-mail zpoblsls@ukr.net



**30121
Медичні
дослідження**

**РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ № 1 від 27.07.2026
бактеріологічне дослідження**

1. Прізвище, ім'я, по-батькові пацієнта: Пупкін В.П.
2. Рік народження: 1983
3. Стать: чоловік
4. Домашня адреса (за необхідністю): вул.Оптимістична
5. Заклад, що направив біоматеріал: Тест
6. Відділення закладу, з якого надійшов біоматеріал:
7. Номер медичної карти (за наявності):
8. ПІБ особи, яка направила біоматеріал:
9. Діагноз:
10. Вид біоматеріалу, який направлено на дослідження: виділення з жіночих статевих органів
11. Мета дослідження: на наявність стрептококу групи В
12. Метод дослідження: класичний бактеріологічний
13. Дата та час відбору біоматеріалу: 19.07.2026
14. Дата та час отримання біоматеріалу лабораторією: 19.07.2026 22:56
15. Примітка щодо матеріалу: біоматеріал придатний до дослідження
16. Результати дослідження: наведені в таблицях

16.1 Результати дослідження біоматеріалу

Мета дослідження	Результат проведеного дослідження
1	2
на наявність стрептококу групи В	Виділено: <i>Pseudomonas aeruginosa</i> $<10^3$ МК/см ³ .
Біологічний референтний інтервал: Відсутність	

16.2 Результати чутливості виділених культур до хіміотерапевтичних препаратів

***Pseudomonas aeruginosa* $<10^3$ МК/см³**

Найменування хіміотерапевтичного препарату	Чутливість до препарату	Стандартна доза препарату	Висока доза препарату
1	2	3	4
Бензилпеніцилін	стійкий ¹	в/в: 0,6г x 4	в/в: 1,2г x 4-6
Ампіцилін	стійкий ¹	в/в: 2г x 3	в/в: 2г x 4 (менінгіт – 6)
Ампіцилін-сульбактам	стійкий ¹	в/в: 2г амп+1г сул x 3	в/в: 2г амп+1г сул x 4
Амоксицилін	стійкий ¹	п/о: 0,5г x 3 в/в: 1г x 3-4	п/о: 0,75-1г x 3 в/в: 2г x 6
Амоксицилін-клавуланат	стійкий ¹	п/о: 0,5г амо+0,125г клв x 3 в/в: 1г амо+0,2г клв x 3-4	п/о: 0,875г амо+0,125г клв x 3 в/в: 2г амо+0,2г клв x 3

Піперацилін	проміжний	в/в:4г х 4	в/в:4г х 4 протягом 3 год
Піперацилін-тазобактам	проміжний	в/в:4г пип+0,5г таз х 4	в/в:4г пип+0,5г таз х 4 протягом 3 год
Цефаклор	стійкий ¹	п/о:0,25-1г х 3	
Цефадроксил	стійкий ¹	п/о:0,5-1г х 2	
Цефалексин	стійкий ¹	п/о:0,25-1г х 2-3	
Цефазолін	стійкий ¹	в/в:1г х 3	
Цефотаксим	стійкий ¹	в/в:1г х 3	в/в:2г х 3
Цефокситин	стійкий ¹		
Цефтазидим	проміжний	в/в:1г х 3	в/в:2г х 3 або 1г х 6
Цефтриаксон	стійкий ¹	в/в:2г х 1	в/в:2г х 2 або 4г х 1
Цефуросим	стійкий ¹	п/о:0,25г х 2 в/в:0,75г х 3	п/о:0,5г х 2 в/в:1,5г х 3
Ертапенем	стійкий ¹	в/в:1г х 1 протягом 30 хв	
Меропенем	чутливий	в/в:1г х 3 протягом 30 хв	в/в:2г х 3 протягом 3 год
Ципрофлоксацин	проміжний	п/о:0,5г х 2 в/в:0,4г х 2	п/о:0,75г х 2 в/в:0,4г х 3
Амікацин	чутливий	в/в:25-30мг/кг х 1	
Неоміцин	стійкий ¹		
Тобраміцин	чутливий	в/в:6-7мг/кг х 1	
Далбаванцин	стійкий ¹	в/в:1г х 1 протягом 30хв	
Орітаванцин	стійкий ¹	в/в:1,2г х 1 протягом 3 год	
Тейкопланін	стійкий ¹	в/в:0,4г х 1	
Талаванцин	стійкий ¹	в/в:10мг/кг х 1 протягом 1 год	
Ванкоміцин	стійкий ¹	в/в:0,5г х 4 або 1г х 2 або 2г х 1	
Азітроміцин	стійкий ¹	п/о:0,5г х 1 в/в:0,5г х 1	
Кларитроміцин	стійкий ¹	п/о:0,25г х 2	п/о:0,5г х 2
Еритроміцин	стійкий ¹	п/о:0,5г х 2-4 в/в:0,5г х 2-4	п/о:1г х 4 в/в:1г х 4
Рокситроміцин	стійкий ¹	п/о:0,15г х 2	
Телітроміцин	стійкий ¹	п/о:0,8г х 1	
Кліндаміцин	стійкий ¹	п/о:0,3г х 2 в/в:0,6г х 3	п/о:0,3г х 4 в/в:0,9г х 3
Лінкоміцин	стійкий ¹		
Хінупристин-далфопристин	стійкий ¹	в/в:7,5мг/кг х 2	в/в:7,5мг/кг х 3
Доксициклін	стійкий ¹	п/о:0,1г х 1	п/о:0,2г х 1
Еравациклін	стійкий ¹	в/в:1мг/кг х 2	
Міноциклін	стійкий ¹	п/о:0,1г х 2	
Тетрациклін	стійкий ¹	п/о:0,25г х 4	п/о:0,5г х 4
Тігециклін	стійкий ¹	в/в:100 мг перша доза далі по 50мг х 2	
Лінезолід	стійкий ¹	п/о:0,6г х 2 в/в:0,6г х 2	
Тедизолід	стійкий ¹	п/о:0,2г х 1 в/в:0,2г х 1	
Хлорамфенікол	стійкий ¹	п/о:1г х 4 в/в:1г х 4	п/о:2г х 4 в/в:2г х 4
Фузидієва кислота	стійкий ¹	п/о:0,5г х 2 в/в:0,5г х 2	п/о:0,5г х 3 в/в:0,5г х 3
Рифампіцин	стійкий ¹	п/о:0,6г х 1 в/в:0,6г х 1	п/о:0,6г х 2 в/в:0,6г х 2
Триметоприм	стійкий ¹	п/о:0,16г х 2	

Примітки:

Чутливий – існує висока вірогідність терапевтичного успіху

Проміжний – існує висока вірогідність терапевтичного успіху при збільшеній експозиції препарату шляхом корекції режиму дозування або його концентрації в осередку інфекції

Стійкий – висока вірогідність терапевтичної невдачі навіть при збільшеній експозиції препарату.

¹ - Очікуваний фенотип резистентності (природна стійкість). >90% усіх ізолятів незалежно від походження демонструють характерний механізм стійкості.

² - Очікуваний фенотип чутливості (природна чутливість). >99% усіх ізолятів, чутливі до препарату, незалежно від походження,

Категорії чутливості встановлені з урахуванням вищенаведених режимів дозування (EUCAST v 16.0).

Прийнятними є альтернативні режими дозування, які призводять до еквівалентного впливу. Дана інформація не повинна розглядатися як вичерпне керівництво для вибору режиму дозування в клінічній практиці і не замінює конкретні локальні рекомендації по дозуванню.

Фактори ризику:

Результати стосуються лише зразку біоматеріалу, який був представлений для дослідження

17. Підписи фахівців лабораторії

	Дата	ПІБ виконавця	Підпис виконавця
Результат видано	27.07.2026	Аліменко Ю.Л.	
Результат верифіковано	27.07.2026	Кряжева Н.П.	

Повний або частковий передрук результату аналізу без дозволу лабораторії забороняється.