

Теоретическое задание

Для простейшего уравнения переноса

$$u_t + \lambda u_x = 0, \quad \lambda = 1$$

все множество разностных схем

$$u_m^{n+1} = \sum_{\mu, \nu} \alpha_{\mu}^{\nu}(\tau, h) u_{m+\mu}^{n+\nu} \quad (\text{в суммирование не входит точка } \mu=0, \nu=1)$$

исследовать на заданном сеточном шаблоне, отмеченном точками на рисунке (см. ниже), найдя коэффициенты схемы как функции от числа Куранта $\sigma = \lambda \tau / h$:

(1т) для заданного сеточного шаблона получить аналитический вид для двухпараметрического множества положительных по Фридрихсу ($\alpha_{\mu}^{\nu} \geq 0$) схем 1-го порядка аппроксимации относительно двух выбранных коэффициентов α_{μ}^{ν} ;

(2т) для заданного сеточного шаблона получить аналитический вид для однопараметрического множества схем 2-го порядка аппроксимации относительно выбранного коэффициента α_{μ}^{ν} ;

(3т) для заданного сеточного шаблона получить аналитический вид для единственной схемы 3-го порядка аппроксимации;

(4т) среди положительных по Фридрихсу (монотонных, мажорантных) схем найти аналитический вид для наиболее точной схемы с минимальной «аппроксимационной вязкостью», а также для остальных вершин двухпараметрического множества монотонности;

(5т) среди схем 2-го порядка аппроксимации найти аналитический вид для наиболее близкой ко множеству положительных по Фридрихсу схем.

(6) для заданного сеточного шаблона и значения числа Куранта изобразить все построенные в пунктах (1т) – (5т) схемы в пространстве двух выбранных в пункте (1т) коэффициентов α_{μ}^{ν} .

Практическое задание

Решить следующую краевую задачу для уравнения переноса

$$\begin{cases} u_t + \lambda u_x = 0, \quad \lambda = 1 \quad (t > 0, \quad 0 < x \leq X, \quad X = 2), \\ u(0, x) = \varphi(x) \quad (0 \leq x \leq X), \\ u(t, 0) = 0 \quad (0 < t \leq 100\tau), \end{cases}$$

где функция $\varphi(x)$ определяется одним из трех способов:

(а) «ступенька»

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & \text{при } 0.4 \leq x \leq 0.6, \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

(б) «полуэллипс»

$$\varphi(x) = \begin{cases} \sqrt{1 - 100 \cdot (x - 0.5)^2} & \text{при } 0.4 \leq x \leq 0.6, \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

(в) «треугольник»

$$\varphi(x) = \begin{cases} 10x - 4 & \text{при } 0.4 \leq x \leq 0.5, \\ -10x + 6 & \text{при } 0.5 \leq x \leq 0.6, \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

на сетке с числом узлов 201 ($h = 0.01$) для заданного сеточного шаблона и указанного значения числа Куранта:

(1п) по двум монотонным схемам первого порядка аппроксимации – вершинам области монотонных схем, включая схему с минимальной «аппроксимационной вязкостью» из (4т);


(2п) по наименее осциллирующей на разрывных решениях схеме 2-го порядка аппроксимации из (5т);

(3п) по двум схемам 2-го порядка аппроксимации, лежащим на прямой – однопараметрическом множестве схем 2-го порядка аппроксимации – по разные стороны от схемы из (5т);


(4п) по схеме 3-го порядка аппроксимации из (3т).

В каждом из пунктов (1п) – (4п) в конечный момент времени, т.е. через 100 шагов, вывести на одном графике точное решение и численное.


Если за время расчета возмущение выходит на правую границу расчетной области – увеличить значение X .




Шаблон № 1




Шаблон № 2




Шаблон № 3




Шаблон № 4




Шаблон № 5




Шаблон № 6




Шаблон № 7



Шаблон № 8



Шаблон № 9



Шаблон № 10