

BİÇİMSEL DİLLER VE OTOMATA TEORİSİ

Pushdown otomata

12. Hafta

DR. ÖĞR. ÜYESİ. HÜSEYİN VURAL



Ders İzlencesi



Pushdown Otomata Tanımı

- $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$
- 1.) Q, sonlu durumlar kümesidir.
- 2.) Σ, alfabeyi gösterir.
- 3.) r, stack alfabesini gösterir.
- 3.) δ : Q × Σ x r. δ (delta) geçiş fonksiyonudur
- 4.) q₀ başlangıç durumunu gösterir
- 5.) F, kabul durumlarının kümesini gösterir.



İçerikten Bağımsız Diller

- A → 0A1
- A → B
- B → €


• {0ⁿ1ⁿ,n>=0} dili içerikten bağımsız gramer ile tanımlanabilmektedir.




• $M1 = (Q, \Sigma, r, \delta, q_1, F)$ PDA'sı $\{0^n1^n, n>=0\}$ dili için aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır


- $Q = \{q1,q2,q3,q4\}$
- $\Sigma = \{0,1\}$
- $\Gamma = \{0,\$\}$
- $F = \{q1,q4\}$

















000111


Stack





000111


0 0 Stack \$





000111


0 0 Stack 0 \$







000111

0 0 Stack \$





























• $M2 = (Q, \Sigma, r, \delta, q_1, F)$ PDA'sı {aibick, i = j veya i = k} dili için aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

- $Q = \{q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7\}$
- $\Sigma = \{a,b,c\}$
- $\Gamma = \{a, \$\}$
- $F = \{q4, q7\}$




















































































































• $M2 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_1, F)$ PDA'sı {ww^R, w $\in \{0,1\}^*$ } dili için aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. w^R'nin anlamı w kelimesinin ters yazılmasıdır. Ör: w = 011 ise w^R = 110

- $Q = \{q1,q2,q3,q4\}$
- $\Sigma = \{0,1\}$
- $\Gamma = \{0,1,\$\}$
- $F = \{q1, q4\}$



