# Limitations

・治療は非盲検であり，評価者を盲検化しても診療への影響は残り得る．

・中国26施設の選択された集団であり，他の患者集団への一般化には限界がある．

**発症時刻・時間帯別の患者数**




判明：4.5～9時間

判明：
9時間～24時間

発症時刻不明


発症9時間以上と確認できた例は51例と少なく，この時間帯に発症した症例での有効性に関する根拠は乏しい．

# Background①

## この論文を選んだ理由：時間が経過した患者にも治療の余地はあるか

・発症から時間が経過していても，救済できる可能性のある脳組織が残る患者がいる．


・血栓回収療法を予定しない患者で，静注血栓溶解療法の治療機会を広げられるのかを知りたい．




右上の暗赤色＝虚血コア
右下の黄色＝低灌流域

**HOPE試験は，発症4.5～24時間の患者における rt-PAの有効性と出血リスクを検証．**

**「何時間経ったか」に加え，**
**「救済可能な組織が残っているか」を画像で評価．**


Pre-2
Pre-1
Peak
Late-1
Late-2
Label
A
Lesion
Dice1: 0.592
Dice2: 0.185
Dice1: 0.682
Dice2: 0.812
Dice1: 0.851
Dice2: 0.899
Dice1: 0.528
Dice2: 0.735
Dice1: 0.537
Dice2: 0.635
B
CBF
C
$T_{max}$