

一様な磁場中の荷電粒子の運動を考える。磁場は  $z$  軸と平行で大きさは  $B$  とする。これを満たすベクトルポテンシャルとして

$$\begin{cases} A_x = 0 \\ A_y = Bx \\ A_z = 0 \end{cases} \quad (0.0.1)$$

を採用する。 $z$  に対しては対称なので、以降は  $xy$  平面内での運動を考える。ハミルトニアンは

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} [\hat{p}_x^2 + (\hat{p}_y + eB\hat{x})^2] \quad (0.0.2)$$

$$= \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{(eB)^2}{2m} \left( \hat{x} + \frac{\hat{p}_y}{eB} \right)^2 \quad (0.0.3)$$

である。このハミルトニアンは  $\hat{y}$  を含まないので

$$[\hat{H}, \hat{p}_y] = 0 \quad (0.0.4)$$

であることがわかる。 $y$  方向に関しては自由粒子の運動となる。また、 $p_y$  の固有値が定まるので、これを  $\hbar k_y$  とする。ハミルトニアンは

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{(eB)^2}{2m} \left( \hat{x} + \frac{\hbar k_y}{eB} \right)^2 \quad (0.0.5)$$

と書き換えられ、これは調和振動子型のハミルトニアン

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{m\omega_c^2 \hat{x}^2}{2} \quad (0.0.6)$$

と同じ形をしている。よって、エネルギー固有値は

$$E = \hbar\omega_c \left( n + \frac{1}{2} \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (0.0.7)$$

$$\omega_c = \frac{|e|B}{m} \quad (0.0.8)$$

である。平面内の自由粒子のエネルギーが垂直磁場を加えることで離散化された。これを **Landau 準位** (Landau level) という<sup>1</sup>。また、 $\omega_c$  をサイクロトロン周波数という。

次に、 $x$  方向に長さ  $L_x$ 、 $y$  方向に長さ  $L_y$  の周期的境界条件を課す。すると、

$$k_y = \frac{2\pi}{L_y} l \quad (l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (0.0.9)$$

となる。また  $x$  方向の調和振動子は  $\frac{\hbar k_y}{eB}$  だけずれている。これが 0 と  $L_x$  の間にあるためには

$$0 \leq \frac{\hbar k_y}{eB} = \frac{\hbar}{eB} \frac{2\pi}{L_y} l \leq L_x \quad (0.0.10)$$

でなければならない。これは

$$0 \leq l \leq \frac{eB}{2\pi\hbar} L_x L_y \quad (0.0.11)$$

と直される。よって、 $l$  は  $\frac{|e|B}{2\pi\hbar} L_x L_y$  通りの値を取ることがわかる。したがって、単位面積当たりの縮退度は

$$\frac{|e|B}{2\pi\hbar} \quad (0.0.12)$$

である。

<sup>1</sup>この現象は量子 Hall 効果へとつながる。