

本節では、変分法の威力を確認するために、ヘリウム原子の基底エネルギーを考える。ヘリウム原子において、 $\frac{m}{M} \rightarrow 0$  であり、原子核が動かない (原子核の運動エネルギーが無視できる) とする。これを Born-Oppenheimer 近似という。ヘリウム原子は電荷  $2e$  の原子核と電荷  $-e$  の電子を 2 つもつので、ハミルトニアンは、

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} \quad (0.0.1)$$

である。第 1 項から第 4 項は水素陽原子のハミルトニアン  $\hat{H}^0$  であり厳密に解くことが出来ることを利用して、第 5 項を無視して考えたときと、試行関数を定めて変分法を用いたときを比較する。なお、実験によりヘリウム原子の基底エネルギーは  $-78.6$  eV と求まっている。




図 1: ヘリウム原子の構造

#### 例題 0.1: ヘリウム原子の基底エネルギー (荒い近似)

計算を行うと、ヘリウムの原子番号を  $Z$  として  $\hat{H}^0$  の基底波動関数、

$$\psi = \frac{Z^3}{\pi a_0^3} \exp\left(-Z \frac{r_1 + r_2}{a_0}\right) \quad (0.0.2)$$

と  $\hat{H}^0$  の基底エネルギー、

$$E = -8 \text{ Ry} \approx -108.8 \text{ eV} \quad (0.0.3)$$

が求まる<sup>a b c</sup>.

---

<sup>a</sup>  $a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} \approx 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$ : Bohr 半径  
<sup>b</sup>  $Z = 2$   
<sup>c</sup>  $\text{Ry} = \frac{\hbar^2}{2m\omega^2} \approx 13.6 \text{ eV}$ : Rydberg 定数

#### 例題 0.2: ヘリウム原子の基底エネルギー (変分法)

例題 0.1 の結果とヘリウム原子の基底エネルギーの測定結果は  $-78.6$  eV と大きく異なっているため、相互作用

用の項を取り入れた近似を考える．式 (0.0.2) を試行関数  $\psi(Z)$  とする． $\psi(Z)$  を用いてエネルギーを計算する．

$$E(Z) = \frac{\int \psi^* \hat{H} \psi \, d\mathbf{r}_1 \, d\mathbf{r}_2}{\int \psi^* \psi \, d\mathbf{r}_1 \, d\mathbf{r}_2} \quad (0.0.4)$$

$$= -2 \left( 4Z - Z^2 - \frac{5}{8}Z \right) \text{ Ry} \quad (0.0.5)$$

となる．式 (0.0.5) が最小となるような  $Z$  を  $Z_0$  とすると  $Z_0 = 27/16$  であったので，

$$E(Z) \geq E(Z_0) = -77.5 \text{ eV} \quad (0.0.6)$$

となった．式 (0.0.6) と式 (0.0.3) を比べると，荒い近似の方が真の基底エネルギー  $-78.6 \text{ eV}$  に近い値が得られた<sup>a,b</sup>．

<sup>a</sup> $Z_0 < 2$  は遮蔽効果により有効電荷が  $2e$  より小さくなったことを意味する．

<sup>b</sup>積分の計算は David J. Griffith, *Introduction to Quantum Mechanics*, pp. 333-334 にある．