

次に、時間に依存する摂動である調和摂動を議論する．定常状態の系に， $\hat{V}(t)$  なる摂動が加わったこと考える． $\hat{V}(t)$  を，

$$\hat{V}(t) := \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 2V \cos \omega t & t \geq 0 \end{cases} \quad (0.0.1)$$

と定義する<sup>1</sup>． $2V \cos \omega t = V(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$  であるので，式 (??) より，

$$c_{f,i}^{(1)}(t) = \frac{i}{\hbar} \int_0^t \langle f | \hat{V} | i \rangle (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) e^{i\omega_{fi}t} dt \quad (0.0.2)$$

$$= -\frac{V_{fi}}{\hbar} \left( \frac{e^{i(\omega_{fi}+\omega)t} - 1}{\omega_{fi} + \omega} + \frac{e^{i(\omega_{fi}-\omega)t} - 1}{\omega_{fi} - \omega} \right) \quad (0.0.3)$$

を得る．ただし， $V_{fi} := \langle f | \hat{V} | i \rangle$  とした．

1.  $\omega_{fi} - \omega \approx 0$  のとき

式 (0.0.2) の第 2 項は第 1 項より十分大きいから，第 1 項を無視して，

$$c_{f,i}^{(1)}(t) \approx -\frac{V_{fi}}{\hbar} \frac{e^{i(\omega_{fi}-\omega)t} - 1}{\omega_{fi} - \omega} = -\frac{V_{fi}}{\hbar} \exp\left(i \frac{\omega_{fi} - \omega}{2} t\right) \frac{\sin\left(\frac{\omega_{fi} - \omega}{2} t\right)}{\frac{\omega_{fi} - \omega}{2}} \quad (0.0.4)$$

と近似できる．このとき  $|i\rangle \rightarrow |f\rangle$  の遷移確率は，

$$\left| c_{f,i}^{(1)}(t) \right|^2 = \frac{V_{fi}^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2 \frac{\omega_{fi}-\omega}{2} t}{\left( \frac{\omega_{fi}-\omega}{2} \right)^2} \quad (0.0.5)$$

$\frac{\sin^2 \frac{\omega_{fi}-\omega}{2} t}{\left( \frac{\omega_{fi}-\omega}{2} \right)^2}$  は  $t \rightarrow \infty$  で  $2\pi t \tilde{\delta}(\omega_{fi} - \omega) = 2\pi t \hbar \tilde{\delta}(E_f - E_i - \hbar\omega)$  と近似できるので単位時間当たりの遷移確率は，

$$\omega_{f \rightarrow i} = \frac{\left| c_{f,i}^{(1)}(t) \right|^2}{t} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \tilde{\delta}(E_f - E_i - \hbar\omega) \quad (0.0.6)$$

である．つまり， $E_i$  から  $E_f = E_i + \hbar\omega$  なるエネルギー準位へ遷移することがわかる．また，式 (0.0.6) も Fermi の黄金律という．

2.  $\omega_{fi} + \omega \approx 0$  のとき

式 (0.0.2) の第 1 項が支配的となる．上記の議論を  $\omega \rightarrow -\omega$  と置き換えて繰り返すと単位時間当たりの遷移確率として

$$\omega_{i \rightarrow f} = \frac{\left| c_{f,i}^{(1)}(t) \right|^2}{t} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i + \hbar\omega) \quad (0.0.7)$$

を得る．つまり， $E_i$  から  $E_f = E_i - \hbar\omega$  なるエネルギー準位へ遷移することがわかる．

<sup>1</sup>このような  $\hat{V}(t)$  は量子系に対して光を照射することを意味している．このような摂動はしばしば，レーザにおいて，反転分布を構成するために用いられる．