

时序模型与非时序基线的初步比较

研究更新

本次比较中，紧凑型时序模型的宏平均 F1（macro-F1）高于非时序基线。结果提示该模型值得进一步验证；现有证据仍属于初步研究结果，不构成临床验证。

研究问题与结果

本次实验考察紧凑型时序模型相对于非时序基线的预测表现。根据实验笔记，两种模型在同一受试者互不重叠的数据划分上进行比较，不同数据子集之间不共享受试者。

模型	macro-F1（越高越好）
紧凑型时序模型	0.714
非时序基线	0.671

时序模型减去基线的绝对差值为 **0.043**。笔记报告的差值配对 bootstrap 区间为 **[0.018, 0.071]**，区间全部位于零以上，与本次比较的正向差值一致。

证据边界与后续核查

笔记未提供区间的置信水平、重采样单位、重复次数及区间构造方式，因此暂不作特定置信水平下的显著性判断。数据集、样本量、模型结构和训练配置也未给出，尚无法充分判断比较条件是否可比，或将观察到的差异单独归因于时序信息。

建议下一步先补齐上述实验与统计细节，再核查该优势在重复实验中是否稳定。当前结论仅限于所报告的比较，不能据此推断临床适用性。

资料依据：本次提供的实验笔记（Public-safe research notes）。本报告未重新计算模型指标或 bootstrap 区间；差值由笔记中的两项指标相减得到。