



例谈整体思想在高中数学解题中的应用

■ 王 斌

数学思想是对数学知识、方法构建呈一定规律的认知,具有完整性、理性的认识,灵活运用数学思想,可解决具体的数学问题.将复杂的数学问题转化为简单的解题过程,便于换算得出准确的解题结果,有着化难为易的解题效果.整体思想在数学解题中,从解题的整体出发,对数学问题进行整体思考,进而培养出整体数学解题思维,能够从大局出发,获得化繁为简的理想效果.本文通过高中数学解题实例,对整体思想在高中数学解题中的应用进行探讨.

一、整体代入,化简为易

整体代入在数学解题中的应用是指将若干子公式看作一个整体,或变形后视为一个整体,然后代入另一公式当中,减少单个变量,使解题过程变得简单,解题思路也相对明确.

例1 长方体的全面积为11,十二条棱长之和为24,求这个长方体的一条对角线长.

在解题时假设长方体未知量长、宽、高为 a, b, c ,如果先验证求出长方体未知量长、宽、高,那么则不满足求一个长方体的一条对角线长,因此,在这时采用整体思想,将未知量代入公式中,便可快速求出长方体的对角线长.

假设长方体未知量长、宽、高为 a, b, c ,长方体的对角线长为 d ,可得出:

① $2(ab + bc + ac) = 11$; ② $4(a + b + c) = 24$,根据 $4(a + b + c) = 24$ 可得 $a + b + c = 6$,这时注意将这个公式代入求长方体的对角线长公式中, $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{(a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ac)} = \sqrt{6^2 - 11} = 5$,因此,这个长方体的一条对角线长为5.

在实际的高中数学解题中,整体代入法应用范围十分广泛,我们再来一个例子.

例2 若代数式 $4x^2 - 2x + 5$ 的值为7,求代数式 $2x^2 - x + 1$ 的值等于多少?

在解题时,根据题目所给出的已知公式, $4x^2 - 2x + 5 = 7$,若直接按照公式求出未知量,这个求解过程是比较困难的,仔细观察已知公式,发现 $4x^2 - 2x$ 可分解为两个 $2x^2 - x$ 的式子,如果将这个式子看做是一个整体,由已知公式转化为求 $2x^2 - x$ 式子的值,在整体公式中代入 $2x^2 - x + 1$,即可得 $x = 2$,这样一来原本复杂的求解就变得简单许多,学生通过学习整体代入法后,解题能力得到培养,解题效率随之提高.

二、整体换元,化繁为简

整体换元是整体思想中的一部分,是指根据研究新元性

质,对整体进行换元,将原本复杂的公式变为简单、富有条理的式子,从而能够保持清晰的思路来解决问题.

例3 计算 $(a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1})(a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + a_n) - (a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1})(a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n)$.

解题时,如果按照题意,将其逐一分解,那么这个求解过程是十分复杂而困难的,若采用整体换元法,找出题目中潜在的运算规律,则可轻松解决.假设 $a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1}$ 为未知量 x ,原式可表示为 $(a_1 + x)(x + a_n) - x(a_1 + x + a_n)$,简化该式可得 $x^2 + a_1x + a_nx + a_1a_n - a_1x - x^2 - a_nx$,最终计算结果为 a_1a_n .

三、整体补形,迎刃而解

整体补形适用于解决数学图形题,将数学问题中的非规则图形、非特殊图形,在添加辅助线后,使原本图形转变为完整的特殊图形,为图形问题创造更多条件,能够将数学图形问题轻松解决.

例4 球面上四点 P, A, B, C ,且 PA, PB, PC 两两垂直, $PA = PB = PC = a$,求球的半径是多少?

在解题时,将图形填补为一个完整的正方体,这个正方体正好对应球的内接正方体,假设正方体的对角线为球的直径,那么设球的半径为未知量 R ,即可得出 $2R = \sqrt{3}a$,球的半径 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.

四、构建数学整体意识,避免纠结于单个元素

在实际的高中数学教学中,学生在解题的时候往往会发现此种情况,数学问题中题目给出的已知条件比较有限,但对题目进行深入的分析后,则会发现在题目中隐藏着许多条件,学会灵活运用这些条件后,就可轻松解决数学问题.如教师在讲到三角函数的计算这一章节时,虽然学生对三角函数的函数值比较了解,可是面对 35° 角,学生却难以计算其对应的三角函数值,若学生一直针对 35° 的角所对应的函数值来解题,将无法处理该类问题.通过构建数学整体意识,学生就能根据三角函数定理,去解决此类问题,进一步深化学生对三角函数的理解,同时也能轻松解决数学问题.

例5 求 $\tan 20^\circ + \tan 25^\circ + \tan 20^\circ \cdot \tan 25^\circ$ 的值.

学生在解题时, 20° 角、 25° 角的三角函数值很少接触到,运用整体思想,将其转化为自己熟知的三角函数,就可解决此道三角函数题.由于 $20^\circ + 25^\circ = 45^\circ$,因此 $\tan 20^\circ + \tan 25^\circ$ 可得出 $\tan(20^\circ + 25^\circ) = \tan 45^\circ = 1$ 的结论,将 $\tan 20^\circ \cdot \tan 25^\circ$ 转化为 $\tan(20^\circ + 25^\circ)$ 将其分解为 $(\tan 20^\circ + \tan 25^\circ) / (1 - \tan 20^\circ \tan 25^\circ)$.