

A
Baoji
Dams (n = 23)
23 pairs
Calves (n = 23)
-21d
0d (calving)
0d (birth)
Feces
Rumen
Feces
Rumen
Meconium
Oral swab
Gansu
Dams (n = 28)
28 pairs
Calves (n = 28)
Calves (n = 20)
0d (calving)
0d (birth)
70d
Feces
Rumen
Meconium
Feces
Shotgun metagenomic sequencing
Total 236 samples
B
Bos taurus polyomavirus
Baoji
Gansu
C0dME
C0dOR
M0dF
M0dR
M21dF
M21dR
C0dME
C70dF
M0dF
M0dR
C
quality
Complete
High
Medium
Low
42 (0.1%)
1226 (2.6%)
3081 (6.5%)
43347 (90.9%)
D
Relative abundance (%)
Family
Others
Herelleviridae
Steigviridae
Podoviridae
Myoviridae
Siphoviridae
Siphoviridae
Myoviridae
Podoviridae
Steigviridae
Herelleviridae
Bacillota
Bacteroidota
Actinomycetota
Pseudomonadota
Spirochaetota
E
Baoji
Gansu
Phage
Bacteria
ns
Baoji_C0dME
Baoji_C0dOR
Baoji_M0dF
Baoji_M0dR
Baoji_M21dF
Baoji_M21dR
Gansu_C0dME
Gansu_C70dF
Gansu_M0dF
Gansu_M0dR
F
PCo2 (9.6%)
PCo1 (21.43%)
PERMANOVA R² = 0.380
P < 0.01
PCo2 (11.37%)
PCo1 (25.61%)
PERMANOVA R² = 0.536
P < 0.01
Group
C0dOR
C0dME
C70dF
M0dF
M0dR
M21dF
M21dR
Area
Baoji
Gansu