

Example of a LaTeX document

Introduction

**Definition Title** This is a definition.

- This is an itemized list
- Should provide a concise explanation

this is an important note

**Concept Title** This is a concept. This describes more general concepts and ideas. NOT EVERYTHING IS A CONCEPT THOUGH!

- two lists usually fit next to each other
- use the custom command mult for that

Please also use other box types, to make the summary more readable. If too many boxes of the same type (aka the same colour) are on one page, it becomes very messy. So concepts should be the BASE concepts, further explanations/details or sub-concepts should be theorems or corollaries, or sometimes just definitions.

**Lemma Title** This is a lemma. Here we state proven facts that are used in the context of a theorem or corollary.

**Theorem Title** This is a theorem. Also use this for certain explanations that are more on the mathematical side, even if they are not theorems.

**Corollary Title** This is a corollary. Also use this for certain explanations that are more on the mathematical side, even if they are not corollaries. Especially in context to a theorem block above, this adds further information or explanations.

1. This is an enumerated item.
2. This is another enumerated item.

**Rules of Thumb** This is a concept. Here we can state rules of thumb or general guidelines.

- This is an itemized list
- Should provide a concise explanation
- e.g. Vorgehensweisen

This is a remark. Here we can state additional information or comments. no title required.

this is a simple example. no title required.

**Example Title** this is a more complex example. title required.

**Example Title** One can achieve better readability by seperating the task definition (exercise)

from the solution (solution).

Topic A

**Topic A** this is a definition regarding topic A.

**Topic A** this is a concept regarding topic A.

**Topic A** this is a theorem regarding topic A. Or a subconcept/conclusion from the concept above.

**Topic A** this is a corollary regarding topic A. Or some details on the concept above.

**Example Topic A** this is an example regarding topic A. Examples are usually a bit longer, so they should be displayed in a single column.

this is the solution to the example regarding topic A.

**Important note:** for important notes and conclusions within examples, use the important command.

Special Cases

**Definition Title**

- this is an itemized list

if after a title there is a list, no need to add a new line manually.

**Definition Title**

Gegeben die Summe von zweier (oder einer) Wurzel, kann man wie folgt vorgehen:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{(x+5) - (x-3)}{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}} \right)$$

before and after an image, we need to add a new line manually. unless there is nothing below it.

Gegeben die Summe von zweier (oder einer) Wurzel, kann man wie folgt vorgehen:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{(x+5) - (x-3)}{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}} \right)$$

Some characters are treated as special characters in LaTeX. The backslash (\) is used to escape special characters. To include these characters in your text, you need to use a backslash before them. For example, to include a dollar sign in your text, you would write \$. More examples:

- &
- %
- {}
- ~
- \
- ~
- ^

Some characters even need to be defined within a math environment. the dollar sign (\$) is used to indicate math mode. This can be done inline to show things like  $\theta$  or  $\alpha$ . Examples:

- |              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| • $\alpha$   | • $\neq$      | • $\forall$ |
| • $\beta$    | • $\approx$   | • $\exists$ |
| • $\gamma$   | • $\approx$   | • $\notin$  |
| • $\delta$   | • $\leq$      | • $\cup$    |
| • $\epsilon$ | • $\geq$      | • $\cap$    |
| • $\theta$   | • $\subseteq$ | • $\infty$  |

We also use  $\rightarrow$  and  $\Rightarrow$  for arrows. The first one is a single arrow, the second one is a double arrow. These are nice to use in all kinds of contexts, especially when we want to show a transition from one state to another, or some kind of conclusion or extra information.

**Formula Title** This is a formula. This should be used for very important formulas and concepts that can be simplified into a step-by-step process.  
Short formula:  $E = mc^2$   
Complex formula:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

do not use the equation environment, as I prefer working with \$ and \$\$ for inline and block formulas.

**Formula Title** In formulas, we have LaTeX functions that are used to create nice looking formulas. examples:

- frac for fractions:  $\frac{a}{b}$
  - sqrt for square roots:  $\sqrt{a}$
  - sqrt[n] for n-th roots:  $\sqrt[n]{a}$
  - abs for absolute values:  $|a|$
  - sum for summation:  $\sum_{i=1}^n i$
  - prod for product:  $\prod_{i=1}^n i$
  - int for integrals:  $\int_a^b f(x) \, dx$
  - lim for limits:  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$
- log for logarithms:  $\log_b(a)$
  - ln for natural logarithms:  $\ln(a)$
  - exp for exponentials:  $e^x$
  - overline for overlines:  $\overline{a}$
  - underline for underlines:  $\underline{a}$
  - vec for vectors:  $\vec{a}$
  - hat for hats:  $\hat{a}$

and adding more context to formulas:

$$\underbrace{\hspace{1cm}}_b$$

underbrace for underbraces:

$$\overbrace{\hspace{1cm}}^a$$

overbrace for overbraces:

If we want to display vectors or matrices, we can use the pmatrix environment. This is a nice way to display matrices in a clean and readable way.  
This is a matrix with m rows and n columns. The pmatrix environment is used to create a matrix with parentheses around it. We can also use the bmatrix environment for square brackets, or the vmatrix environment for vertical bars.  
Personally, I prefer using psmallmatrix, bsmallmatrix, vsmallmatrix for my summaries. This is a nice way to display matrices in a clean and readable way.  
Generally I use psmallmatrix for vectors, and bsmallmatrix for matrices. vsmallmatrix is usually used in a context where I want to display multiple matrices next to each other (like when showing how the Gauss algorithm works).

$(1\ 2\ 3)$  and  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  are both vectors, but the first one is a row vector and the second one is a column vector.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

is a matrix with 2 rows and 3 columns.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

is a matrix with 2 rows and 3 columns, but it is displayed in a different way.

**KR Title** This is a KR. This "Kochrezept" is a recipe for a specific exercise type. It should be used for very important recipes and concepts.  
**First step** This is the first step of the recipe.

- Paragraphs are used to achieve coarse-grained separation of the steps.
- Lists within the paragraphs are used to achieve fine-grained separation of the steps.

**Second step** and so on.

**conclusion**  
This is the conclusion of the recipe. It should summarize the steps and provide a final overview of the process.

**Code Title** This is a code block, where general concepts are explained.

```
1 // Indentation matters in these blocks, so all the way to the left!
2 def exampleFunction(param1, param2):
3     // This is a comment
4     return param1 + param2
```

Depending on the programming language, we need to specify the language for the code block. Style should always be set to style=basesmol.

```
1 // Indentation matters in these blocks, so all the way to the left!
2 int example_function(int param1, int param2) {
3     // This is a comment
4     return param1 + param2;
5 }
```

**Important note:** Within lstlisting blocks we should only include ENGLISH comments. Within the lstlisting environment letters like ä, ö, ü, ß and any other special characters are not supported!

**Example Code Title** This is an example code block. This should show specific implementations or examples.

```
1 # Indentation matters in these blocks, so all the way to the left!
2 def example_function(param1, param2):
3     # This is a comment
4     return param1 + param2
```

Grenzwerte und Konvergenz

Grenzwerte von Funktionen

**Konvergenz einer Funktion** Die Funktion  $y = f(x)$  hat an der Stelle  $x_0$  den Grenzwert  $y_0$  falls:  
für jede Folge  $(x_n)$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$  gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = y_0$   
Bmk: Die Stelle  $x_0$  muss nicht im Definitionsbereich  $D$  sein.

Konvergenz/Divergenz

- Konvergenz: Funktion mit Grenzwert  $x \rightarrow \infty$
- Divergenz: Funktion ohne Grenzwert  $x \rightarrow \infty$
- Bestimmte Divergenz: Funktion mit  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pm \infty$

Rechnen mit Grenzwerten von Funktionen

- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- Sei  $f \leq g$ , so ist  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- Falls  $g_1 \leq f \leq g_2$  und  $\lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_2(x)$ , so existiert  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x)$

Wichtige Grenzwerte

Harmonische Folge:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Geometrische Folge:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad (q < 1)$$

n-te Wurzel:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$$

Eulerzahl:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Spezielle Grenzwerte

$n \rightarrow \infty$

|                                                    |                                       |                                                                |                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $\frac{1}{n} \rightarrow 0$                        | $e^n \rightarrow \infty$              | $\frac{1}{n^k} \rightarrow 0 \quad \forall k \in \mathbb{R}^+$ | $\frac{\log n}{n-1} \rightarrow 1$     |
| $c + \frac{1}{n} \rightarrow c$                    | $e^{-n} \rightarrow 0$                | $(1 + \frac{1}{n})^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$                | $\frac{n^n}{n!} \rightarrow \infty$    |
| $\frac{c \cdot n}{c^n} \rightarrow 0$              | $\frac{e^n}{n^c} \rightarrow \infty$  | $(1 + \frac{1}{n})^c \rightarrow 1$                            | $(\frac{n}{n+c})^n \rightarrow e^{-c}$ |
| $\sqrt[n]{n} = n^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$      | $\frac{\sin n}{n} \rightarrow 0$      | $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$                            | $\frac{\ln n}{n} \rightarrow 0$        |
| $\sqrt[n]{n!} \rightarrow \infty$                  | $\arctan n \rightarrow \frac{\pi}{2}$ | $(1 + \frac{c}{n})^n \rightarrow e^c$                          | $\frac{c^n}{n!} \rightarrow 0$         |
| $\frac{1}{n} \sqrt[n]{n!} \rightarrow \frac{1}{e}$ | $\ln n \rightarrow \infty$            | $(1 - \frac{1}{n})^n \rightarrow \frac{1}{e}$                  |                                        |

$$n^c \cdot q^n \rightarrow 0 \quad \forall c \in \mathbb{Z}, 0 \leq q \leq 1$$

$$n(\sqrt[n]{c} - 1) \rightarrow \ln c \quad \forall c > 0$$

$n \rightarrow 0$

|                                                    |                                                |                                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| $\ln n \rightarrow -\infty$                        | $\frac{\sin n}{n} \rightarrow 1$               | $\frac{1}{\arctan n} \rightarrow 1$ |
| $n \log n \rightarrow 0$                           | $\frac{\cos(n)-1}{n} \rightarrow 0$            | $\frac{e^n-1}{n} \rightarrow 1$     |
| $\frac{\log 1-n}{n} \rightarrow -1$                | $\frac{1}{\cos n} \rightarrow 1$               | $\frac{e^c n-1}{n} \rightarrow c$   |
| $\frac{c^n-1}{n} \rightarrow \ln c, \forall c > 0$ | $\frac{1-\cos n}{n^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ | $(1+n)^{\frac{1}{n}} \rightarrow e$ |

Grenzwert Berechnen Tricks

- " $\frac{\infty}{\infty}$ " Trick: Erweitern mit  $\frac{1}{n^k}$  (k: grösster Exponent)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^6 - n^3}{7n^6 + n^6 - 3} \cdot \frac{\frac{1}{n^6}}{\frac{1}{n^6}} = \frac{2}{7}$$

- " $\frac{\infty}{\infty}$ " Trick: Erweitern mit  $\frac{1}{a^k}$  (a: grösste Basis, k: kleinster Exponent)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^{n-1} + 2^{n+1}}{7^n + 5} \cdot \frac{\frac{1}{7^{n-1}}}{\frac{1}{7^{n-1}}} = \frac{1}{7}$

- " $\infty - \infty$ " Trick: Erweitern mit  $\sqrt{\dots} + \sqrt{\dots}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 + 1}) = 1/2$$

- e-like...: Trick: umformen zu  $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \Rightarrow e^a$

Grenzwerte von Folgen

**Formelle Grenzwert Definition** Folgende Aussagen sind äquivalent:

- 1.  $(a_n)_{n \geq 1}$  konvergiert gegen  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$
- 2.  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$ , sodass  $|a_n - l| < \varepsilon \quad \forall n \geq N$ .

Bem:  $l$  bezeichnet den Grenzwert  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

**Einzigartigkeit Grenzwert** Es gibt max. ein  $l \in \mathbb{R}$  für  $a_n$  mit dieser Eigenschaft (max. 1 Grenzwert)

**Rechenregeln mit Folgen** Sei  $(a_n)_{n \geq 1}, (b_n)_{n \geq 1}$  konvergente Folgen mit  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

- 1.  $(a_n \pm b_n)_{n \geq 1}$  konvergent,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$ .
- 2.  $(a_n \cdot b_n)_{n \geq 1}$  konvergent,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$ .
- 3.  $(a_n \div b_n)_{n \geq 1}$  konvergent,  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \div b_n) = a \div b$ .  
(solange  $b_n \neq 0 \quad \forall n \geq 1$  und  $b \neq 0$ )
- 4. Falls  $\exists K \geq 1$  mit  $a_n \leq b_n \quad \forall n \geq K$  folgt  $a \leq b$ .

**Konvergenz Folgen**

- 1. Für Brüche, grösste Potenz von n ausklammern und kürzen. Alle übrigen Brüche der Form  $\frac{a}{n^s}$  streichen, da diese zu 0 konvergieren.
- 2. Für Wurzeln in einer Summe, multipliziere mit der Differenz der Summe (bei a + b multipliziere mit a - b)
- 3. Anwendung Satz von Weierstrass/Sandwich-Satz
- 4. Vergleich mit Referenz-Folgen (Spezielle Grenzwerte)
- 5. Umformen/Tricks
- 6. Definition der Konvergenz/Limes anwenden
- 7. Suchen eines konvergenten Majoranten

**Divergenz Folgen**

- 1. Suche einen divergenten Minoranten
- 2. Für alternierende Folgen zeige, dass  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_p 1(n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} a_p 2(n)$

**Satz von Weierstrass**

- $(a_n)_{n \geq 1}$  monoton wachsend und nach oben beschränkt.  $\Rightarrow (a_n)_{n \geq 1}$  konvergiert mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n : n \geq 1\}$
- $(a_n)_{n \geq 1}$  monoton fallend und nach unten beschränkt.  $\Rightarrow (a_n)_{n \geq 1}$  konvergiert mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n : n \geq 1\}$

**Sandwich-Satz** Sei  $\lim a_n = \alpha$  und  $\lim c_n = \alpha$  und  $a_n \leq b_n \leq c_n, \forall n \geq k$  dann gilt  $\lim b_n = \alpha$

Bmk: k steht hier für eine beliebige natürliche Zahl, ab der die Bedingung immer gilt. Also wie bei der Grenzwert-Definition mit dem «Gürtel» um den Grenzwert - das gilt ja auch erst ab einem gewissen Wert n.  
Bmk 2: Einfach gesagt heisst das, dass wenn wir den Grenzwert von zwei Folgen bereits kennen und dieser für beide gleich ist, und wir eine dritte Folge haben die «zwischen» die zwei bekannten Folgen passt (daher Sandwich-Satz), wissen wir dass auch die dritte Folge den gleichen Grenzwert wie die anderen zwei hat.

**Binom Trick**

Gegeben die Summe von zweier (oder einer) Wurzel, kann man wie folgt vorgehen:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{(x+5) - (x-3)}{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}} \right)$$

**Substitutions Trick**

Hier ein Beispiel:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (1 - \cos(\frac{1}{x}))$$

Substituiere nun  $u = \frac{1}{x}$ :

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(u)}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{2u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos(u)}{2} = \frac{1}{2}$$

Grenzwerte von Reihen

**Nullfolgenkriterium**

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konvergiert  $\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$  aber die Umkehrung stimmt nicht.

**Cauchy Kriterium**

Die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  ist genau dann konvergent, falls:  
 $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$  mit  $|\sum_{k=n}^m a_k| < \varepsilon \quad \forall m \geq n \geq N$

**Leibniz Kriterium**

Sei  $(a_n)_{n \geq 1}$  monoton fallend, mit  $a_n \geq 0 \quad \forall n \geq 1$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . Dann konvergiert  $S := \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$  und es gilt:  $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$ .

**Majorantenkriterium**

Seien  $a_n, b_n \geq 0$  mit  $a_n \geq b_n \quad \forall n > n_0$ :  
 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert  $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} b_n$  konvergiert

**Logarithmus abschätzen**

$\log_b(n)$  kann mit  $n^\alpha \ (\alpha > 0)$  abgeschätzt werden.  
 $\ln(n) \leq \sqrt{n}$

**Reihen - Funktionen**

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k &= \frac{n \cdot (n+1)}{2} & \sum_{k=1}^n (2k-1)^2 &= \frac{n \cdot (4n^2-1)}{3} \\ \sum_{k=1}^n 2k-1 &= n^2 & \sum_{k=1}^n k^3 &= \left( \frac{n \cdot (n+1)}{2} \right)^2 \\ \sum_{k=1}^n 2k &= n(n+1) & \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \frac{n}{n+1} \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+2)}{6} \end{aligned}$$

**Minorantenkriterium**

Seien  $a_n, b_n \geq 0$  mit  $a_n \leq b_n \quad \forall n > n_0$ :  
 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  divergiert  $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} b_n$  divergiert

**Quotientenkriterium**

Sei  $(a_n)_{n \geq 1}$  mit  $a_n \neq 0 \quad \forall n \geq 1$  und:  $q = \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$   
Falls:  
•  $q < 1$  konvergiert  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  absolut  
•  $q > 1$  divergiert  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$   
Für  $\liminf a_n = 1$  keine Aussage möglich  
**!!! für die harmonische Reihe ist dieses Kriterium nicht anwendbar/gültig !!!**

**Wurzelkriterium**

Es sei:  $q = \sqrt[n]{|a_n|}$   
Dann gilt:  
•  $q < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergiert  
•  $q > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  und  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  divergieren  
•  $q = 1 \Rightarrow$  keine Aussage möglich