



苏州大学


SOOCHOW UNIVERSITY

《结构化学》 第三章

樊建芬

第三章 分子对称性和分子点群

Chapter 3 Molecular Symmetry and Group Theory



生物界的对称性

对称是一种美！






苏州大学

SOOCHOW UNIVERSITY

《结构化学》第三章

樊建芬



§ 3.1 分子的对称性

3.1.1 对称操作和对称元素 ▶

3.1.2 分子的对称操作 ▶

§ 3.2 分子点群

3.2.2 分子的点群 ▶

3.2.3 群的乘法表 ▶


3.2.4 分子偶极矩与旋光性的预测 ▶



§ 3.1 分子的对称性

3.1.1 对称操作和对称元素

例：



以B原子为支点在分子平面上转
 120° 、 240°

分子可以完全复原。

动作

对称操作—操作前后, 分子完全复原。

几何要素

对称元素—实现对称操作所依赖的点、线、面。





3.1.2 分子的对称操作

(1) **恒等元素 (E)** 和恒等操作 (\hat{E}) \rightarrow 不动
每个分子都有

(2) **旋转轴 (C_n)** 和旋转操作 (\hat{C}_n)
 旋转轴的轴次 逆时针旋转 $2\pi/n$

例1: 苯







n 值最大的轴——**主轴**



例2: BF_3

主轴



$$\hat{C}_6^1, \hat{C}_6^2, \dots, \hat{C}_6^6 = \hat{E}$$

分析分子对称性时,
重点关注 $\left\{ \begin{array}{l} \text{主轴} \\ C_2 \text{轴} \end{array} \right.$

一个 C_n 轴, 可以产生 n 个对称操作

$$\hat{C}_n^1, \hat{C}_n^2, \hat{C}_n^3, \dots, \hat{C}_n^n$$

\hat{C}_n^1 表示旋转 $2\pi/n$

\hat{C}_n^2 表示旋转 $2 \times 2\pi/n$


依次类推

$$\hat{C}_n^n \longleftrightarrow \hat{E}$$



(3) 对称面 (σ) 和反映操作 ($\hat{\sigma}$)
(镜面) (照镜子)

例1: 苯




分子平面 \rightarrow 对称面
 σ_h

对称面分成三类:

- ① 垂直主轴的对称面: σ_h
- ② 包含主轴的对称面: σ_v
- ③ 包含主轴, 且平分两个 C_2 轴夹角: σ_d




例2: H_2O



例3: BF_3

主轴: C_3



次轴: 3个 C_2



对称面: 4个


1个 σ_h \longleftrightarrow 垂直主轴的分子平面

3个 σ_d \longleftrightarrow 包含主轴、平分2个 C_2 轴的平面





(4) 对称中心 (i) 和反演操作 (\hat{i})



如果坐标原点设置在对称中心处,

$$(x, y, z) \xrightarrow{\hat{i}} (-x, -y, -z)$$

映转轴

(5) 象转轴 (S_n) 和旋转反映操作 (\hat{S}_n)

旋转 $2\pi/n$,
并作垂直此轴的反映操作

复合操作


$$\hat{S}_n = \hat{\sigma}_h \hat{C}_n = \hat{C}_n \hat{\sigma}_h \quad \text{顺序无关}$$



例1: CH_4

本身并不存在 C_4 和 σ_h

但存在 S_4



无 C_n 和 σ_h , S_n 可有可无。

通常, 有 C_n 和 σ_h , 必有 S_n 。






例1: CH₄


本身并不存在C₄和σ_h

但存在 S₄




例2: BF₃

$$\hat{S}_3 = \hat{C}_3 \hat{\sigma}_h = \hat{\sigma}_h \hat{C}_3$$






例3: 苯



无C_n和σ_h, 可能存在S_n。

通常, 有C_n和σ_h, 必有S_n, S_n与C_n轴重合



Notes:

- 1) 无 C_n 和 σ_h , “可能” 存在独立的 S_n , 如 CH_4
- 2) 有 C_n 和 σ_h , 必有 S_n , 此时 S_n 与 C_n 轴重合, 如苯、 BF_3
- 3) 奇数次的映轴, 不能独立存在, 分子中必存在旋转轴 及 σ_h
- 4) 只有偶数次的映轴才有可能是独立的对称元素



5种对称元素

(1) 恒等元素 每个分子都有

(2) 旋转轴 **主轴** 次轴 **C₂轴**

(3) **对称面** {
① σ_h : 垂直主轴的对称面
② σ_v : 包含主轴的对称面
③ σ_d : 包含主轴, 且平分两个 C₂ 轴夹角

区别


(4) 对称中心

(5) 象转轴 (映轴) 旋转+反映



一个分子中可能存在多个对称元素

假设有一个平面的 A_5 分子



对称操作借助于对称元素来实施。

一个对称元素，可以产生若干个对称操作。



各类对称元素产生的对称操作

1) C_n 轴, 产生 n 个对称操作 $\hat{C}_n^1, \hat{C}_n^2, \hat{C}_n^3, \dots, \hat{C}_n^n = \hat{E}$

2) σ 对称面, 产生2个对称操作 $\hat{\sigma}^1, \hat{\sigma}^2 = \hat{E}$

3) i 对称中心, 产生2个对称操作 $\hat{i}^1, \hat{i}^2 = \hat{E}$

4) 象转轴 (映轴) S_n

只有偶数次的映轴才有可能独立的对称元素

当 n 为偶数时, 生成 n 个操作: $\{\hat{S}_n^1, \hat{S}_n^2, \hat{S}_n^3, \dots, \hat{S}_n^n = \hat{E}\}$



§ 3.2 分子点群

3.2.1 群的定义

点群的元素之间的“乘法”，是广义的，表示一个操作后接另一个操作。

集合中元素之间定义一种运算（通常称为“乘法”），满足下面四个条件的集合方能称为群。

(1)封闭性：任意两个元素之积还在集合中；

(2)结合律：任意三个元素 A, B, C ，满足 $(AB)C = A(BC)$

(3)有单位元素：如 E ，对群中任意元素 R ，有 $ER = RE = R$ ；

(4)有逆元素：任意元素 R 都有逆元素 R^{-1} ，

满足 $RR^{-1} = R^{-1}R = E$ 。

例： $\hat{C}_3^1 \hat{C}_3^2 = \hat{E}$

群的特征：具有封闭性、结合律、恒等元素、逆元素



群的阶：群中元素的个数。

群的实例：

1. 全体正、负整数和零对于**加法**运算构成一个群，

记为： $G=\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$

无穷阶群

2. {立定、向右转，向左转，向后转}对于这四个**动作的乘积**组成一个群。

4阶群

3. 氨分子对称操作的完全集合对对称操作的**乘积**构成一个群，

记为： $G=\{ \hat{E}, \hat{C}_3, \hat{C}_3^2, \hat{\sigma}_v, \hat{\sigma}_v'', \hat{\sigma}_v''' \}$

6阶群



伽罗瓦, E.

伽罗瓦Evariste Galois (1811~1832)

法国数学家。他反对学校的苛刻校规,抨击校长在七月政变中的两面行为,以至于1830年2月被开除之后,他进一步积极参加政治活动,导致1831年两次被捕入狱。出狱不久伽罗瓦即死于一场决斗,年仅21岁。决斗前夜,他写了绝笔信,整理了他的数学手稿,概述了他得到的主要成果。


伽罗瓦的最主要成就是提出了群的概念,用群论彻底解决了根式求解代数方程的问题,而且由此发展了一整套关于群和域的理论,为了纪念他,人们称之为伽罗瓦理论。



分子中所有对称操作的集合 \rightarrow 分子点群

分子所有对称操作的集合组成的群成为分子点群，由于在对称操作下，分子中至少有一点保持不动，因此称为分子点群。

例：H₂O



$$\{\hat{E}, \hat{C}_2, \hat{\sigma}_v, \hat{\sigma}_v'\} = C_{2v}$$


熊夫里符号

SchÖnflies(熊夫利斯)




熊夫里符号隐含了点群中代表性的对称元素符号

例：水分子的 C_{2v} 群，
表明水分子中有 C_2 轴以及 σ_v



例：苯分子的 D_{6h} 群，
表明苯分子中有彼此垂直的 C_6 和 C_2 轴，
以及 σ_h



具有高度对称性的分子，找全全部的对称操作是不容易的，
但是我们能快速地确定分子所属的点群。

3.2.2 分子的点群

(1) 立方群


这类分子有多个高次旋转轴
具有特殊的对称构型

① T_d 群： 正四面体构型的分子。


如 CH_4 , CCl_4 , SiH_4



甲烷



P_4



正四面体结构，共有24个对称操作




② O_h 群：正八面体和立方体构型的分子。

如 SF_6 , $Fe(CN)_6]^{4-}$, 立方烷



如： SF_6 , $[Fe(CN)_6]^{4-}$






具有高度对称性、高致密性、
高张力能及高稳定性等特点

八硝基立方烷——高能材料
(美国华盛顿海军研究实验室, 2000)



③ I_h 群：正十二面体、正二十面体以及 C_{60} 分子等属于该群。



12个五元环
20个六元环 → 32面体



(2) D 类群 (二面体群)

有 C_n ,


n 个垂直于该轴的 C_2 轴

① D_{nh} 群 $\leftarrow D$ 类群 + σ_h

② D_{nd} 群 $\leftarrow D$ 类群 + σ_d ▶ 例2

③ D_n 群 $\leftarrow D$ 类群, 无 σ ▶ 例3

例1: BF_3 D_{3h} 群



C_3 , 3个 C_2 , σ_h (分子平面)

C 类群




顺序



例2：交叉式乙烷

C_3 , 3个 C_2 , σ_d



D_{3d} 群




过C—C中点，垂直于 C_3



例3：非交叉非重迭式乙烷



C_3 , 3个 C_2 , 无 σ $\rightarrow D_3$ 群





(3) C类群

有 C_n

无垂直于该轴的 C_2

轴向群

① C_{nh} 群 $\leftarrow C_n + \sigma_h$


② C_{nv} 群 $\leftarrow C_n + n \text{ 个 } \sigma_v$

③ C_n 群 \leftarrow 仅有 C_n , 无 σ

例3: $\text{CH}_3\text{-CCl}_3$


非交叉非重迭式

C_3 群




例1: 反式 CHCl=CHCl

C_2 垂直于分子平面



例2: NH_3

C_3 C_{3v} 群





D类群和C类群，常常被称作有轴群。

相对而言，D类群对称性更高。

有 C_n ， n 个垂直于该轴的 C_2 轴 \rightarrow D类群

① D_{nh} 群 $\leftarrow D$ 类群 + σ_h

② D_{nd} 群 $\leftarrow D$ 类群 + σ_d

③ D_n 群 $\leftarrow D$ 类群，无 σ

有 C_n ，无垂直于该轴的 C_2 \rightarrow C类群


① C_{nh} 群 $\leftarrow C_n$ + σ_h


② C_{nv} 群 $\leftarrow C_n$ + n 个 σ_v

③ C_n 群 \leftarrow 仅有 C_n ，无 σ



分子点群的确定








非线性分子


有 C_n

σ

C_s





$N_3S_2PCl_4O_2$



i

C_i



无 C_n


S_n



S_n

1, 3, 5, 7-四甲基环辛四烯


反之

C_1





1,3,5,7-四甲基环辛四烯





不能算是 C_2 群，
按轴次高的算，划入 S_4 群





确定点群一定要按着上述顺序

例1：苯



$$C_6 + 6C_2 + \sigma_h \rightarrow D_{6h} \text{群}$$

*D*类群

D_{6d} ✗



苏州大学


SOOCHOW UNIVERSITY

《结构化学》 第三章

樊建芬

不存在 S_1 和 S_2 群

例2: $N_3S_2PCl_4O_2$





S_1 σ

$$S_1 = \sigma C_1 = \sigma$$

C_s 群

× S_1 群

例3: 完全交叉式



$$S_2 = \sigma C_2 = i$$

C_i 群


× S_2 群

后




例4: CH_2Cl_2

C_{2v} 群




例5: B_2H_6

D_{2h} 群





例6: 丙二烯

D_{2d} 群






例7：二茂铁 重叠式




与乙烷类似，
乙烷分子重叠式结构属 D_{3h} 群，交叉式结构属 D_{3d} 群。



例8：五棱竹烷





例9：宝塔烷






例10：椅式环己烷




例11：



3个 C_2 轴
类似于左例

D_{3d} 群





3.2.3 群的乘法表

群的乘法表是不可约表示理论、特征标表的基础

群的元素之间的“乘法”即一个操作后接另一个操作。

群的特征：具有封闭性、结合律、恒等元素、逆元素

1) 根据群的封闭性，任意两个元素之积还在集合中；

2) 任意三个元素 A, B, C ，满足 $(AB)C = A(BC)$


3) 对群中任意元素 R ，有 $ER = RE = R$

4) 逆元素 R^{-1} ， $RR^{-1} = E$ ，如 $\hat{C}_3^1 \hat{C}_3^2 = \hat{E}$ $\left\{ \begin{array}{l} (\hat{C}_3^1)^{-1} = \hat{C}_3^2 \\ (\hat{C}_3^2)^{-1} = \hat{C}_3^1 \end{array} \right.$



C_{2v} 乘法表

C_{2v}	\hat{E}	\hat{C}_2	$\hat{\sigma}_v$	$\hat{\sigma}_v'$
\hat{E}	\hat{E}	\hat{C}_2	$\hat{\sigma}_v$	$\hat{\sigma}_v'$
\hat{C}_2	\hat{C}_2	\hat{E}	$\hat{\sigma}_v'$	$\hat{\sigma}_v$
$\hat{\sigma}_v$	$\hat{\sigma}_v$	$\hat{\sigma}_v'$	\hat{E}	\hat{C}_2
$\hat{\sigma}_v'$	$\hat{\sigma}_v'$	$\hat{\sigma}_v$	\hat{C}_2	\hat{E}



$$\hat{C}_2 \hat{\sigma}_v = \hat{\sigma}_v'$$

$$\hat{C}_2 \hat{\sigma}_v' = \hat{\sigma}_v$$

$$\hat{\sigma}_v \hat{\sigma}_v' = \hat{C}_2$$

- 1) $ER=RE=R$ 乘法表中第一行、第一列不变
- 2) C_2 、 σ 分别产生2个对称操作。
- 3) 每一行、每一列，每个元素出现一次。



C_{3v} 乘法表

\hat{E} 不一定出现在对角线上的

氨分子对称操作的乘积表

C_{3v}	\hat{E}	\hat{C}_3	\hat{C}_3^2	$\hat{\sigma}'_v$	$\hat{\sigma}''_v$	$\hat{\sigma}'''_v$
\hat{E}	\hat{E}	\hat{C}_3	\hat{C}_3^2	$\hat{\sigma}'_v$	$\hat{\sigma}''_v$	$\hat{\sigma}'''_v$
\hat{C}_3	\hat{C}_3	\hat{C}_3^2	\hat{E}	$\hat{\sigma}'''_v$	$\hat{\sigma}'_v$	$\hat{\sigma}''_v$
\hat{C}_3^2	\hat{C}_3^2	\hat{E}	\hat{C}_3	$\hat{\sigma}''_v$	$\hat{\sigma}'''_v$	$\hat{\sigma}'_v$
$\hat{\sigma}'_v$	$\hat{\sigma}'_v$	$\hat{\sigma}''_v$	$\hat{\sigma}'''_v$	\hat{E}	\hat{C}_3	\hat{C}_3^2
$\hat{\sigma}''_v$	$\hat{\sigma}''_v$	$\hat{\sigma}'''_v$	$\hat{\sigma}'_v$	\hat{C}_3^2	\hat{E}	\hat{C}_3
$\hat{\sigma}'''_v$	$\hat{\sigma}'''_v$	$\hat{\sigma}'_v$	$\hat{\sigma}''_v$	\hat{C}_3	\hat{C}_3^2	\hat{E}

$$\hat{C}_3^1 \hat{C}_3^2 = \hat{E}$$

沿对角线都是对称的


操作顺序无关

目录



3.2.4 分子偶极矩与旋光性的预测

对称性



分子中核与电子的分布




偶极矩
旋光性


3.2.4.1 分子偶极矩的预测

偶极矩是正、负电荷中心间的距离和电荷中心所带电量的乘积，它是一个矢量，方向规定为从正电中心指向负电中心，用符号 μ 表示，单位为D。偶极矩的数学表达式为 $\mu=qd$

①分子中仅有 C_n 轴时，偶极矩在此轴上。




②分子中仅有一对称面时，偶极矩在此平面上。







- ③分子中有多个对称面时，
偶极矩在对称面的交线上。

例：NH₃分子



- ④ 有对称中心
或两个对称元素交于一点
或多个不重合的轴


无偶极矩





3.2.4.2 分子旋光性的预测

分子有无旋光性就看它**是否能跟它的镜像重合**。如果两者能重合，则该分子没有旋光性；反之，分子具有旋光性。



分子是否能与其镜像重合，与对称性有关。

分子有无旋光性的对称性判据：有象转轴的分子无旋光性；无象转轴的分子有旋光性。







$$S_1 = \sigma, S_2 = i$$

具有
 对称面 σ
 对称中心 i
 象转轴 S_{4n} ($n=1, 2, \dots$)
 的分子无旋光性；

否则有旋光性，如 C_1 、 C_n 、 D_n 群的分子



一些具有旋光性的分子




非交错非重叠


这些分子没有对称面 σ 、对称中心 i 、象转轴 S_{4n} ($n=1,2,\dots$)




一些无旋光性的分子



象转轴




对称面、对称中心



对称面、对称中心



对称面(分子平面)



对称面(分子平面)
对称中心



蘇州大學

SOOCHOW UNIVERSITY

《结构化学》 第三章

樊建芬

Thank you for your attention!



養天地正氣
法古今完人

楊永清題

