
a
Benefit and treatment uptake
Predicted
DR
Historical use
Q1
Q2
Q3
Q4
6.8
36/527
11.2
59/527
5.3
28/526
4.6
24/527
−60
0
60
0
15
Mortality benefit (pp)
Use (%)
Counts: treated / total
b
Clinical profiles by quartile
Q1
Q2
Q3
Q4
Age (years)
64.5
64.3
63.1
70.9
BUN (mg/dL)
27.2
23.2
27.7
44.8
GCS
13.1
14.1
13.2
12.2
MAP min (mmHg)
70.2
71.2
68.7
67.3
Baseline
Mortality (%)
17.8
14.8
24.9
39.5
Outcome
Medical svc (%)
23.5
29.2
41.8
45.4
Cardiac ICU (%)
60.5
54.8
28.3
27.1
Care
FiO₂ rec. (%)
23.5
18.0
34.2
42.9
Vent. rec. (%)
22.8
14.8
29.5
38.9
Recorded
Within-row z
−2
0
2
c
Subsequent Hb response
Early RBC 0–6 h; follow-up Hb 6–24 h
Overall
Q1
Q2
Q3
Q4
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Hb change difference (g/dL)
d
Capacity-constrained allocation
RITE
All variables
Risk reduction vs random (pp)
6
3
0
RITE − all (pp) · Observed capacity 7.0%
4
0
0
10
20
30
Treatment capacity (%)