

성인병 5종 분류 및 진단 수치 정리

Ballife 질환 선택지 수정 권장안 - 비만 제외 버전

질환	현재 분류 판단	권장 수정 방향	핵심 진단 수치
이상지질혈증 (기준: 고지혈증)	1형/2형은 부적절	수치 항목별 분류로 수정	LDL - C $\geq$ 160, TG $\geq$ 200, HDL - C $<$ 40, 총콜레스테롤 $\geq$ 240 mg/dL 등
고혈압	경증/중증은 애매함	고혈압 전단계/1기/2기/수축기 단독으로 수정	진료실 기준 140/90 mmHg 이상
골다공증	골감소증/골다공증은 적절	대체로 유지, 필요 시 중증 골다공증 추가	T - score $\leq$ - 2.5
당뇨병	1형/2형/임신성은 대체로 적절	기타 당뇨병 추가 권장	FPG $\geq$ 126, OGTT 2h $\geq$ 200, HbA1c $\geq$ 6.5% 등
통풍	단계 분류는 대체로 적절	명칭을 임상 단계명으로 정교화	요산 $\geq$ 7.0 mg/dL은 고요산혈증 기준, 통풍 확진은 증상/결정/영상 종합

주의: 이 문서는 웹서비스의 질환 선택지와 위험 안내 문구 설계를 위한 자료이다. 사용자의 입력값만으로 질병을 확진하는 구조로 사용하면 안 된다. 실제 진단은 의료기관 검사와 의사 판단이 필요하다.

1. 전체 권장 수정 사항

질환	현재 코드	권장 코드명/라벨	수정 이유
고지혈증	hyperlipidemia: 1형/2형	dyslipidemia: 고총콜레스테롤혈증, 고LDL, 고중성지방, 저HDL, 혼합형	고지혈증은 당뇨병처럼 1형/2형으로 일반 분류하지 않음. 이상지질혈증은 지질 수치 항목별 판단이 적절함.
고혈압	mild/severe	PREHYPERTENSION, STAGE1, STAGE2, ISOLATED_SYSTOLIC	대한고혈압학회 분류는 전단계, 1기, 2기, 수축기 단독 고혈압 체계가 명확함.
골다공증	osteopenia/osteoporosis	OSTEOPENIA, OSTEOPOROSIS, 필요 시 SEVERE_OSTEOPOROSIS	골감소증/골다공증은 T - score 기반 공식 판정과 맞음. 중증은 골절 병력까지 받을 때만 추가 권장.
당뇨병	type1/type2/GESTATIONAL	TYPE1, TYPE2, GESTATIONAL, OTHER	공식 분류상 1형, 2형, 임신성, 기타 당뇨병으로 정리하는 것이 안정적임.
통풍	ASYMPTOMATIC/ACUTE/INTERMITTENT/CHRONIC	HYPERURICEMIA, ACUTE_GOUT, INTERCRITICAL_GOUT, CHRONIC_TOPHACEOUS_GOUT	현재 의미는 맞지만 코드명과 라벨을 임상 단계명에 맞게 더 명확히 하는 것이 좋음.

권장 원칙: 회원가입 화면에서는 “진단” 버튼이 아니라 “병원에서 진단받았거나 본인이 알고 있는 질환 선택”으로 문구를 두는 것이 안전하다.

2. 이상지질혈증 - 기존 고지혈증

공식 용어는 “ 이상지질혈증 ” 이 더 정확하다. 총콜레스테롤, LDL - 콜레스테롤, 중성지방, HDL - 콜레스테롤 중 어떤 항목이 이상인지에 따라 분류하는 것이 서비스 데이터 구조에 적합하다.

진단/판정 수치

항목	수치 기준	서비스 분류 권장
총콜레스테롤	> = 240 mg/dL 또는 지질강하제 복용 중	HIGH_TOTAL_CHOLESTEROL
LDL - 콜레스테롤	> = 160 mg/dL 또는 지질강하제 복용 중	HIGH_LDL
중성지방	> = 200 mg/dL	HIGH_TG
HDL - 콜레스테롤	< 40 mg/dL 일부 기준은 남자 <40, 여자 <50 사용	LOW_HDL
혼합형	여러 지질 항목이 동시에 이상	MIXED

개인별 달라지는 점

LDL - C 치료 목표는 심혈관질환, 당뇨병, 만성콩팥병 등 위험도에 따라 더 낮아질 수 있다. 따라서 앱에서는 “ 진단 기준 해당 가능 ” 과 “ 개별 치료 목표 ” 를 분리해서 다루는 것이 안전하다.

권장 선택지

value	label
NONE	해당 없음
HIGH_TOTAL_CHOLESTEROL	고총콜레스테롤혈증
HIGH_LDL	고LDL콜레스테롤혈증
HIGH_TG	고중성지방혈증
LOW_HDL	저HDL콜레스테롤혈증
MIXED	혼합형 이상지질혈증

3. 고혈압

현재 경증/중증보다 1기/2기 중심으로 바꾸는 것이 공식 분류에 더 가깝다. 진료실 혈압뿐 아니라 가정혈압/활동혈압 기준도 다르므로 수치 입력 기능을 만들 경우 측정 방식 필드를 함께 두는 것이 좋다.

진료실 혈압 분류

분류	수축기혈압	이완기혈압	서비스 분류 권장
정상 혈압	< 120	그리고 < 80	NONE 또는 NORMAL
주의 혈압	120 - 129	그리고 < 80	ELEVATED
고혈압 전단계	130 - 139	또는 80 - 89	PREHYPERTENSION
고혈압 1기	140 - 159	또는 90 - 99	STAGE1
고혈압 2기	> =160	또는 > =100	STAGE2
수축기 단독 고혈압	> =140	그리고 <90	ISOLATED_SYSTOLIC

진단 기준 차이

측정 방식	고혈압 판단 기준
진료실 혈압	> = 140/90 mmHg
가정혈압 또는 주간 활동혈압	> = 135/85 mmHg
24시간 활동혈압 평균	> = 130/80 mmHg

개인별 달라지는 점

진단 수치는 표준화되어 있으나 치료 목표는 당뇨병, 만성콩팥병, 심혈관질환, 뇌졸중 병력 등 동반질환과 위험도에 따라 달라질 수 있다.

4. 골다공증

현재 골감소증/골다공증 분류는 공식 판정 체계와 맞다. 단, T - score는 주로 폐경 이후 여성과 50세 이상 남성에서 사용한다. 소아, 청소년, 폐경 전 여성, 50세 미만 남성은 Z - score를 참고한다.

골밀도 T-score 판정

분류	T-score 기준	서비스 분류 권장
정상	≥ -1.0	NONE 또는 NORMAL
골감소증	$-2.5 < \text{T-score} < -1.0$	OSTEOPENIA
골다공증	≤ -2.5	OSTEOPOROSIS
중증 골다공증	골다공증 + 취약골절 병력	SEVERE_OSTEOPOROSIS

개인별 달라지는 점

T - score는 젊은 성인 평균 골밀도와 비교한 값이고, Z - score는 같은 연령대와 비교한 값이다. 따라서 나이, 성별, 폐경 여부에 따라 해석 방식이 달라진다. 앱에서 골다공증 여부를 자동 판정하려면 나이/성별/폐경 여부 또는 검사 결과지의 최종 판정을 함께 받아야 한다.

권장 선택지

value	label
NONE	해당 없음
OSTEOPENIA	골감소증
OSTEOPOROSIS	골다공증
SEVERE_OSTEOPOROSIS	중증 골다공증

5. 당뇨병

현재 1형/2형/임신성 분류는 대체로 맞다. 공식 분류에 맞추려면 기타 당뇨병을 추가하는 것이 좋다.

당뇨병 진단 기준

검사 항목	당뇨병 진단 기준
당화혈색소 HbA1c	$\geq 6.5\%$
공복 혈장 포도당	8시간 이상 공복 후 ≥ 126 mg/dL
75g 경구 포도당 부하검사 2시간 후 혈장 포도당	≥ 200 mg/dL
무작위 혈장 포도당 + 전형적 증상	다뇨, 다음, 설명되지 않는 체중감소가 있으면서 ≥ 200 mg/dL
확진 주의	명백한 고혈당이 아니면 서로 다른 날 반복검사 필요. 같은 날 2개 이상 기준을 충족하면 바로 진단 가능.

당뇨병 전단계 참고

항목	전단계 기준
HbA1c	5.7 - 6.4%
공복혈당장애	공복 혈장 포도당 100 - 125 mg/dL
내당능장애	75g OGTT 2시간 혈장 포도당 140 - 199 mg/dL

개인별 달라지는 점

진단 기준은 표준화되어 있으나 혈당 조절 목표는 나이, 당뇨병 유병 기간, 합병증, 동반질환, 저혈당 위험, 기대여명 등에 따라 달라진다. 임신 중 혈당 목표도 일반 성인과 다르다.

권장 선택지

value	label
NONE	해당 없음
TYPE1	1형 당뇨병
TYPE2	2형 당뇨병
GESTATIONAL	임신성 당뇨병
OTHER	기타 당뇨병

6. 통풍

현재 단계 분류는 대체로 맞다. 다만 “고요산혈증”은 통풍 확진명이 아니라 통풍 위험 상태 또는 선행 상태일 수 있으므로 라벨에서 “무증상 고요산혈증”으로 명확히 쓰는 것이 좋다.

통풍 관련 수치와 단계

항목	기준/설명	서비스 분류 권장
무증상 고요산혈증	혈청 요산 ≥ 7.0 mg/dL, 통풍 증상 없음	HYPERURICEMIA
급성 통풍성 관절염	급성 관절 통증/발적/부종 등 통풍 발작	ACUTE_GOUT
간헐기 통풍	급성 발작 사이 증상이 없는 기간	INTERCRITICAL_GOUT
만성 결절성 통풍	통풍결절, 만성 관절염 또는 관절 손상 동반 가능	CHRONIC_TOPHACEOUS_GOUT
치료 목표	통풍 환자 혈청 요산 ≤ 6.0 mg/dL, 통풍결절이 있으면 ≤ 5.0 mg/dL 목표를 사용하는 지침/문헌 있음	별도 수치 관리

진단 주의

혈청 요산이 높다고 모두 통풍은 아니다. 통풍 진단은 요산 수치, 관절 증상, 관절액의 요산 결정 확인, 영상 소견 등을 종합한다. 앱에서는 “고요산혈증”과 “통풍”을 구분해서 안내해야 한다.

권장 선택지

value	label
NONE	해당 없음
HYPERURICEMIA	무증상 고요산혈증
ACUTE_GOUT	급성 통풍성 관절염
INTERCRITICAL_GOUT	간헐기 통풍
CHRONIC_TOPHACEOUS_GOUT	만성 결절성 통풍

7. 비만 제외 최종 diseaseFields 예시

아래 코드는 선택지 구조 예시이다. 기존 DB에 저장된 값이 이미 있다면 name/value 변경 전에 마이그레이션 여부를 확인해야 한다.

```
const diseaseFields = [
  {
    name: 'dyslipidemia',
    label: '이상지질혈증 보유 여부',
    options: [
      { value: 'NONE', label: '해당 없음' },
      { value: 'HIGH_TOTAL_CHOLESTEROL', label: '고총콜레스테롤혈증' },
      { value: 'HIGH_LDL', label: '고LDL콜레스테롤혈증' },
      { value: 'HIGH_TG', label: '고중성지방혈증' },
      { value: 'LOW_HDL', label: '저HDL콜레스테롤혈증' },
      { value: 'MIXED', label: '혼합형 이상지질혈증' },
    ],
  },
  {
    name: 'hypertension',
    label: '고혈압 보유 여부',
    options: [
      { value: 'NONE', label: '해당 없음' },
      { value: 'PREHYPERTENSION', label: '고혈압 전단계' },
      { value: 'STAGE1', label: '1기 고혈압' },
      { value: 'STAGE2', label: '2기 고혈압' },
      { value: 'ISOLATED_SYSTOLIC', label: '수축기 단독 고혈압' },
    ],
  },
  {
    name: 'osteoporosis',
    label: '골다공증 보유 여부',
    options: [
      { value: 'NONE', label: '해당 없음' },
      { value: 'OSTEOPENIA', label: '골감소증' },
      { value: 'OSTEOPOROSIS', label: '골다공증' },
      { value: 'SEVERE_OSTEOPOROSIS', label: '중증 골다공증' },
    ],
  },
  {
    name: 'diabetes',
    label: '당뇨병 보유 여부',
    options: [
      { value: 'NONE', label: '해당 없음' },
      { value: 'TYPE1', label: '1형 당뇨병' },
      { value: 'TYPE2', label: '2형 당뇨병' },
      { value: 'GESTATIONAL', label: '임신성 당뇨병' },
      { value: 'OTHER', label: '기타 당뇨병' },
    ],
  },
  {
    name: 'gout',
    label: '통풍 보유 여부',
    options: [
      { value: 'NONE', label: '해당 없음' },
      { value: 'HYPERURICEMIA', label: '무증상 고요산혈증' },
      { value: 'ACUTE_GOUT', label: '급성 통풍성 관절염' },
      { value: 'INTERCRITICAL_GOUT', label: '간헐기 통풍' },
      { value: 'CHRONIC_TOPHACEOUS_GOUT', label: '만성 결절성 통풍' },
    ],
  },
];
```


8. 참고 출처

질환	주요 출처
이상지질혈증	한국지질 · 동맥경화학회, Dyslipidemia Fact Sheet in Korea 2022
고혈압	대한고혈압학회 2022년 제5판 고혈압 진료지침; 약학정보원 국내 고혈압 진료지침 해설
골다공증	질병관리청 국가건강정보포털, 골다공증/골감소증 정보
당뇨병	질병관리청 국가건강정보포털, 당뇨병 진단 및 검사
통풍	대한류마티스학회 한국인 통풍 치료 임상 진료 지침; 서울대학교병원 의학정보; 대한내과학회지 통풍 진료지침 관련 문헌

작성 기준일: 2026 - 05 - 26. 이후 진료지침이 개정될 수 있으므로 실제 서비스 배포 전 최신 학회 지침을 재확인해야 한다.