

	一	二	三					四		五
	1—6	7—12	13	14	15	16	17	18	19	20

得 分

一、单项选择题 (6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)


1. 若 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2$, 则 $D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} - 3a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - 3a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} - 3a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} =$ (A)

(A) 2; (B) -2; (C) 6; (D) -6.

2. 对二次曲面, 下列说法不正确的是 (A)

(A) 方程 $x^2 + 3y^2 - 2z^2 = 1$ 表示椭球面;(B) 方程 $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ 表示锥面;(C) 方程 $y^2 = x$ 表示抛物柱面;(D) 方程 $\frac{1}{4}x^2 - y^2 + \frac{1}{9}z^2 = 1$ 表示单叶双曲面.3. 三个平面 α, β, γ 在空间的位置关系如右图所示, 三个平面的方程 $A_i x + B_i y + C_i z = D_i$ ($i = 1, 2, 3$) 组成一个线性方程组, 系数矩阵和增广矩阵分别记为 A, \tilde{A} , 则

(B)

(A) $R(A) = 2, R(\tilde{A}) = 3$;(B) $R(A) = 2, R(\tilde{A}) = 2$;(C) $R(A) = 1, R(\tilde{A}) = 2$;(D) $R(A) = 1, R(\tilde{A}) = 1$.4. 设 A, B 为 3 阶矩阵, $|A| = 6, |B| = 2$, 则 $|AB^{-1}| =$ (A)

(A) 3; (B) 6; (C) 12; (D) 24.

5. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & x & y \\ 1 & y & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $y =$ (C)

(A) 1; (B) 2; (C) 0; (D) 3.

6. 已知 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $1, 2, -3$, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$

的一个标准形为 (B)

(A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$; (B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$;(C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$; (D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

得 分

二、填空题 (6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

7. 已知 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$, A_{11}, A_{12} 是行列式中元素 a_{11}, a_{12} 的代数余子式, 则 $A_{11} + A_{12} =$ 18. 点 $(1, 2, -3)$ 到平面 $2x + y - 2z - 19 = 0$ 的距离为 39. 若非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ kx_2 + 3x_3 = 2 \\ x_1 + 5x_2 + kx_3 = 3 \end{cases}$ 有无穷多解, 则 $k =$ 410. 已知 3 阶矩阵 A 满足 $|A - E| = |A + 2E| = |A + E| = 0$, 则 $|A^2 + E| =$ 2011. 若 A 为 3 阶方阵, 将 A 的第二行加到第三行得到 B , 再将 B 的第一行与

第二行交换得到 C , 使得 $QA = C$, 则 $Q =$ _____.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

12. 若 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2$ 是正定二次型, 则 t 的取值范围是 _____.

三、解答题 (5 小题, 每小题 8 分, 共 40 分)

得分

 13. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$.

解: $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 8 & -2 \\ 0 & 1 & 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 11 & -3 \\ 0 & 0 & 8 & 2 \end{vmatrix}$ 5 分

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 11 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{46}{11} \end{vmatrix}$$
 7 分

$$= -46$$
 8 分

得分

 14. 解方程 $AX = B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

解: $(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & -6 & -2 & -6 \end{pmatrix}$, 5 分

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -13 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & 24 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 11 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$
 6 分

故 $X = \begin{pmatrix} -1 & 11 \\ 1 & -12 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ 8 分

得分

 15. 求过点 $(1, 0, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x + 2y - z + 1 = 0 \\ 2x - y - 3z - 3 = 0 \end{cases}$ 垂直的平面

方程.

解: 平面的法向量就是直线的方向向量 $\vec{n} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \end{vmatrix} = (-7, 1, -5)$ 5 分

平面的点法式方程为: $7(x-1) - y + 5(z+1) = 0$ 8 分

得 分	
-----	--

16. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ 的秩及

一个极大无关组, 并把不属于极大无关组的向量用极大无关组表示出来.

$$\text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ -3 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 5 \text{ 分}$$

故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 3, 6 分

一个极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 7 分

$\alpha_4 = 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 3\alpha_3$. 8 分

得 分	
-----	--

17. 求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 - x_5 = 2 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 - x_5 = 5 \end{cases}$ 的通

解.

$$\text{解: } \tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 5 & 2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad 4 \text{ 分}$$

对应的方程组为 $\begin{cases} x_1 = -4x_3 - x_4 + 2x_5 + 1 \\ x_2 = -x_3 + x_5 - 1 \end{cases}$, 令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 得原方程组的一个特解

为 $\eta_0 = (1, -1, 0, 0, 0)^T$ 5 分

导出组为 $\begin{cases} x_1 = -4x_3 - x_4 + 2x_5 \\ x_2 = -x_3 + x_5 \end{cases}$, 令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得导出组的基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad 7 \text{ 分}$$

原方程组的通解为 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + k_3\xi_3 + \eta_0$, (其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数) 8 分

四、综合题 (2 小题, 共 19 分)

得 分	
-----	--

18. (本题 9 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 维向量空间 R^3 的一组基,

向量 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$.

(1) 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是 3 维向量空间 R^3 的一组基;

(2) 若向量 $\gamma = \beta_1 + 2\beta_2 + \beta_3$, 求向量 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标.

(1) 证明: (1) 证明方法不唯一

设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$, 1 分

则 $(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$, 2 分

因向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 维向量空间 R^3 的一组基, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 3 分

则 $\begin{cases} k_1 + k_3 = 0, \\ k_1 + k_2 = 0, \\ k_2 + k_3 = 0, \end{cases}$ 系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 则方程组有唯一解, 且

$k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 4 分

故向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关，也是 3 维向量空间 R^3 的一组基 5 分

(2) 因 $\gamma = \beta_1 + 2\beta_2 + \beta_3 = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 6 分

$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 8 分

故向量 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(2, 3, 3)^T$. 9 分

得 分	
-----	--

 19. (本题 10 分) 求一个正交变换 $x = Py$ ，将二次型

$f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax = x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_3$ 化为标准形.

解：二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 1 分

解特征方程 $|A - \lambda E| = (1 + \lambda)^2 (3 - \lambda) = 0$,

得特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 3$ 4 分

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ 时，解方程 $(A + E)x = 0$ ，得基础解系 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，已正交

，单位化得 $p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ 7 分

当 $\lambda_3 = 3$ 时，解方程 $(A - 3E)x = 0$ ，得基础解系 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，单位化得 $p_3 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$

8 分
取 $P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$ ，则 P 为正交矩阵 9 分

于是经正交变换 $x = Py$ 将二次型化为标准型： $f = 3y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ 10 分

得 分	
-----	--

 五、应用题 (本题 5 分)

20. 一家服装厂共有 3 个加工车间，每个车间用一匹布能加工的产品数量如下表所示，现该厂接到一个订单，要求供应 2000 件衬衫、3500 条长裤和 2400 件外衣，请问该厂应如何向 3 个车间分配原材料（布匹），以恰好完成该订单。

3 个车间用一匹布能加工的产品及数量			
车间	第一车间	第二车间	第三车间
产品			
衬衫	4	4	8
长裤	15	5	10
外衣	3	9	3

解：设该厂向 3 个车间分配原材料为 x_1, x_2, x_3 匹布，则 1 分

$$\begin{cases} 4x_1 + 4x_2 + 8x_3 = 2000 \\ 15x_1 + 5x_2 + 10x_3 = 3500 \\ 3x_1 + 9x_2 + 3x_3 = 2400 \end{cases}$$
 3 分

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 8 & 2000 \\ 15 & 5 & 10 & 3500 \\ 3 & 9 & 3 & 2400 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 1 & 0 & 200 \\ 0 & 0 & 1 & 100 \end{pmatrix}. \quad 4 \text{ 分}$$

所以该厂向 3 个车间分配原材料为 100,200,100 匹布，可恰好完成该订单. 5 分