

高等数学（上）重要知识点归纳

第一章 函数、极限与连续

一、极限的定义与性质

1、定义（以数列为例）

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{当 } n > N \text{ 时, } |x_n - a| < \varepsilon$$

2、性质

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x)$, 其中 $\alpha(x)$ 为某一个无穷小。

(2)（保号性）若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta)$ 时, $f(x) > 0$ 。

(3)*无穷小乘以有界函数仍为无穷小。

二、求极限的主要方法与工具

1、*两个重要极限公式 (1) $\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta}{\Delta} = 1$ (2) $\lim_{\diamond \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{\diamond})^\diamond = e$

2、两个准则 (1) *夹逼准则 (2) 单调有界准则

3、*等价无穷小替换法

常用替换：当 $\Delta \rightarrow 0$ 时

$$(1) \sin \Delta \sim \Delta \quad (2) \tan \Delta \sim \Delta$$

$$(3) \arcsin \Delta \sim \Delta \quad (4) \arctan \Delta \sim \Delta$$

$$(5) \ln(1 + \Delta) \sim \Delta \quad (6) e^\Delta - 1 \sim \Delta$$

$$(7) 1 - \cos \Delta \sim \frac{1}{2} \Delta^2 \quad (8) \sqrt[n]{1 + \Delta} - 1 \sim \frac{\Delta}{n}$$

4、分子或分母有理化法 5、分解因式法 6 用定积分定义

三、无穷小阶的比较* 高阶、同阶、等价

四、连续与间断点的分类

1、连续的定义*

$f(x)$ 在 a 点连续

$\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \Leftrightarrow f(a^+) = f(a^-) = f(a)$

2、间断点的分类

第一类

第二类

可去型（极限存在）

跳跃型（左右极限存在但不相等）

无穷型（极限为无穷大）

震荡型（来回波动）

其他

3、曲线的渐近线*

(1)水平渐近线： 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 则存在渐近线： $y = A$

(2)铅直渐近线： 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 则存在渐近线： $x = a$

五、闭区间连续函数性质

1、最大值与最小值定理

2、介值定理和零点定理

第二章 导数与微分

一、导数的概念

1、导数的定义*

$y'|_{x=a} = f'(a) = \frac{dy}{dx}|_{x=a} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

2、左右导数

$$\text{左导数 } f'_-(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$\text{右导数 } f'_+(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

3、导数的几何意义*

$y'|_{x=a}$ = 曲线 $f(x)$ 在点 $(a, f(a))$ 处的切线斜率 k

4、导数的物理意义

若运动方程: $s = s(t)$ 则 $s'(t) = v(t)$ (速度), $s''(t) = v'(t) = a(t)$ (加速度)

5、可导与连续的关系: 可导 \rightarrow 连续, 反之不然。

二、导数的运算

$$1、\text{四则运算 } (u \pm v)' = u' \pm v' \quad (uv)' = u'v + uv' \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$2、\text{复合函数求导 设 } y = f[\varphi(x)], \text{ 一定条件下 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = y'_u u'_x$$

$$3、\text{反函数求导 设 } y = f(x) \text{ 和 } x = f^{-1}(y) \text{ 互为反函数, 一定条件下: } y'_x = \frac{1}{x'_y}$$

4、求导基本公式* (要熟记)

5、隐函数求导* 方法: 在 $F(x, y) = 0$ 两端同时对 x 求导, 其中要注意到: y 是中间变量, 然后再解出 y'

6、参数方程确定函数的求导* 设 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, 一定条件下

$$y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}, \quad y''_x = \frac{dy'_x}{dx} = \frac{\left(\frac{y'_t}{x'_t}\right)'_t}{x'_t} = \frac{y''_t x'_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^3} \quad (\text{可以不记})$$

7、常用的高阶导数公式

$$(1) \sin^{(n)} x = \sin\left(x + \frac{n}{2}\pi\right), (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$(2) \cos^{(n)} x = \cos\left(x + \frac{n}{2}\pi\right), (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$(3) \ln^{(n)}(1+x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}, (n = 1, 2, \dots)$$

$$(4) \left(\frac{1}{1+x}\right)^n = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}, (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$(5) \text{ (莱布尼茨公式) } (uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

三、微分的概念与运算

1、微分定义 *

若 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$, 则 $y = f(x)$ 可微, 记 $dy = A\Delta x = Adx$

2、公式: $dy = f'(x)\Delta x = f'(x)dx$

3、可微与可导的关系 * 两者等价

4、近似计算 当 $|\Delta x|$ 较小时, $\Delta y \approx dy$, $f(x) \approx f(x + \Delta x) + f'(x)\Delta x$

第三章 导数的应用

一、微分中值定理 *

1、柯西中值定理 *

(1) $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

(2) $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 (a, b) 内可导

(3) $g'(x) \neq 0$, 则:

$$\exists \xi \in (a, b), \text{ 使得: } \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

当取 $g(x) = x$ 时, 定理演变成:

2、拉格朗日中值定理 *

$$\exists \xi \in (a, b), \text{使得: } f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Leftrightarrow f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

当加上条件 $f(a) = f(b)$ 则演变成:

3、罗尔定理* $\exists \xi \in (a, b), \text{使得: } f'(\xi) = 0$

4、泰勒中值定理

在一定条件下:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} = o((x - x_0)^n)$, ξ 介于 x_0 、 x 之间。

当公式中 $n=0$ 时, 定理演变成拉格朗日定理.

当 $x_0 = 0$ 时, 公式变成:

$$5、\text{麦克劳林公式 } f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$$

6、常用麦克劳林展开式

$$(1) \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}x^n + o(x^n)$$

$$(2) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1} + o(x^{2n})$$

$$(3) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + o(x^{2n+1})$$

$$(4) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + o(x^n)$$

二、罗比达法则*

记住: 法则仅能对 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 型直接用, 对于 $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$, 转化后用.

幂

指数函数恒等式* $f^g = e^{g \ln f}$

三、单调性判别*

- 1、 $y' > 0 \Rightarrow y \uparrow$, $y' < 0 \Rightarrow y \downarrow$
- 2、单调区间分界点：驻点和不可导点。

四、极值求法*

- 1、极值点来自：驻点或不可导点（可疑点）。
- 2、求出可疑点后再加以判别。
- 3、第一判别法：左右导数要异号，由正变负为极大，由负变正为极小。
- 4、第二判别法：一阶导等于 0, 二阶导不为 0 时，是极值点。正为极小，负为极大。

五、闭区间最值求法*

找出区间内所有驻点、不可导点、区间端点, 比较大小.

六、凹凸性与拐点*

- 1、 $y'' > 0 \Rightarrow y \cup$, $y'' < 0 \Rightarrow y \cap$
- 2、拐点：曲线上凹凸分界点 (x_0, y_0) .

横坐标 x_0 不外乎 $f''(x_0) = 0$, 或 $f''(x_0)$ 不存在, 找到后再加以判别 x_0 附近的二阶导数是否变号.

七、曲率与曲率半径

- 1、曲率公式 $K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$
- 2、曲率半径 $R = \frac{1}{K}$

第四章 不定积分

一、不定积分的概念*

若在区间 I 上, $F'(x) = f(x)$, 亦 $dF(x) = f(x)dx$,

则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数.

称全体原函数 $F(x) + c$ 为 $f(x)$ 的不定积分, 记为 $\int f(x)dx$ 。

二、微分与积分的互逆关系

$$1、 [\int f(x)dx]' = f(x) \Leftrightarrow d\int f(x)dx = f(x)dx$$

$$2、 \int f'(x)dx = f(x) + c \Leftrightarrow \int df(x) = f(x) + c$$

三、积分法*

1、凑微分法*

2、第二类换元法

$$3、分部积分法* \int u dv = uv - \int v du$$

4、常用的基本积分公式（要熟记）。

第五章 定积分

一、定积分的定义 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$

二、可积的必要条件 有界.

三、可积的充分条件 连续或只有有限个第一类间断点或单调。

四、几何意义 定积分等于面积的代数和。

五、主要性质 *

1、可加性 $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$

2、估值 在 $[a, b]$ 上, $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

3、积分中值定理*

当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续时: $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a), \xi \in [a, b]$

4、函数平均值: $\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}$

六、变上限积分函数 *

1、若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 则 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 可导, 且 $[\int_a^x f(t)dt]' = f(x)$

2、若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $\varphi(x)$ 可导, 则: $[\int_a^{\varphi(x)} f(t)dt]' = f[\varphi(x)]\varphi'(x)$

七、牛—莱公式 *

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 则 $\int_a^b f(x)dx = [\int f(x)dx]_a^b = F(b) - F(a)$

八、定积分的积分法 *

1、换元法 牢记: 换元同时要换限

2、分部积分法 $\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du$

3、特殊积分

$$(1) \int_{-a}^a f(x)dx = \begin{cases} 0, & \text{当 } f(x) \text{ 为奇函数时} \\ 2\int_0^a f(x)dx, & \text{当 } f(x) \text{ 为偶函数时} \end{cases}$$

(2) 当 $f(x)$ 为周期为 T 的周期函数时:

$$\int_a^{a+nT} f(x)dx = n\int_0^T f(x)dx, n \in \mathbb{Z}^+$$

$$(3) \text{一定条件下: } \int_0^\pi xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x)dx$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!}, & n \text{ 是正奇数时} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 是正偶数时} \end{cases}$$

$$(5) \int_0^\pi \sin^n x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$$

九、反常积分*

1、无穷区间上

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t)dt = F(x)|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a) \quad \text{其他类似}$$

$$2、p \text{ 积分: } \int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx (a > 0): \begin{cases} p > 1 \text{ 时收敛} \\ p \leq 1 \text{ 时发散} \end{cases}$$

3、瑕积分: 若 a 为瑕点:

$$\text{则 } \int_a^b f(x)dx = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t)dt = F(x)|_{a^+}^b = F(b) - F(a^+) \quad \text{其他类似处理}$$

第六章 定积分应用

一、几何应用

1、面积

$$(1) \begin{aligned} A &= \int_a^b (y_{\text{上}} - y_{\text{下}}) dx \\ A &= \int_a^b (x_{\text{右}} - x_{\text{左}}) dy \end{aligned}$$

$$(2) C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, (\alpha \leq t \leq \beta), \text{ 则 } A = \int_\alpha^\beta |y(t)x'(t)| dt$$

$C: \rho = \rho(\theta)$, 与 $\theta = \alpha, \theta = \beta, (\alpha \leq \theta \leq \beta)$ 围成图形面积

$$(3) A = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta \rho^2(\theta) d\theta$$

2、体积*

$$(1) \text{ 旋转体体积 } * V_x = \pi \int_a^b y^2 dx \quad V_y = \pi \int_c^d x^2 dy \quad \text{或} \quad V_y = 2\pi \int_a^b xy dx$$

$$(2) \text{ 截面面积为 } A=A(x) \text{ 的立体体积为 } V = \int_a^b A(x) dx$$

3、弧长

$$(1) s = \int_a^b \sqrt{1+y'^2} dx (a \leq x \leq b)$$

$$(2) s = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt, (\alpha \leq t \leq \beta)$$

$$(3) s = \int_\alpha^\beta \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\theta, (\alpha \leq \theta \leq \beta)$$

二、物理应用

1、变力作功

一般地：先求功元素： $dw = F(x)dx, x \in [a, b]$ ，再积分 $w = \int_a^b F(x)dx$

克服重力作功的功元素 $dw = \text{体积} \times \rho \times g \times \text{位移}$

2、水压力

$$dP = \text{水深} \times \text{面积} \times \rho \times g$$

第七章 微分方程

一、可分离变量的微分方程

$$\text{形式: } \frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

二、一阶线性微分方程*

$$1、\text{ 线性齐次: } y' + p(x)y = 0$$

$$\text{通解公式*}: y = Ce^{-\int p(x)dx}$$

$$2、\text{ 线性非齐次 } y' + p(x)y = q(x)$$

通解公式*: $y = e^{-\int p(x)dx} [\int e^{\int p(x)dx} q(x)dx + C]$