参考答案

第一章 向量代数

第一节 向量及其线性运算

A类题

2.
$$(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}a,0,0), (0,\pm \frac{\sqrt{2}}{2}a,0), (\pm \frac{\sqrt{2}}{2}a,0,a), (0,\pm \frac{\sqrt{2}}{2}a,a).$$

3.
$$(1)xoy:(x,y,-z), yoz:(-x,y,z), xoz:(x,-y,z);$$

$$(2)_{x:(x,-y,-z),y:(-x,y,-z),z:(-x,-y,z)}$$

$$(3)_0(0,0,0):(-x,-y,-z).$$

5.
$$2\pm 2\sqrt{2}$$
. **6.** $|\overline{AB}| = 2$, $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, $\cos \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos \gamma = \frac{1}{2}$, $\alpha = \frac{2\pi}{3}$, $\beta = \frac{\pi}{4}$, $\gamma = \frac{\pi}{3}$.

7.
$$(0,\frac{14}{9},0)$$
.

B类题

1.
$$(-2,3,0)$$
, $9,\cos\alpha = \frac{4}{9},\cos\beta = -\frac{4}{9},\cos\gamma = \frac{7}{9}$. 2. $(18,17,-17)$.

3.
$$(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3})$$
. 4. 略.

第二节 数量积、向量积、混合积

A类题

1.
$$(1) \times (2) \times (3) \times (4) \times (5) \times (6) \times$$
.

2. (1)7,
$$-7j+14k$$
, $\frac{\sqrt{6}}{6}$; (2) $\frac{5\pi}{6}$; (3) -8 ; (4) 4; (5) -6 .

3. (1) B; (2) A; (3) B; (4) D; (5) B. **4.** (-6,2,-2). **5.** 0. **6.** $2\sqrt{10}$.

7. Prj.
$$\mathbf{u} = |\mathbf{u}| \cos \theta = \frac{-10}{|\mathbf{v}|} = \frac{-10}{\sqrt{11}}; \mathbf{u}$$
 在 \mathbf{v} 上的分向量为 $-\frac{10}{11}(-3, -1, 1)$. 8. $\pm \frac{1}{\sqrt{35}}(3, 1, 5)$.

B类题

1. 略. 2. p.

3. (1)
$$\angle M_1 M_2 M_3 = \frac{\pi}{3}$$
; (2) $\pm \frac{\overline{M_1 M_2} \times \overline{M_2 M_3}}{|\overline{M_1 M_2} \times \overline{M_2 M_3}|} = \pm (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$.

4. (1) $|a| = \sqrt{2^2 + 1 + 1} = \sqrt{6}$, $|b| = \sqrt{1 + 2^2 + 1} = \sqrt{6}$, $\theta = \arccos \frac{1}{6}$ $\Re \pi - \arccos \frac{1}{6}$;

(2)
$$|c_1| = |a+b| = \sqrt{10}$$
, $|c_2| = |a-b| = \sqrt{14}$, $\alpha = \frac{\pi}{2}$.

5. 略.

C类题

1.
$$c = \frac{\sin\theta}{|a|}(a \times b) + \cos\theta b$$
. 2. $\frac{1}{16} = \frac{1}{16} = \frac{1}$

第二章 导数与微分

第一节 导数概念

A类题

1. (1)
$$-\frac{9}{2}$$
; (2) -1 ; (3) 0; (4) 2018!. 2. (1) A ; (2) D ; (3) D ; (4) C .

3. (1)
$$(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$$
; (2) (2,4). **4.** $f'(x_0) = \varphi(x_0)$.

5. 当 A=0, b=0, a 为任意常数时,f(x)在 x=0 处可导,且 f'(0)=0.

6. 切线方程为:3x-y-1=0. 法线方程为:x+3y-17=0.

B类题

1. (1) f(x)在 x=0 处的导数为 0;

(2)当
$$g(0) = \frac{1}{2}$$
时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导; 当 $g(0) \neq \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

2. f'(1)=2015. **3.** 略.

C类题

1.
$$\frac{d}{dx} [f(g(x))]\Big|_{x=0} = 0$$
, 2.1. 3.1.

4. 提示: $f'(0) = a_1 + 2a_2 + \dots + na_n$, 再根据导数定义证明 $|f'(0)| \le 1$,