I. Préparation des solutions

1. Tampons de saturation et d'anticorps

Tampon de saturation (PBS 1X + BSA 1% + Triton 0.1%) : Dans 50ml de PBS 1X, diluer 0.5g de BSA + 50µl de Triton. Faire des aliquots de 2ml. A conserver au -20°C.

Tampon anticorps (PBS 1X + BSA 0.2% + Triton 0.1%) : Dans 50ml de PBS 1X, diluer 0.1g de BSA + 50µl de Triton. Faire des aliquots de 2ml. A conserver au -20°C.

2. Tampon de démasquage

Citrate de sodium 100mM (n° 152) : Dans 50ml d'H_2O stérile, diluer 1.45g de Na3-citrate. A conserver max 2 mois à +4°C.

Acide citrique 100mM (n° 31) : Dans 50ml d'H_2O stérile, diluer 1.05g d'acide citrique. A conserver max 2 mois à +4°C.

3. Solution de rinçage/perméabilisation

PBS + Triton 0.1% : Dans 50ml de PBS 1X, diluer 50µl de Triton. A conserver à +4°C.

II. Protocole

1. Jour 1

Pour les anticorps nécessitant un démasquage, préparer le tampon de démasquage comme suit : ***4.1ml de Na3-citrate 100mM + 0.9ml d'acide citrique 100mM + H_2O stérile qsp 50ml + 20µl de NaOH 10M****. Le volume de NaOH peut varier selon les solutions mères préparées, vérifier le pH lors des premières préparations du tampon citrate (****pH = 6.0****).*

Faire sécher les lames, puis les passer en bain PBS 1X et les faire sécher correctement sur la plaque chauffante.

Mettre les lames dans le ***tampon citrate*** *et les mettre au* ***bain marie 95°C****, préalablement chauffé, pendant* ***30min****.*

Sortir les lames du tampon citrate et les faire sécher.

¤ Préparer la chambre humide et annoter les lames (date + anticorps utilisés).

¤ Faire **sécher** les lames **10min max** jusqu'à disparition de l'humidité pour limiter le bruit de fond.

¤ Délimiter le contour des coupes avec le **Dakopen** (le plus fin possible et pas trop près des coupes).

¤ Rincer **3 fois** les coupes avec le **PBS+Triton 0.1%.**

¤ Incuber **45min** avec le **tampon de saturation**, à **température ambiante.**

¤ Préparer les anticorps primaires selon les concentrations indiquées dans le gsheet « secret antibody » dans le tampon anticorps.

¤ Incuber **overnight** avec les **anticorps primaires**, à **4°C** (chambre froide).

2. Jour 2

¤ Rincer **3 fois** les coupes avec le **PBS+Triton 0.1%.**

¤ Préparer les anticorps secondaires 555 à 1/800e dans le tampon anticorps et les anticorps secondaires 488 à 1/400e.

¤ Incuber **2h** avec les **anticorps secondaires**, à **température ambiante.**

¤ Préparer le Hoechst, diluer à 1/1000e le DAPI dans le PBS.

¤ Incuber **10min** avec le **Hoechst**, à **température ambiante**. Penser à mettre le glycergel à 50°C pendant ce temps.

¤ Rincer **3 fois** les coupes avec le **PBS+Triton 0.1%.**

¤ Rincer **1 fois** les coupes avec le **PBS.**

¤ Coller les lamelles en déposant **100µl de glycergel** sur la lame.

III. Démasquage à plat

Dans le cas des coupes fragiles, qui se décollent et/ou se détériorent lors du démasquage en bain, on procède à un démasquage à plat.

¤ Allumer la plaque chauffante et la régler à **95°C**. Mettre un Falcon d'H_2O au bain marie.

¤ Rincer les coupes avec du **PBS** en utilisant une micropipette.

¤ Faire sécher la lame sur la plaque chauffante en isolant avec du sopalin.

¤ Préparer le tampon citrate.

¤ Déposer en **grande quantité** le tampon citrate sur la lame.

¤ Mettre la lame sur la plaque chauffante **/!\ ne pas laisser le sopalin**, la lame doit être en contact direct avec la plaque chauffante.

¤ Pendant **30min**, surveiller la déshydratation de la lame. Maintenir un niveau constant de liquide en ajoutant de l'eau chaude (~ 200µl), régulièrement sur la lame, avec la micropipette.

IV. Recommandations

- Attention à ne pas laisser sécher les coupes sauf avec le Dakopen.
- Limiter au maximum l'exposition à la lumière des coupes et des anticorps.
- Pour le tampon de saturation et les anticorps primaires/secondaires déposer 200µl de solution/lame ou 30µl/coupe.
- Pour les rinçages et le Hoechst, déposer 400µl/lame ou 60µl/coupe. Puis aspirer avec la pointe reliée au vide, **/!\ aspiration à l'opposé des coupes.**