Bifurcations de famille de fonctions entre espaces de Banach et quelques applications

Zakaria Elmi Roble

Décembre 2025

Table des matières

1 Rappels et prérequis **4**
1.1 Rappels et compléments d'analyse fonctionnelle 4
1.1.1 Compacité 4
1.1.2 Notions de calcul différentiel dans des Espaces de Banachs 5
1.1.3 Opérateurs de Fredholm 8
1.2 Elements de théorie des EDP 12

2 Réduction de Lyapunov-Schmidt et étude locale **14**
2.1 Approche analytique 14
2.1.1 Cas où $\dim \Lambda = 1$ 16
2.1.2 Cas où $\dim \Lambda = \infty$ 20
2.2 Approche via la théorie des singularités 26
2.2.1 L'anneau $\mathcal{E}_n$ 26
2.2.2 Détermination finie 29
2.2.3 Classification en dimension finie 32

3 Méthodes topologiques **33**
3.1 Le degré de Leray-Schauder 33
3.1.1 Premières notions 33
3.1.2 Construction 34
3.1.3 2 théorèmes classiques 36
3.2 Le degré orienté 36
3.2.1 Construction 36
3.2.2 Un résultat global via le degré orienté 38
3.3 Approche K-théorique 38
3.3.1 Rappels et compléments de topologie algébrique 38
3.3.2 Fibrés et fibrés vectoriels 39
3.3.3 Introduction à la K-théorie 41
3.3.4 application à la détection globale d'une bifurcation 42

4 Introduction aux bifurcations équivariantes et symétries **43**

5 Bifurcation de systèmes dynamiques **44**

Introduction

Dans sa forme la plus générale, la théorie de la bifurcation (statique) pourrait se résumer aux différentes techniques mise en place pour répondre à la question suivante : Etant donnée deux espaces abstraits X et Y, un espace de paramètre Λ et une famille de fonctions

$$(f_\lambda : X \to Y)_{\lambda \in \Lambda}$$

comment le lieu $f_\lambda^{-1}(0)$ change-t-il quand λ varie ? On peut récrire cette famille de fonction comme une fonction $F : X \times \Lambda \to Y$. Il faut bien sûr préciser un peu ce que sont ces espaces, sans quoi, on ne peut rien dire.
Il semblerait que l'outil approprié pour étudier le problème dans sa forme la plus générale soit *la théorie de morse paramétrique*, voir [SOURCE] pour cette théorie, et [SOURCE] pour les liens tissés entre cette dernière et la théorie de la bifurcation. Nous n'iront pas dans cette direction là pour ce travail et supposerons que les outils de base du calcul différentiel s'appliquent confortablement à X et Y et nous verrons que pour ce-faire, il faut supposer que ce sont des espaces de Banach.
Historiquement, ce type de problème apparu lors de l'étude de systèmes dynamiques dont la loi d'évolution dépend d'un paramètre, précisons : considérez l'équation différentielle suivate :

$$\frac{\partial x}{\partial t} = F(x, \lambda) \tag{1}$$

en suposant, par exemple $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On peut s'intéresser, dans un premier temps, aux *équilibres* de ce système, naturellement, cela correspond à étudier $F_\lambda^{-1}(0)$. Consiérons le cas très simple d'un mobile ayant un seul degré de liberté, et

$$F(x, \lambda) = x^3 - \lambda x$$

On constate immédiatement que le nombre de points d'équilibres passe de 1 à 2 quand λ devient positif. Remarquon déjà qu'ici une partie du lieu d'annulation de F est assez inintéressante. En effet, il est évident que si $x = 0$ alors $F(x, \lambda) = 0$, dans la suite, cette branche de solution inintéressante sera qualifiée de branche triviale et la majorité de travail consitera à étudier les *bifurcations depuis une branche triviale*, i.e , si $(x_0, \lambda_0) \in X \times \Lambda$ dans quelle conditions est-ce que tout voisinnage de (x_0, λ_0) contient des solutions *non triviales*, c'est à dire des zéros de de F ne se trouvant pas sur la branche triviale.
La première partie de ce travail établit les notions prérequises et a pour but de le rendre le plus *self contained* que possible. La seconde partie introduit la *réduction* de Lyapunov-Schmidt, qui ,dans des conditions que nous allons préciser, permet de se ramaner à un problème en dimension finie. Ensuite, nous introduirons l'approche par *théorie la des singularité* initiée par Golubitsky dans [9] et reformulée et enrichie par Montaldi dans [12]. Cette approche nous permettra de *classifier* les bifurcation, i.e , étant donné une fonction $F(x, \lambda)$ et un point de son domaine (x_0, λ_0) autour duquel on veut étudier le comportement de F, il peut être utilise de se poser la question suivante : si je m'intéresse à une propriété quelconque P, quelles sont les T transformations qui laisse P invariante ? Le but

étant de bien sûr de se ramaener dans un cas *plus simple* sans perdre P. Cela nous ramène naturellement à étudier le travail de Wall dans [15]. Nous verrons alors ces transformations comme des *actions de groupes* et étudierons leur orbites

La troisième partie présente des techniques d'un tout autre type : nous utilisons des outils de topologie et topologie algébrique pour détecter *globalement* les bifurcation (depuis une branche triviale). D'abord, nous exposons les approches par théorie du degré topologique classiques, en nous basant sur [6] pour ensuite introduire des dévellopements plus modernes : le degré *orienté* de Furi [2] ainsi que le fibré virtuel d'index de Pejsachowicz [13]

La dernière partie, quand à elle constituera une introduction aux bifurcations dynamiques. Si on se replace dans le contexte d'un sysème dynamique (donc l'étude d'une equation d'évolution comme 1), on s'intéresse à comment les propriétés purement dynamique changent quand λ varie, dans ce travail, nous exposerons uniquement la plus fameuse bifurcation dynamique : la bifurcation de Hopf. Intuitivement, elle corespsond à un passage d'un régime présenant des *point d'attraction ou de répulsion* à un régime présenant des *orbites périodiques attractives ou répulsives*, nous en profiterons également pour introduire quelques notions de stabilité. Nous n'explorerons pas la dynamique plus loin, mais notez qu'on peut également considérer des bifurcations correspondant à un passage entre un système non chaotique à un système chaotique (voire par exemple la fameuse "logistic map").

1 Rappels et prérequis

1.1 Rappels et compléments d'analyse fonctionnelle

1.1.1 Compacité

Nous rappelons brièvement quelques notions de compacité dans les espaces de Banach et introduisons les mesures de non-compacité, cette section est adaptée de [4]. Rappelons qu'un sous ensemble K d'un espace de Banach X est *relativement compact* si $\overline{K}$ est compact et précompacte si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un nombre fini de boules de rayon ε recouvrant K, notez qu'étant donné que les espaces de Banach sont complets, être précompact ou relativement compact c'est la même chose. Mainenant, on introduit deux mesures de non-compacité : posons $\mathcal{B}(X)$ l'ensemble des parties bornées de X, on pose

$$\beta : \mathcal{B}(X) \to \mathbb{R}^+, A \mapsto \inf \left\{ \varepsilon > 0 | \exists x_1, \cdot, x_n \in X : A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} B(x_i, \varepsilon) \right\}$$

et

$$\alpha : \mathcal{B}(X) \to \mathbb{R}^+, A \mapsto \inf \left\{ d > 0 | \exists E_1, \cdots E_n \in X : \forall 1 \leq i \leq n \operatorname{diam}(E_i) \leq d \text{ et } A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} E_i \right\}$$

Le résultat suivant est une conséquence directe de la définition et s'applique aussi à β

Proposition 1.1. Soit $A, B \in \mathcal{B}(X)$
- $\alpha(A) = 0 \Leftrightarrow A$ est compact
- α est une semi norme
- α est croissant pour l'inclusion
- $\alpha(A \cup B) = \max\{\alpha(A), \alpha(B)\}$

On définit la distance de Hausdorff comme

$$d_H : \mathcal{B}(X)^2 \to \mathbb{R}^+, (A, B) \mapsto \max\{\sup_{x \in A} d(x, B), \sup_{x \in B} d(x, A)\} \tag{2}$$

Proposition 1.2. α et β sont continues pour la topologie engendrée par 2

Preuve. On le fait pour β, la preuve est similaire pour α.TO DO [finir la preuve] □

Proposition 1.3. Si $A \in \mathbb{B}(X)$

$$\alpha(\operatorname{conv}(A)) = \alpha(A) \text{ et } \beta(\operatorname{conv}(A)) = \beta(A)$$

1.1.2 Notions de calcul différentiel dans des Espaces de Banachs

Dans cette section nous rappelons brièvement les résultats classiques du calcul différentiel dans des espaces de Banach. Le but étant de pouvoir démontrer les théorème des fonctions implicites, un des outils principaux de la théorie de la bifurcation, nous nous basons principalement sur [5] et [3]

Définition 1.4. Soient X, Y des espaces de Banach (réels ou complexes) et U un ouvert de X et $f, g \in C^0(U, Y)$. f et g sont *tangents* en $x_0 \in A$ si

$$\lim_{x \to x_0, x \neq x_0} \frac{||f(x) - g(x)||_Y}{||x - x_0||_X} = 0$$

Il est clair que le relation "être tangent en un point" est une relation d'équivalence.

Lemme 1.5. Dans les conditions de la définition précédente, si il existe un élément h de $C^0(U, Y)$ tangent à f en x_0 et $u \in L(X, Y)$ tels que

$$h(x) = f(x_0) + u(x - x_0) \tag{3}$$

alors il est unique

Preuve. Supposons avoir h et h' satisfaisant 3 et notons u_1, u_2 les éléments de $L(X, Y)$ correspondant, on a alors

$$\lim_{x \to x_0, x \neq x_0} \frac{||h(x) - h'(x)||_Y}{||x - x_0||_X} = \lim_{x \to x_0, x \neq x_0} \frac{||u_1(x) - u_2(x)||_Y}{||x - x_0||} = \lim_{y \to 0, y \neq 0} \frac{||v(y)||}{||y||} = 0$$

où on a posé $y = x - x_0$ et $v = u_1 - u_2$. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $r > 0$ tel que $||v(y)|| \leq \varepsilon ||y||$ si $||y|| \leq r$, si $x \neq 0$, on récupère $||v(x)|| \leq \varepsilon ||x||$ en choisissant $y = \frac{rx}{||x||}$, ce qui permet d'affirmer que $v = 0$, et donc $h = h'$ □

Il est donc licite d'introduire la définition suivante

Définition 1.6. Si E et F sont des espaces de Banach, et si A est un ouvert de E, alors $f \in C^0(A, F)$ est *dérivable* en $x_0 \in A$ s'il existe $h(x) = f(x_0) + u(x - x_0)$ tangent en x_0 , ce u est alors la *la dérivée de f en x_0* qu'on notera $Df(x_0)$. Naturellement, f est dérivable sur A si elle est dérivable en chaque point

Notons que dès à présent, lorsque le contexte sera clair, nous ne spécifierons pas l'espace dont on utilise la norme.

Proposition 1.7. Dans les conditions de la définition précédente, $Df(x_0) \in \mathcal{L}(X, Y)$

Preuve. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $0 < r < 1$ tel que

$$||t|| < r \Rightarrow ||f(x_0 + t) - f(x_0)|| \leq \frac{\varepsilon}{2} \text{ et } ||f(x_0 + t) - (f(x_0) + u(t))|| \leq \frac{\varepsilon}{2}||t||$$

Ainsi, $||t|| \leq r \Rightarrow ||u(t)|| \leq \varepsilon$,ce qui permet de conclure. □

On vérifie facilement que si f est constante sur A, alors f est dérivable sur A et que celle-ci y est nulle. De même, il est immédiat que si $u \in \mathcal{L}(X, Y)$ alors u est dérivable et $Du(x) = u(x)$ sur X.

Remarque 1.8. On pourrait se demander s'il est possible de relaxer les hypothèses d'avantage. Et bien non, par exemple, si on travaille avec un espace de Fréchet, on perd l'unicité démontrée au lemme 1.2, et de nombreux problèmes de stabilité surviennent. Ainsi, on perd le théorème de la fonction inverse, on perd le théorème des fonctions implicites,etc... Il est quand même possible de dire des choses ! Le lecteur intéressé pourra regarder le théorème de Nash-Moser en consultant , par exemple, [14]. Ainsi, les espaces de Banach remplissent les conditions "minimales" pour faire de l'analyse sereinement

Remarque 1.9. Nous allons travailler principalement avec des espaces de Banach réels dans le reste de ce travail. Il existe également des résultats dans le cas complexe, nous renvoyons le lecteur vers [SOURCE]. Quand aux autres champs (p-adiques, ...), il ne semble pas qu'il y'aie une théorie des bifurcations bien établie. Notez cependant qu'il existe une généralisation du théorème des fonctions implicite à d'autres champs ! Voir par exemple [8]

Rappelons que l'espace $\mathcal{L}(X, Y)$ muni de la norme $||u|| = \sup_{x \in B(1)} ||u(x)||$ est un espace de Banach et que $||u(x)|| \leq ||u|| \cdot ||x||$.

Proposition 1.10. Si X, Y, Z sont des espaces de Banach et si $B \in C^0(X \times Y, Z)$ est bilinéaire, alors B est dérivable et $DB(x_0, y_0)(x, y) = B(x_0, y) + B(x, y_0)$ pour tous $(x_0, y_0), (x, y) \in X \times Y$

Preuve. Par hypothèse, il existe $C > 0$ tel que $||B(x, y)|| \leq ||x||||y||$. Et donc, si $\varepsilon > 0$ est fixé et si $\sup(||s||, ||t||) = ||(s, t)|| \leq \frac{\varepsilon}{C}$, on a

$$||B(x_0 + x, y_0 + y) - B(x_0, y_0) - B(x_0, y) - B(x, y_0)|| = ||B(x, y)|| \leq \varepsilon ||(x, y)||$$

□

On obtient facilement le résultat suivant :

Proposition 1.11. Si $(Y_i)_{i=0}^m$ est une suite finie d'espaces de Banach,U un ouvert d'un espace de Banach X , $Y = \prod_{i=0}^m Y_i$ et si $f \in C^0(U, Y)$ alors, pour tout $x_0 \in U$

$$f \text{ est dérivable en } x_0 \ \Leftrightarrow \forall 0 \leq i \leq m \quad \pi_i(f) \text{ est dérivable en } x_0$$

On écrira $Df(x_0) = (Df_1(x_0), \cdots, Df_m(x_0))$ où $f_i = \pi_i(f)$
On récupère alors le théorème de dérivation des fonctions composées. La preuve est assez similaire au cas $\mathbb{R}^n$

Proposition 1.12. Soient X, Y, Z des espaces de Banach, U un ouvert de X,$x_0 \in U$, $f \in C^0(U, Y)$, $y_0 = f(x_0)$, V un ouvert de Y contenant y_0 et enfin $g \in C^0(V, Z)$ alors

$$f \text{ dérivable en } x_0 \text{ et g dérivable en } y_0 \text{ et } \Rightarrow g \circ f \text{ dérivable en } x_0$$

Et on a l'expression habituelle

$$D(g \circ f)(x_0) = (Dg(y_0))(Df(x_0))$$

Preuve. voir [5] □

De ce qui précède, on déduit immédiatement que l'ensemble des fonctions dérivables en un point x_0 est un espace vectoriel, et que si f,g dérivable en x_0, alors $D(f+g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0)$ et si α est un scalaire, $D(\alpha f)(x_0) = \alpha Df(x_0)$.

Remarque 1.13. Avec les notations qui précèdent, si X a une seule dimension (il est dans ce cas isomorphe à son champ de scalaire), $\mathcal{L}(X,Y)$ est isomorphe à Y via $f \mapsto (\xi \mapsto f\xi)$ $Df(x_0)$ est alors un élément de l'espace d'arrivée Y

Définition 1.14. Soient X, Y des espaces de Banach, soit U un ouvert de X. $f \in C^1(U,Y)$ si $Df \in C^0(U, \mathcal{L}(X,Y))$

Définition 1.15. Si $X = \prod_{i=1}^n X_i$ où les X_i sont des espaces de Banach, si $a = (a_1, \cdots, a_m) \in \prod_{i=1}^n X_i$, et si $x_i \mapsto f(a_1, \cdots, x_i, \cdots, a_n)$ est dérivable, on note $D_i f(a)$ se dérivée. Si $1 \leq k < j \leq n$, alors on considère $\widetilde{f}$ comme étant f mais définie sur $(\prod_{i=1}^{k-1} X_i) \times (\prod_{i=k}^{j} X_i) \times (\prod_{i=j+1}^{n} X_i)$ et on pose dans ce cas $D_{k,\cdots,j} f = D_2 \widetilde{f}$

Proposition 1.16. Dans les conditions des définitions précédentes,

$$f \in C^1(U,Y) \Leftrightarrow \forall a \in U, \forall 1 \leq i \leq n \quad D_i f(a) \text{ est défini et continu}$$

la dérivée est alors donnée par

$$Df(a)(t) = \sum_{i=1}^{n} D_i f(a)(t_i)$$

Preuve. voir [5] □

Théorème 1.1

Soient X, Λ, Y des espaces de Banach, V un ouvert $X \times \Lambda$ et $f \in C^1(V, Y)$. Suposons de plus que $F^{-1}(0)$ est non vide. Alors si $D_2F(x_0, \lambda_0)$ est un isomorphisme et si $(x_0, \lambda_0) \in F^{-1}(0)$ alors il existe un voisinnage ouvert $V' \subseteq V$ de (x_0, λ_0), U un voisinage de (x_0) dans X et $\varphi \in C^1(U, \Lambda)$ tels que

$$\forall (x, \lambda) \in V', F(x, \lambda) = 0 \Leftrightarrow x \in U \text{ et } \lambda = \varphi(x)$$

et

$$D\varphi(x_0) = -D_2F(x_0, \lambda_0)^{-1} D_1F(x_0, \lambda_0)$$

Preuve. TO DO [Preuve complète] □

TO DO ? [Rajouter une partie sur les fonctions analytiques dans des Banachs]

TO DO ? [Inverse local analytique]

On termine par une petite remarque sur les dérivées d'ordre supérieur. On définit les fonctions C^k comme pour les fonctions rééels, mais remarquez que, avec les notations habituelles,

$$F \in C^2(U, Y) \Rightarrow D(DF) \in C^0(U, \mathcal{L}(X, \mathcal{L}(X, Y)))$$

Ainsi, D^2F prend en entrée un point x de U, $D^2F(x)$ une direction h de X et $D^2F(x)(h)$ prend une deuxième direction k, c'est la généralisation de la matrice Hessienne (ou plutôt de l'application bilinéaire représentée par cette dernière). En général, la dérivée k-ième sera k-linéaire.

1.1.3 Opérateurs de Fredholm

Nous étudierons la situation où la "non-bijectivité" de $D_1f(x_0, \lambda_0)$ n'est pas "trop grave", précisons :

Définition 1.17. Soient E, F des espaces de Banach et soit $D \in \mathcal{L}(E, F)$. *l'index de Fredholm de* D est défini si $\dim \ker D$ et $\dim F/\text{im } D = \text{codim im } D$ sont finis, et il vaut, dans ce cas

$$\text{Ind } D = \dim \ker D - \text{codim im } D$$

Définition 1.18. Dans les conditions de la définition précédente, D est un *opérateur de Fredholm* si son index est défini. On pose $\mathcal{F}(E, F)$ l'ensemble des opérateurs de Fredholm de E vers F. On notera $\mathcal{F}(E, F)$ l'ensemble des opérateur de fredholm et $\mathcal{F}_n(E, F)$ l'ensemble des opérateur de fredholm d'indice n. Enfin, on dit qu'une fonction $f : E \to F$ est *de Fredholm en* $e \in E$ si elle est C^1 et si $DF(e)$ est de fredholm.

Remarquons que dans ce cas, D^* est de Fredholm aussi et

$$\text{Ind } D^* = -\text{Ind } D \tag{4}$$

Où D^* est l'opérateur adjoint, défini comme

$$D^* : F^* \to E^*, f \mapsto f \circ D$$

$\dim \ker D$ mesure à quel point il n'est pas injectif, et $\operatorname{codim} \operatorname{im} D$ à quel point il n'est pas surjectif. On a bien envie que si cette propriété est vraie pour une certaine valeur du paramètre, alors elle reste vraie pour les valeurs voisines. Nous montrons ici que c'est bel et bien le cas.

TO DO [AJOUTER compléments]

Nous donnons une jolie preuve, très algébrique, obtenue dans un cours de l'université d'Utrecht [10]. Rappelons les notions de suite exacte et de suite exacte courte

Définition 1.19. Si $G_0, G_1, \cdots, G_n$ sont des groupes (ou espaces vectoriels, modules, etc...) [1] alors la suite

$$G_0 \xrightarrow{J_1} G_1 \xrightarrow{J_2} G_2 \xrightarrow{J_3} \cdots \xrightarrow{J_n} G_n$$

est *exacte* si $\operatorname{im}(j_i) = \ker(j_{i+1})$ Une suite *exacte courte* est une suite de la forme

$$0 \xrightarrow{0} A \xhookrightarrow{j_1} B \xrightarrow{j_2} C \xrightarrow{0} D$$

Quand on a une suite exacte, le noyau du premier morphisme est trivial, il est donc injectif. L'image du second morphisme est le noyau de l'application nulle, donc c'est tout l'espace, il est donc surjectif. Intuitivement, peut voir A comme "inclus" dans B via j_1, et j_2 peut être compris comme une projection, en fait, le premier théorème d'isomorphisme nous assure que

$$B/\operatorname{im}(j_1) \cong C$$

On obtient, de façon purement algébrique, le résultat suivant

Lemme 1.20. Soint E, F, G des espaces Banach, $D_1 : E \to F, D_2 : F \to G$ si 2 des 3 opérateurs D_1,D_2 et $D_2 \circ D_1$ est de Fredholm alors le 3ème l'est aussi et on a

$$\operatorname{Ind}(D_2 \circ D_1) = \operatorname{Ind}(D_1) + \operatorname{Ind}(D_2)$$

Démonstration. Nous supposons d'abord D_1 et D_2 de Fredholm. Remarquons d'abord qu'on a la suite exacte courte suivante

$$0 \xrightarrow{0} \ker D_1 \xhookrightarrow{\iota} \ker(D_2 \circ D_1) \xrightarrow{D_2} \operatorname{im}(D_1) \cap \ker(D_2) \xrightarrow{0} 0$$

On a alors

$$\operatorname{im}(D_1) \cap \ker(D_2) \cong \ker(D_2 \circ D_1)/\ker(D_1)$$

et donc

$$\dim(\operatorname{im}(D_1) \cap \ker(D_2)) = \dim(\ker(D_2 \circ D_1)) - \dim(\ker(D_1))$$

1. Plus généralement, des objets d'une catégorie abélienne, voir [Source] pour plus d'informations

Ce qui nous permet de controller la dimension du noyau du troisième si on contrôle celle des deux autres ! Maintenant, le conoyau : remarquez d'abord qu'on a

$$\operatorname{im}(D_2 \circ D_1) \subseteq \operatorname{im}(D_2) \subseteq G$$

(Ce sont bien entendu des sous groupes normaux vis à vis de l'addition de G) on défini alors une projection naturelle

$$\pi : G/\operatorname{im}(D_2 \circ D_1) \to G/\operatorname{im}(D_2), g + \operatorname{im}(D_2 \circ D_1) \mapsto g + \operatorname{im}(D_2)$$

De plus, le second théorème d'isomorphisme nous permet d'écrire

$$(\operatorname{im}(D_1) + \ker(D_2))/\operatorname{im}(D_1) \cong \ker(D_2)/(\operatorname{im}(D_1) \cap \ker(D_2))$$

On a alors la suite exacte suivante

$$0 \xrightarrow{0} \frac{\operatorname{im}(D_1)+\ker(D_2)}{\operatorname{im}(D_1)} \xhookrightarrow{\iota} \frac{F}{\operatorname{im}(D_1)} \xrightarrow{D_2} \frac{G}{\operatorname{im}(D_2 \circ D_1)} \xrightarrow{\pi} \frac{G}{\operatorname{im}(D_2)} \xrightarrow{0} 0$$

Vu ce qui précède, le 4ème élément de la suite est de dimension finie, les 2ème et 4ème éléments le sont par hypothèse et donc le troisième doit l'être aussi et

$$\dim(G/\operatorname{im}(D_2 \circ D_1)) = \dim(G/\operatorname{im} D_2) + \dim(F/\operatorname{im} D_1) - \dim(\ker(D_2)) + \dim(\ker(D_2) \cap \operatorname{im}(D_1))$$

Ce qui permet de conclure. Les autres cas se montrent de façon similaire □

Si X est un espace de Banach, on pose $\mathcal{GL}(X)$ l'ensemble des transformations linéaires continues et inversibles de X dans lui même

Lemme 1.21. Si X est un espace de Banach, alors

$$\forall D \in \mathcal{L}(X), ||D|| < 1 \Rightarrow (\operatorname{Id} - D) \in \mathcal{GL}(X)$$

Preuve. Notons d'abord que

$$\forall n \in \mathbb{N}, ||D^n|| \leq ||D||^n$$

Donc la série

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} D^n$$

Est absolument convergente, étant donné que $\mathcal{L}(X)$ est un banach, $D' = \sum_{n \in \mathbb{N}} D^n$ est dans $\mathcal{L}(X)$. Montrons alors que D' est l'inverse de $\operatorname{Id} - D$. On a

$$D \circ \Big(\sum_{0 \leq n \leq k} D^n \Big) = \sum_{0 \leq n \leq k} D^{n+1} = \Big(\sum_{0 \leq n \leq k} D^n \Big) \circ D = \sum_{0 \leq n \leq k+1} D^n - \operatorname{Id}$$

En posant $S_k = \sum_{0 \leq n \leq k} D^n$

$$\lim_{k \to \infty} ||S_k D - SD|| \leq ||D|| \lim_{k \to \infty} ||S_k - D'|| < \lim_{k \to \infty} ||S_k - D'|| = 0$$

de la même façon

$$\lim_{k\to\infty} ||DS_k - DS|| = 0$$

Et donc

$$D'D = DD' = D' - I \to (I-D)^{-1} = D'$$

De plus, D' est continu et

$$||(I-D)^{-1}|| \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} ||D||^k \leq \frac{1}{1-||D||}$$

□

On en tire immédiatement le résultat suivant

Corollaire 1.22. *$\mathcal{GL}(X)$ est un ouvert de $\mathcal{L}(X)$*

Si on pose IsoBanach(E,F) comme étant l'ensemble des homéomorphismes linéaires entre E et F, c'est aussi un ouvert : soit il est vide, soit il ne l'est pas et dans ce cas on identifie E à F et on applique le corollaire ci-dessus.

Théorème 1.2 (Atkinson)

La fonction

$$\mathrm{Ind} : \mathcal{F}(E,F) \to \mathbb{Z}$$

est localement constante. En particulier, $\mathcal{F}(E,F)$ est ouvert

Preuve. Soit D de Fredholm, On complémente $\ker D$ par E_1 et $\operatorname{im} D$ par F_1 On considère

$$\iota : E_1 \to E \text{ et } \pi : F \to \operatorname{im} D$$

Les injections et projections naturelles, ι est évidemment continu et π est continu via la théorème du graphe fermé. On considère élgament la fonction

$$\psi : \mathcal{L}(E,F) \to \mathcal{L}(E_1, \operatorname{im} D), G \to \pi G \iota$$

C'est une fonction continue. étant donné que $\psi(D)$ est un isomorphisme, $\psi(G)$ sera un isomorphisme si G assez proche de D via 1.22. Or, $\mathrm{Ind}(\pi) = \dim(F/\operatorname{im} D)$ et $\mathrm{Ind}(\iota) = -\dim(\ker D)$ On conclut immédiatement via 1.20 car

$$0 = \mathrm{Ind}(\psi(G)) = -\dim(\ker D) + \mathrm{Ind}(G) + \dim(F/\operatorname{im} D)$$

□

Nous présentons un cas particulier d'operateur de fredholm qui sera utile dans la section 2.1.2

Définition 1.23. Soient X, Y des espaces de Banach, $F : X \to Y$ telle que de Fredholm en 0. Considérons alors une base $B = x_1, \cdots, x_n$ de $\ker DF(0)$ et $B^* = y_1^*, \cdots, y_n^*$ un base de $\ker DF(0)^*$. Le théorème de Hanh-Banach nous assure l'existance d'une complétion bi-orthonogale, i.e,

$$\exists x_1^*, \cdots x_n^* \in X^*, y_1, \cdots y_n, \in Y : \forall 0 \leq i, j \leq n, y_j^*(y_i) = x_j^*(x_i) = \delta_{ij}$$

On défini alors *l'opérateur de Schmidt associé à* (B, B^*)

$$U : X \to Y, x \mapsto -DF(0)(x) + \sum_{i=0}^{n} x_i^*(x) y_i \tag{5}$$

On peut montrer qu'il inversible d'inverse continu,nous renvoyons le lecteur vers la section 8.6 de [16]

1.2 Elements de théorie des EDP

Nous introduisons le minimum vital de théorie des equations différentielles aux dérivées partielles pour pouvoir illustrer la théorie, cette section est adaptée de [7]

Nous rappelons qu'un multi-indice α de taille n est simplement un tuple de nombres naturels $(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ et qu'on a $D^\alpha = D_1^{\alpha_1} \cdots D_n^{\alpha_n}$, on pose aussi $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$ et $\alpha! = \alpha_1 \cdots \alpha_n$.

Définition 1.24. Si U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$, un *opérateur diférentiel partiel* est un operateur de la forme

$$E = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha \tag{6}$$

où les a_α sont des fonctions de U vers $\mathbb{R}$ Si il existe a_α non-identiquement nul avec $|\alpha| = m$ alors l'opérateur

$$\sum_{|\alpha| = m} a_\alpha(x) D^\alpha \tag{7}$$

est la partie princiaple de F et les coeficients a_α avec $|\alpha| = m$ sont appelées coeficients principaux

Définition 1.25. L'opérateur 6 est dit *elliptique* si pour tout réel $\xi \neq 0$ et tout $x_0 \in U$, $\sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x_0)\xi^\alpha \neq 0$.

Notez que dans la définition précédente, si les a_α sont réels, alors m doit être pair.

Définition 1.26. L'opérateur 6 de partie principale 7 est *fortement elliptique* en $x_0 \in U$. Si $m = 2p$

$$(-1)^p \sum_{|\alpha|=2p} a_\alpha(x_0)\xi^\alpha$$

Si l'opérateur est fortement elliptique en chaque point, alors il est fortement elliptique. Enfin, si

$$\forall x \in U, \xi \in \mathbb{R}, \exists c_0 > 0 : (-1)^p \sum_{|\alpha|=2p} a_\alpha(x_0)\xi^\alpha \geq c_0|\xi|^{2p}$$

et si les coeficients principaux sont uniformément bornés dans U alors l'operateur E est *Uniformément fortement elliptique*

TO DO [Adjoint formel et formule de green,condition de bordure lisse et première propriétés]

2 Réduction de Lyapunov-Schmidt et étude locale

2.1 Approche analytique

Lorsque l'opérateur $D_1 f(x_0, \lambda_0)$ est de fredholm et que la dimension de l'espace des paramètres est finie, il est possible de se ramener à un problème en dimension finie

Théorème 2.1 (Lyapunov-Schmidt)

Soient X, Λ, Y des espaces de Banach, $U \subset X$,$V \subset \Lambda$ des ouverts, $F \in C^1(U \times V, Y)$, $(x_0, \lambda_0) \in U \times V$ tel que $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et tel que $F(\cdot, \lambda_0)$ est de fredholm en x_0. Il existe $U_1 \times V_1 \in \mathcal{V}_{(x_0,\lambda_0)}$, U_2 un ouvert de $\ker D$ et V_2 un ouvert de V tels que sur $U_1 \times V_1$, le problème

$$F(x, \lambda) = 0$$

Se ramène à un problème sur $U_2 \times V_2$

Preuve. Posons $D = D_1 f(x_0, \lambda_0)$, par hypothèses, il existe des compléments fermés X_0 et Y_0 tels que

$$X = \ker D \oplus X_0$$
$$Y = \operatorname{im} D \oplus Y_0$$

Ces derniers induisent des projection naturelles

$$\pi_1 : X \to \ker D$$
$$\pi_2 : Y \to Y_0$$

Elle sont continues via la théorème du graphe fermé. Posons alors

$$\psi : \ker D \times X_0 \times \Lambda \to X \times \Lambda, (v, w, \lambda) \mapsto (v + w, \lambda) \text{ et } \widetilde{F}(v, w, \lambda) = F(\psi(v, w, \lambda))$$

Il est clair que l'on peut simplement travailler avec $\widetilde{F}$ (via π_1)

$$\widetilde{F}(v, w, \lambda) = 0 \iff \begin{cases} \pi_2 \widetilde{F}(v, w, \lambda) = 0 \\ (\mathrm{Id} - \pi_2)\widetilde{F}(v, w, \lambda) = 0 \end{cases} \tag{8}$$

Considérons alors U_2, W_2 des ouverts de $\ker D$ de et X_0 respectivement tels que $U_2 + W_2 \subseteq U$ et la fonction

$$G : U_2 \times W_2 \times V \to \operatorname{im} D : (v, w, \lambda) \mapsto (\mathrm{Id} - \pi_2)\widetilde{F}(v, w, \lambda) \tag{9}$$

Si $v_0 = \pi_1(x_0)$ et $w_0 = (\mathrm{Id} - \pi_1)(x_0)$ alors

$$G(v_0, w_0, \lambda_0) = 0 \text{ et } D_2 G(v_0, w_0, \lambda_0) = (\mathrm{Id} - \pi_2) D_1 F(x_0, \lambda_0) : X_0 \to \operatorname{im} D$$

Ainsi, $D_2G(v_0, w_0, \lambda_0)$ est bijectif et continu, ce qui nous permet d'appliquer le théorème des fonctions implicites, i.e , il existe un voisinnage $U_1 \times V_1$ de (v_0, λ_0) dans $U_2 \times V$ une fonction $\varphi \in C^1(U_1 \times V_1, W_2)$ telle que $\varphi(v_0, \lambda_0) = w_0$

$$\forall (x, w, \lambda) \in U_1 \times W_2 \times V_1, G(v, w, \lambda) = 0 \Leftrightarrow w = \varphi(v, \lambda)$$

Ainsi, $U_1 \times V_1$ et

$$\Phi(v, \lambda) : U_1 \times V_1 \to Y_0, (v, \lambda) \mapsto \pi_2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda) \tag{10}$$

répondent à la question □

On résume la procédure ci-dessus : On scinde l'espace d'arrivée en 2 grâce à π_2, ensuite on obtient une description (sur un certain sous voisinnage) des solution de la partie $\operatorname{im} D$, et on applique la seconde projection pour avoir une solution du système 8. Des calculs simples nous peremettent d'obtenir

Corollaire 2.1. *Avec les notations de la preuve précédente,*

$$D_1\varphi(v_0, \lambda_0) = 0 \text{ et } D_1\Phi(v_0, \lambda_0) = 0$$

Remarque 2.2. Notez que lors de la procédure précédente, le choix des espaces compléments X_0 et Y_0 est arbitraire. Ainsi, à un problème de bifurcation donné, il existe potentiellement plusieurs fonction de bifurcation associées... Cela motive déjà l'approche proposée lors de la section 2.2.2 où on introduit la notion d'équivalence entre problèmes de bifurcation. C'est Golubitsky dans [9] qui remarqua qu'on peut relier le choix arbitraire fait lors de la réduction de Lyapunov-Schmidt avec la notion d'équivalence entre bifurcation : i.e , on veux que deux façon de réduire donnent des fonctions de bifurcation équivalente.

Un exemple classique, la formulation est inspirée de [SOURCE].

Exemple 2.3. Supposons avoir poutre élastique parfaitement cylindrique fixée verticalement à un support et à laquelle on soumet une charge P, tant que P est faible, il ne se passe rien, si P excède une certaine valeur critique, alors la poutre va se *tordre*, cette valeure critique sera une bifurcation ! On suppose la poutre très fine par rapport à sa taille, et que la déformation est planaire i.e, la poutre se courbe dans un plan. Pour le choix des coordonées, on va prendre l'abcisse curviligne, et on note alors $\theta(s)$ l'angle fait par la tangente en l'abcisse curviligne s, l'équation s'écrit alors

$$D^2\theta + P \sin\theta = 0$$ [2]

On fixe également des *conditions de bord* $D_1\theta(0) = D_1\theta(1)$ (on suppose que le cylindre a une longueur 1 et qu'on a fixé les extêmités). Si on pose $Y = C^0([0, 1])$, et $X = \{f \in C^2([0, 1]) | f'(0) = f'(1) = 0\}$ alors Y est un espace de banach (avec la norme habituelle) et X est un espace de banach avec la norme $||f||_2 = ||f||_{[0,1]} + ||f'||_{[0,1]} + ||f''||_{[0,1]}$ posons $\lambda = P - P_{crit}$ avec P_{crit} la valeure critique , on écrit alors

$$F : X \times \mathbb{R} \to Y | (\theta, \lambda) \mapsto D^2\theta + \lambda \sin\theta$$

2. C'est Euler qui a obtenu cette équation en premier

2.1.1 Cas où $\dim \Lambda = 1$

dans la suite, nous supposon $\dim \Lambda = 1$,rappelons que dans ce cas, on peut identifier D_2F avec un élément de Y (cf. remarque 1.13)

On peut déjà présenter un cas très simple, la "bifurcation" *fold* (repliment), on met des guillemets car tous les auteurs ne la considèrent pas comme une "vraie" bifurcation, cela deviendra clair dans la suite.

Théorème 2.2 (Fold)

Soient X, Y des espaces de Banach, $U \times V$ un ouvert de $X \times \mathbb{R}$ et $(x_0, \lambda_0) \in U \times V$ supposons que

- $F \in C^1(U \times V, Y)$
- $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et $\dim(\ker D_1 F(x_0, \lambda_0)) = \dim(Y / \operatorname{im} D_1 F(x_0, \lambda_0)) = 1$
- $D_2 F(x_0, \lambda_0) \notin \operatorname{im}(D_1 F(x_0, \lambda_0))$ (Traversabilité)

Alors il existe une courbe C^1

$$\gamma :]-\delta, \delta[\to X \times \mathbb{R}$$

Telle que $\gamma(0) = (x_0, \lambda_0)$

$$F(\gamma(]-\delta, \delta[)) = \{0\}$$

De plus, sur un voisinage de (x_0, λ_0), toutes les solutions sont sur la courbe

Preuve. En applicant 2.1, et avec les notations de ce théorème, on sait qu'il existe un voisinage de (x_0, λ_0), $U_1 \times V_1$ sur lequel le problème se ramène résoudre $\Phi(v, \lambda) = 0$. Par hypothèses et via 1.1.2, cette fonction est continument dérivable par rapport à λ, et on a alors, en appliquant la définition de Φ donnée par 10

$$D_2 \Phi(v_0, \lambda_0) = \pi_2 D_2 F(v_0 + \varphi(v_0, \lambda_0), \lambda_0) = \pi_2 D_2 F(x_0, \lambda_0)$$

or, étant donné que $D_2 F(x_0, \lambda_0) \notin \operatorname{im}(D_1 F(x_0, \lambda_0))$, la projection doit être différente de zéro ! On applique alors le théorème des fonctions implicites, et donc, quitte à reduire $U_1 \times V_1$, on peut supposer l'existence d'une fonction

$$\psi : U_1 \to V_1 \text{ telle que } \begin{cases} \psi(v_0) = \lambda_0 \\ \forall v \in U_1, \Phi(v, \psi(v)) = 0 \end{cases}$$

On construit alors γ : considérons

$$x_1 \in X : ||x_1|| = 1 \text{ et } \ker D_1 F(x_0, \lambda_0) = \rangle x_1 \langle_{\mathbb{R}}$$

Soit $\delta > 0$ tel que $v_0 + t x_1 \in U_1$ si $|t| < \delta$ et

$$\gamma :]-\delta, \delta[\to X \times \mathbb{R}, t \mapsto \begin{pmatrix} v_0 + t x_1 + \varphi(v_0 + t x_1, \psi(v_0 + t x_1)) \\ \psi(v_0 + t x_1) \end{pmatrix}$$

Répond à la question. □

Des calculs simples permettent de montrer que

Corollaire 2.4. *avec les notations du théorème précédent, vecteur tangent en (x_0, λ_0) est donné par*

$$(x_1, 0)$$

On a alors simplement la situation "vecteur tangent vertical"

Exemple 2.5. un exemple d'application en dimension finie,tiré de [SOURCE]. Considérons un modèle climatique (très) simple, posons C la capacité thermique de la terre, T la température de surface moyenne et E_1, E_2 les énergies entrantes et sortantes, respectivement, on écrit d'abord

$$CD_1T = E_1 - E_2$$

Pour calculer E_2, on applique simplement la loi de Stefan-Boltzmann pour E_1, ça va être l'énergie reçue par le soleil à laquelle on soustrait l'énergie reflétée par la terre, ansi, en posant α l'albédo de la terre et Q l'energie reçue par le soleil,

$$CD_1T = E_1 - E_2 = (1-\alpha)Q - C_2T^4$$

où C_2 est simplement une constante. Bien sûr, la glace qui se trouve près des poles reflète bien plus la lumière que l'ocean et donc α va dimininuer si la température augmente, on peut, par exemple, écrire

$$\alpha = a - bT \text{ ou } a > 1 \text{ et } b > 0 \text{ sont des constantes}$$

on a alors

$$CD_1T = E_1 - E_2 = (1 - a + bT)Q - C_2T^4 = F(T, Q)$$

On aura une bifurcation "fold" TO DO [Calculs]

Un exemple plus intéressant : con

Remarque 2.6. On pourrait se dire qu'il doit être possible d'effacer cette bifurcation en opérant une rotation dans $X \times \mathbb{R}$. En principe oui, mais en pratique, X est interprété comme étant l'espace d'états d'un système, par exemple un espace de phase d'un système mécanique, un espace de fonctions (corde vibrante,tambour, ...), Y est un espace d'obersevables, et on voit lambda comme une perturbation *externe* du système. On peut donc pas mélanger le paramètre avec les variable d'état

La plupart des articles de théorie de la bifurcation supposent l'existence d'une *courbe de solutions triviales*, i.e $\gamma : \mathbb{R} \to X \times \mathbb{R}$ tel que $F(\gamma(\mathbb{R})) = 0$. Bien sûr, on peut supposer que cette courbe est simplement donnée par $\gamma(s) = (0, s)$, en posant

$$\widetilde{F}(x, \lambda) = F(\gamma_1(\lambda) + x, \gamma_2(\lambda))$$

Ainsi, on parlera de (vraie) bifurcation en (x_0, λ_0) lorsqu'il existe, pour tout voisinnage de (x_0, λ_0), des solutions n'étant pas sur la branche triviale.On peut bien sûr supposer que celà à lieu en $(0, 0)$ Le résultat suivant nous donne un petit critère pour l'existence de telles solutions non triviales, on présente ainsi la *bifurcation simple*, ou encore *bifurcation depuis une branche princiaple*. Dans la suite, nous supposons $F \in C^2(U \times V, Y)$ dans ce cas , on peut identifier $D^2_{12}F$ avec un élément de $\mathcal{L}(X, Y)$ et on peut permuter les dérivées

Théorème 2.3 (Crandall-Rabinowitz, bifurcation simple)

Avec les notations de 2.1.1, suppons que

- $F \in C^2(U \times V, Y)$
- $F(0, \lambda_0) = 0$ et $\dim(\ker D_1(0, \lambda_0)) = \dim(Y/\operatorname{im} D_1(0, \lambda_0)) = 1$
- $F(0, \mathbb{R}) = 0$ (branche triviale)
- On peut supposer $\ker(D_1 F(0, \lambda_0)) = \rangle x_1 \langle_{\mathbb{R}}$ avec $||x_1|| = 1$ et on impose alors $D^2_{12} F(0, \lambda_0) x_1 \notin \operatorname{im} D_1 F(0, \lambda_0)$ (Traversabilité)

Alors il existe une courbe de solutions non triviale $\gamma :]-\delta, \delta[\to X \times \mathbb{R}$ telle que $\gamma(0) = (0, \lambda_0)$ Il existe alors un voisinnage de $(0, \lambda_0)$ tel que tous les zéros de $F(x, \lambda)$ sont soit sur la branche triviale, soit sur γ.

Preuve. Bien sûr, on applique immédiatement 2.1 et avec les notations de ce théorème, considérons alors $\Phi : U_1 \times V_1 \to Y_0$ la fonction de Bifurcation, par hypothèses

$$\forall \lambda \in V_1, \Phi(0, \lambda) = 0$$

et donc

$$\Phi(v, \lambda) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \Phi(tv, \lambda) dt = \int_0^1 D_1 \Phi(tv, \lambda)(v) dt$$

considèrons alors $\delta > 0$ tel que $sx_1 \in U_1$ si $|s| < \delta$ posons alors

$$\widetilde{\Phi} :]-\delta, \delta[\times V_2 \to Y_0, (s, \lambda) \mapsto \int_0^1 D_1 \Phi(tsx_1, \lambda)(x_1) dt$$

Par hypothèses, $\widetilde{\Phi}$ est C^1, et via 2.1, $\widetilde{\Phi}(0, \lambda_0) = 0$. On a

$$\begin{aligned}
&D_2(D_1 \Phi(v, \lambda) x_1) \\
&= D_2(\pi_2 D_1 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda))(x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda) x_1) \\
&= \pi_2 D^2_{11} F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)[x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda) x_1, D_2 \varphi(v, \lambda)] \\
&+ \pi_2 (D_1 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)) D^2_{21} \varphi(v, \lambda) x_1 \\
&+ \pi_2 D^2_{12} F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)(x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda) x_1)
\end{aligned}$$

En évaluant cett expression en $(0, \lambda_0) = 0$, et via 2.1, le premier terme s'annule, au de la définition de π_2, le second s'annule aussi. Et donc, encore via 2.1 et par hypothèses on a TO DO [JUSTIF DERIVATION INTEGRALE]

$$D_\lambda \widetilde{\Phi}(0, \lambda_0) = \pi_2 D^2_{12} F(0, \lambda_0) x_1 \neq 0$$

De façon similaire à 2.1.1, on applique le théorème des fonctions implicites, donc quitte à reduire l'intervalle $]-\delta, +\delta[$, on peut supposer l'existence d'une fonction

$$\psi :]-\delta, \delta[\to V_1 \text{ telle que } \begin{cases} \psi(0) = \lambda_0 \\ \forall s \in]-\delta, \delta[, \widetilde{\Phi}(s, \psi(s)) = 0 \end{cases}$$

et, du fait que

$$\Phi(sx_1, \psi(s)) = s\widetilde{\Phi}(s, \psi(s)) = 0$$

La courbe

$$\gamma :]-\delta, \delta[\to X \times \mathbb{R}, s \mapsto \begin{pmatrix} sx_1 + \varphi(sx_1, \psi(s)) \\ \psi(s) \end{pmatrix}$$

Répond à la question

□

Remarque 2.7. Notez que dans les deux cas, on a supposé que l'index de Fredholm était nul. La plupart des théorèmes classiques de bifurcation se placent dans ce cas. La théorie devient beaucoup plus compliquée si on suppose l'inex non-nul

Notez comme les calculs deviennent déjà un peu lourds alors qu'il s'agit de la bifurcation la plus simple ! Ainsi, nous motivons déjà l'approche par *théorie des singularités* que nous exposons dans la 2.2. Cependant, cette approche suppose qu'on a réussi à se ramemener en dimension finie, ça ne marche pas si l'espace des paramètres en dimension infinie ! D'où la sous-section suivante.

2.1.2 Cas où $\dim \Lambda = \infty$

Il est possible d'obtenir quelques résultats quand la dimension de l'espace de paramètre est infinie. Notez que ça n'a pas été très souvent fait, car en général les paramètres sont iterprétés comme une "perturbation" du système dynamique (rappelez vous que souvent, la fonction est un genre de potentiel, et l'annuler revient à trouver des points d'équilibre). Nous présentons alors un théorème de bifurcation tiré de [11]. Généralison un peu le γ qui apparaît dans les résultats précédents :

Définition 2.8. Si (x_0, λ_0) est une zéro de $F(x\,\lambda)$ alors et si U est un ouvert non vide de X, alors $\gamma \in C^0(U, X \times \Lambda)$ est une poursuite de (x_0, λ_0) si $F(\gamma(U)) = \{0\}$

Définition 2.9. Avec les notations habituelle, un zéro (x_0, λ_0) de $F(x, \lambda)$ est un *élément de bifurcation* si il existe deux suites $(x_i, \lambda_i)_{i\in\mathbb{N}}, (x'_i, \lambda'_i)_{i\in\mathbb{N}}$ telles que $x'_i \neq x_i$ pour tous $i \in \mathbb{N}$, convergent vers (x_0, λ_0) et $F(x_i, \lambda_i) = F(x'_i, \lambda'_i) = 0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$. Un élémént de bifurcation est dit *perpendiculaire* si il existe une suite de X $(x_i)_i$ qui tend vers x_0 tell que $F(x_i, \lambda_0) = 0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$

Remarque 2.10. Remarquez qu'une bifurcation depuis la branche triviale est un élément de bifurcation mais que l'inverse n'est pas vrai.

Dans la suite de cette section, nous suppons F C^k $(k \geq 1)$ sur un ouvert contenant (x_0, λ_0) et $\mathrm{Ind}(D_1F(x_0, \lambda_0)) = 0$ (c.f remarque 2.7). Posons également $D_1 = D_1F(x_0, \lambda_0)$ et $D_2 = D_2F(x_0, \lambda_0)$

Définition 2.11. Avec les notations habituelles, si F est C^1, on note

$$\alpha_F(x_0, \lambda_0) = \dim \big(\ker(D_2^*) \cap \ker(D_1^*) \big)$$

C'est vraiment **la** bonne idée de P. Marx qui permet de gérer le cas $\dim \Lambda = \infty$: imposer des conditons sur les opérateurs duaux. Notez qu'étant donné qu'on suppose l'index nul, si $\dim \ker(D_1 F) = n$ on a $0 \leq \alpha \leq n$

Définition 2.12. Avec les notations habituelles, un zéro (x_0, λ_0) est un de type (α, n) si

$$\dim \ker D_1 = n = \dim \ker(D_1^*) \qquad \text{et} \qquad \alpha_F(x_0, \lambda_0) < n$$

Considérons alors

$$x_1, \cdots, x_n \in X : \rangle x_1, \cdots, x_n \langle_{\mathbb{R}} = \ker(D_1)$$

et,

$$y_1^*, \cdots, y_n^* \in Y^* : \rangle y_1^*, \cdots, y_n^* \langle_{\mathbb{R}} = \ker(D_1^*)$$

Grâce au théorème de Hanh-Banach, on complète bi-orthonogalement, i.e

$$\exists x_1^*, \cdots, x_n^* \in X^*, y_1, \cdots, y_n \in Y : \forall 1 \leq i, j, k, l \leq n,\ x_i^*(x_j) = \delta_{ij} \text{ et } y_l^*(y_k) = \delta_{kl} \tag{11}$$

On obtient alors une caractérisation algébrique pour être un zéro de type $(0, n)$

Proposition 2.13. (x_0, λ_0) est un zéro de type $(0, n)$ si et seulement si les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement indépendants

Preuve. Supposons d'abord que $\alpha = 0$ et que les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement dépendants, on a alors

$$\exists c_1, \cdots, c_n \in \mathbb{R} : \sum_{j=1}^{n} c_j D_2^* y_j^* = 0 \text{ et } \sum_{j=1}^{n} |c_j| > 0$$

et donc du fait que les y_j^* sont linéairement indépendants et qu'ils sont dans $\ker D_1^*$, on a

$$D_2^* \left(\sum_{j=1}^{n} c_j y_j^* \right) = 0 \text{ et } \sum_{j=1}^{n} c_j y_j^* \neq 0 \Rightarrow \ker(D_2^*) \cap ker(D_1^*) \neq 0$$

une contradiction.
Supposons désormais que les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement indépendants et que $\alpha \geq 1$. On sait alors que

$$\exists d_1, \cdots, d_n \in \mathbb{R} : y_0^* = \sum_{j=1}^{n} d_j y_j^* \in \ker(D_2^*) \cap ker(D_1^*) \text{ et } \sum_{j=1}^{n} |d_j| > 0$$

Il vient alors

$$D_2^* y_0^* = \sum_{j=1}^{n} d_j D_2^* y_j^* = 0$$

donc tous, étant donné que les $D_2^* y_j^*$ sont indépendants, les d_j sont nuls, contradiction. □

On a immédiatement le lemme suivant

Lemme 2.14. $\alpha = n$ si et seulement si tous les $D_2^* y_j^*$ sont nuls

Remarque 2.15. La notion de zéro de type (α, n) généralise les conditions de travaersabilité du type de celle de 2.1.1 ! On peut montrer le résultat suivant :

Lemme 2.16. Dans les conditions présentes, si $\dim \Lambda = 1$, (x_0, λ_0) est un zéro de type (α, n) si et seulement si $D_2 \notin \operatorname{im} D_1$

La proposition 2.13 nous suggère de considérer le cas particulier d'un zéro de type $(0, n)$. On complète les $D_2^* y_j^* \in \Lambda^*$ bi-orthonogalement par $(\lambda)_{0 \leq j \leq n}$. On a également la bi-orthonogalité des y_j^* et des $D_2 \lambda_i$, on considère l'opérateur associé de Schmidt associé (voir 5), qui s'écrit donc

$$U = -D_1 + \sum_{i=1}^{n} x_i^*(\cdot) D_2 \lambda_i \tag{12}$$

Si (x_0, λ_0) est un zéro du type $(0, n)$

$$G : X \times \Lambda^2 \to Y \times \Lambda : (x, \lambda, \mu) \mapsto \begin{pmatrix} F(x, \lambda) \\ -\mu + \lambda - \lambda_0 + \sum_{i=1}^{n} x_i^*(x - x_0)\lambda_i \end{pmatrix}$$

Le nom n'est pas choisi au hasard, c'est exactement le même genre d'idée que 9 : on regarde une fonction dans un espace plus gros, dont la dérivée est non-singulière, on applique le théorème de dérivation des fonctions implicites et on espère pouvoir en tirer des résultat sur le problème de départ. Remarquons d'abord qu'à chaque zéro de F correspond un zéro de G. En effet, si $F(x_1, \lambda_1) = 0$ alors, en prenant

$$\mu = \lambda_1 - \lambda_0 + \sum_{i=1}^{n} x_i^*(x_1 - x_0)\lambda_i$$

On annule G, et pareil, si on suppose $S(x, \lambda, \mu) = 0$, on a que $F(x, \lambda) = 0$. On a donc une bijection entre les zéros de G et de F. Si F est C^k alors clairement G est C^k. Montrons alors qu'on peut appliquer le théorème des fonctions implicites

Lemme 2.17. Si (x_0, λ_0) est de type $(0, n)$, alors

$$D_{1,2} G(x_0, \lambda_0, 0) : X \times \Lambda \to Y \times \Lambda$$

Est inversible d'inverse continu

Preuve. Fixons un élément (y_1, λ_1) dans $Y \times \Lambda$ et considérons le système

$$D_{1,2}(x_0, \lambda_0, 0)(\overline{x}, \overline{\lambda}) = \begin{pmatrix} D_2 \overline{\lambda} + D_1 \overline{x} \\ \overline{\lambda} + \sum_i^n x_i^*(\overline{x})\lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ \lambda \end{pmatrix}$$

Il a l'unique solution

$$\overline{\lambda} = \lambda + \sum_{i=1}^{n} x_i^*(y - D_2\lambda)\lambda_i$$
$$\overline{x} = U^{-1}(D_2\lambda - y)$$

Et on a alors calculé son inverse, un corollaire du théorème de l'application ouverte permet de conclure. (voir, par exemple, [SOURCE, ça doit être fait dans Rudin ou dans le cours d'Esser...]) □

En appliquant le théorème des fonctions implicites, on en tire immédiatement le résultat suivant :

Proposition 2.18. Si (x_0, λ_0) est un zéro de type $(0, n)$ alors il existe $V_1 \ni \lambda_0$ un ouvert de Λ et U_1 un ouvert de $X \times \Lambda \ni (x_0, \lambda_0)$

$$\varphi_1 : V_1 \to \Lambda \text{ et } \varphi_2 : V_1 \to X$$

tels que

- $\varphi_1, \varphi_2 \in C^k(V_1)$
- $\varphi_1(0) = \lambda_0$ et $\varphi_2(0) = x_0$
- $F(\varphi_2(\mu), \varphi_1(\mu)) = 0$ et $-\mu + \varphi_1(\mu) - \lambda_0 + \sum_{i=1}^{n} x_i^*(\varphi_2(\mu) - x_0)\lambda_i = 0$ si $\mu \in V_1$
- $(\varphi_2(V_1), \varphi_1(V_1)) \subseteq U_1$

On peut obtenir une description explicite de φ_1 et φ_2. La preuve consistant en des calculs ennuyeux, on l'admet

Corollaire 2.19. *Dans les condition de la proposition précédente, et en exigent F au moins C^2. Si on pose $T(\mu) = \mu - \sum_{i=1}^{n}(D_2^* y_i^*)(\mu)\lambda_i$*

$$W : \Lambda \to Y : \mu \mapsto D_{22}^2\Big(T(\mu), T(\mu)\Big) + 2D_{21}^2\Big(T(\mu), U^{-1}\big(D_2\mu\big)\Big) + D_{11}^2\Big(U^{-1}\big(D_2\mu\big), U^{-1}\big(D_2\mu\big)\Big)$$

Et

$$R : V \to X,\ ||R(\mu)|| = o(||\mu||^2) \text{ si } \mu \to 0$$

Alors,

$$\varphi_1(\mu) = \lambda_0 + \mu - \sum_{i=1}^{n}\Big(D_2^* y_i^*(\mu) + y_i^*\big(\frac{1}{2}W(\mu) + U(R(\mu))\big)\Big)\lambda_i \tag{13}$$

$$\varphi_2(\mu) = x_0 + U^{-1}\Big(D_2\mu + \frac{1}{2}W(\mu) + U(R(\mu))\Big) \tag{14}$$

Nous allons maintenant obtenir un critère de bifurcation pour le cas d'un zéro de type $(0,1)$. Avant de présentez la preuve, résumons un peu la situation sur un diagramme

$$\begin{tikzcd}
 & X \times \Lambda \arrow[dl, "\pi_1"'] \arrow[d, "F"] \arrow[dr, "\pi_2"] & \\
X \arrow[r, "D_1"'] & Y & \Lambda \arrow[l, "D_2"] \\
 & V_1 \arrow[ul, "\varphi_2"] \arrow[ur, "\varphi_1"'] &
\end{tikzcd}$$

$$X^* \xleftarrow{D_1^*} Y^* \xrightarrow{D_2^*} \Lambda^*$$

Théorème 2.4 (B. Marx, 1994)

Si (x_0, λ_0) est un zéro de $F(x, \lambda)$ type $(0,1)$, si on suppose F C^2 sur un voisinnage de (x_0, λ_0), d'index de fredholm nul en (x_0, λ_0) et telle que

$$y_1^* \left(D_{11}^2 F(x_1, x_1)\right) \neq 0$$

alors c'est un élément de bifurcation non perpendiculaire

Preuve. On va supposer μ et λ_1 allignés, i.e $\mu = t\lambda_1$ avec $t \in \mathbb{R}$ tel que $t\lambda_1 \in V_1$. Au vu de 13 et la proposition 2.18 on doit résoudre $\lambda = \varphi_1(t\lambda_1)$, par bi-orthonogalité, on a

$$\begin{aligned}
\lambda = \varphi_1(t\lambda_1) &= \lambda_0 + t\lambda_1 - \left(D_2^* y_1^*(t\lambda_1) + y_1^*\big(\frac{1}{2}W(t\lambda_1) + U(R(t\lambda_1))\big)\right)\lambda_1 \\
&= \lambda_0 - \left(y_1^*\big(\frac{1}{2}W(t\lambda_1) + U(R(t\lambda_1))\big)\right)\lambda_1
\end{aligned}$$

Remarquons que, encore une fois par bi-orthonogalité, on a

$$T(t\lambda_1) = t\lambda_1 - \sum_{i=1}^{n} (D_2^* y_i^*)(t\lambda_1)\lambda_i = 0$$

et donc

$$W(t\lambda_1) = t^2 D_{11}^2(U^{-1}(D_2\lambda_1), U^{-1}(D_2\lambda_1))$$

On remarque que, par hypothèses (rappelez vous que les x_i c'est une base de $\ker D_1$)

$$U(x_1) = D_2\lambda_1$$

et enfin, en posant $g(t) = \frac{1}{2}y_1^*(D_{11}^2 F(x_1, x_1))t^2 + y_1^*(U(R(t\lambda_1)))$, on écrit

$$\lambda = \lambda_0 - g(t)\lambda_1$$

Notons que g est C^2, $g(0) = 0$, $g'(0) = 0$ et $g''(0) = y_1^* \left(D_{11}^2 F(x_1, x_1)\right) \neq 0$, on applique alors le lemme de morse et pour réécire g

$$g(\Phi(r)) = \frac{1}{2} y_1^* D_{11}^2(x_1, x_1) r^2$$

avec Φ un C^1 difféomorphisme sur V_1, on peut sans perte de généralité supposer $\Phi(0)$. Cela étant, Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (\operatorname{im} g)^{\mathbb{N}}$ et telle que $u_n \to 0$, il existe alors $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que

$$u_n = \frac{1}{2} y_1^* (D_{11}^2 F(x_1, x_1)) v_n^2$$

on pose alors $v_n^+ = \sqrt{2u_n y_1^* (D_{11}^2(x_1, x_1))^{-1}}$ et $v_n^- = -\sqrt{2u_n y_1^* (D_{11}^2(x_1, x_1))^{-1}}$. Bien sûr, $v_n^- \neq v_n^+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons également

$$\lambda_n = \lambda_0 - g(\Phi(v_n))$$

Par construction, $\lambda_n \to \lambda_0$. On construit églament

$$x_n \pm = \varphi_2(\Phi(v_n^\pm)\lambda_1)$$

Notez que $\Phi(v_n^\pm)$ tendent vers zéro, donc $F(x_n^\pm, \lambda_n)$ tendent vers zéro. Montrons qu'il existe n_0 tels que $x_n^- \neq x_n^+$ si $n \geq n_0$, cela revient à demander que si t_1 et t_2 sont assez petits, $\varphi_2(t_1) \neq \varphi_2(t_2)$. Supposons que ça ne soit pas le cas, on pose

$$\psi(t\lambda_1) = \frac{1}{2} U^{-1} D_{11}^2(x_1, x_1) t^2 + R(t\lambda_1)$$

On a alors, utilisant la définition de φ_2 13

$$\psi(t_2\lambda_1) - \psi(t_1\lambda_1) = (t_1 - t_2)$$

On applique alors le théorème de la moyenne sur $h(t) = \psi(t\lambda_1)$, et on récupère

$$0 < ||\lambda_1|| \leq \sup_{l\in[0,1]} ||h'(t_1 + l(t_2 - t_1))||$$

mais $h'(0) = 0$ et est continue, contradiction. $\square$

Remarque 2.20. B. Marx dans [11], a montré un résultat pour le cas d'un zéro de type $(0, 2)$. La preuve est encore plus calculatoire que la précédente : le cas des autre type de zéros est un problème ouvert. Il est assez clair que pour travailler avec des zéros (α, n) généraux, il faudrait changer de méthode...

2.2 Approche via la théorie des singularités

Dans les années 80 Golubitsky dans [9] introduisit deux approches révolutionnaire pour traier des problèmes de bifurcations : il eu la brillante idée d'appliquer des techniques de théorie des singularités et de théorie des groupes, ce qui lui permit d'entreprendre un travail de Classification. En 2021, James Monteldi reprit le travail de Golubitsky et étendit son travail de classification dans [12]. Dans les prochains paragraphes, nous proposons une synthèse de leurs idées

2.2.1 L'anneau $\mathcal{E}_n$

Définition 2.21. Soient X, Y des espaces topologiques, $x_0 \in X$ et $y_0 \in Y$ on pose

$$\mathcal{G}(x_0, X, Y, y_0) = \{f \in C^0(U, Y) | U \in \mathcal{V}_{x_0}, f(x_0) = y_0\}$$
$$\mathcal{G}(x_0, X, Y) = \{f \in C^0(U, Y) | U \in \mathcal{V}_{x_0}\}$$

Si de plus, on a une notion de fonction C^k sur X et Y (par exemple, si ce sont des espaces de Banach) on défini naturellement $\mathcal{G}_k(x_0, X, Y, y_0)$ et $\mathcal{G}_k(x_0, X, Y)$ en imposant que les fonctions soient C^k sur leur domaines.

Définition 2.22. Soient X, Y des espaces topologiques, $f, g \in \mathcal{G}(x_0, X, Y)$ on définit la relation d'équivalence suivante

$$f \sim_{x_0} g \Leftrightarrow \exists U \in \mathrm{dom}(f) \cap \mathrm{dom}(g) : f_{|_U} = g_{|_U}$$

Bien sûr, si $f \sim_{x_0} g$ alors $f(x_0) = g(x_0)$, la définition suivante est donc licite

Définition 2.23. Soient X, Y des espaces topologiques sur lesquels on a une notion de fonctions C^k, *l'espace des germes lisses* est donné par

$$\mathcal{E}(x_0, X, Y) = \mathcal{G}_\infty(x_0, X, Y)/\sim_{x_0}$$

On pose $\mathcal{E}_n = \mathcal{E}_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$

Remarque 2.24. La notion moderne généralisant ce genre de structure est appelé *faisceau*. Si $(X, \mathcal{T})$ est un espace topologique, un *faisceau* d'ensemble $\mathcal{F}$ sur X est la donnée d'une famille d'ensembles $(\mathcal{F}(U))_{U \in \mathcal{T}}$ et d'une famille de fonction $(\rho_V^U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V))_{V \in \mathcal{T}, U \subseteq V}$ respectant les axiomes suivants :

- $\forall U \in \mathcal{T}$, $\rho_U^U = \mathrm{Id}_{\mathcal{F}(U)}$ (fonctorialité 1)
- $\forall U, V, W \in \mathcal{T} : U \subseteq V \subseteq W$, $\rho_U^V \circ \rho_V^W = \rho_U^W$. (fonctorialité 2)
- $\forall U \in \mathcal{T}, (U_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \mathcal{T}^{\mathcal{I}} : U = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$ si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ sont telles que $\forall i \in \mathcal{I}, \rho_{U_i}^U(s) = \rho_{U_i}^U(t)$ alors $s = t$ (localité)
- $\forall U \in \mathcal{T}, (U_i)_{i \in \mathcal{I}} \in \mathcal{T}^{\mathcal{I}} : U = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} U_i$, si $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ et si $\rho_{U_i \cap U_j}^U(s_j) = \rho_{U_i \cap U_j}^U(s_i)$ alors $\exists s \in \mathcal{F}(U)$ telle que $\forall i \in \mathcal{I}, \rho_{U_i}^U(s) = s_i$ (recollage)

Les deux axiomes sont des axiomes purement structurel (voir la section sur la théorie des catégorie). Les deux autres permettent de capturer les propriétés désirés. Ainsi,si Y alors $C^\infty(\cdot, Y) : U \mapsto C^\infty(U, Y)$ est un faisceau. Et si on défini enfin la *fibre* d'un faisceau en un point $x \in X$ comme étant

$$\mathcal{F}_x = \varinjlim_{U \ni x} F(U)$$

alors

$$\mathcal{E}(x_0, X, Y) = C^\infty(\cdot, Y)_{x_0}$$

On munit $\mathcal{E}_n$ d'une structure d'anneau de la façon suivante : si η_1, η_2 sont des germes et si $f \in \eta_1$ et $g \in \eta_2$, on considère $U = \mathrm{dom}(f) \cap \mathrm{dom}(g)$

$$\eta_1 + \eta_2 = [f_{|U} + g_{|U}]_{\sim 0} \text{ et } \eta_1 \cdot \eta_2 = [f_{|U} g_{|U}]_{\sim 0}$$

On vérifie facilement que ces opérations sont bien définies et que $(\mathcal{E}_n, +, \cdot)$ est un anneau commutatif, et que l'évaluation en 0 ainsi que la dérivée en 0 sont bien définies. Nous consacrons les paragraphes suivants à l'étude de cet anneau. Nous commençons par remarquer que c'est un anneau local

Remarque 2.25. Des notions similaires existent en dimension infini. C'est assez marginal car en pratique, l'approche par théorie des singularités suppose qu'on a effectué la réduction de Lyapunov–Schmidt. Le lecteur intéressé est invité à consulter TO DO ? [SOURCE qui cite le truc , ou annexe, on verra si j'ai le temps]

Proposition 2.26. l'ensemble $\mathcal{M}_n = \{\eta \in \mathcal{E}_n | \eta(0) = 0\}$ est l'unique idéal maximal de $\mathcal{E}_n$

Preuve. Il suffit d'observer que si $\eta \in \mathcal{E}_n \setminus \mathcal{M}_n$, alors il inversible. En effet, si $f \in \eta$ alors $1/f$ est défini sur un voisinage de zéro et $\xi = [1/f]_{\sim 0}$ est l'inverse de η □

On peut trouver un ensemble de générateurs pour $\mathcal{M}_n$. Rappelons que π_i est la projection sur la i-ième composante

Proposition 2.27. (Lemme Hadamard) Soient a, b des naturels, on a, en considérant $\mathbb{R}^{a+b} = \mathbb{R}^a \times \mathbb{R}^b$

$$I_A = \{[f]_{\sim 0} \in \mathcal{E}_{a+b} | f(0_a, y) = 0\} = \langle \pi_1, \cdots, \pi_a \rangle$$

Preuve. Posons $P = \langle \pi_1, \cdots, \pi_a \rangle$, il est clair que $P \subseteq I_A$, montrons l'autre inclusion. Soit $\eta \in I_a$ et soit $f \in \eta$. f est alors définie sur $B(0, \varepsilon)$ pour un certain $\varepsilon > 0$. En appliquant successivement le théorème de variations des primitives et de dérivation des fonctions composées, on obtient

$$f(x, y) = \int_0^1 D_t f(xt, y) dt = \int_0^1 \sum_{i=1}^n \pi_i(x) D_i f(tx, y) dt = \sum_{i=1}^n \pi_i(x) \int_0^1 D_i f(tx, y) dt$$

or les fonctions $(x, y) \mapsto \int_0^1 D_i f(tx, y)$ sont lisses (dérivée d'une fonction lisse et intégration sur un compact) ,ce qui permet de conclure. □

Un corollaire particulièrement utile

Corollaire 2.28.

$$\mathcal{M}_n^r = \left\langle \{x^\alpha : |\alpha| = r, \alpha \in \mathbb{N}^n\} \right\rangle$$

Preuve. cas $r = 1$: il s'agit du résultat précédent. Supposons le résultat établit pour $n \leq r$ il vient alors

$$f \in \mathcal{M}_n^{r+1} \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, g_1, \cdots, g_n \in \mathcal{M}_n^r : f = \sum_{j=1}^{n} x_j g_j$$

or les g_j sont dans l'idéal généré par les monômes de degré r. Et donc

$$\mathcal{M}_n^{r+1} \subseteq \left\langle \{x^\alpha : |\alpha| = r+1, \alpha \in \mathbb{N}^n\} \right\rangle$$

L'autre inclusion étant évidente, on conclut. □

Définition 2.29. Le jet d'ordre r d'une germe $f \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ à l'origine est donné par

$$j_0^r f(x) = \sum_{|\alpha| \leq r} \frac{1}{\alpha!} D^{(\alpha)} f(0) x^\alpha$$

L'espace de jet $J^k(n, m)$ défini comme

$$\{j_0^k f | f \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)\}$$

et alors un espace vectoriel

Notons que la fonction qui à une germe $[f]_{\sim_0}$ associe $[j_0^r f]_{\sim_0}$ est en fait une projection ! en effet,

$$\pi_r : \mathcal{E}_n \to \mathcal{E}_n / \mathcal{M}_n^{r+1}$$

correspond à prendre le jet d'ordre r, cela se déduit du corollaire suivant :

Corollaire 2.30.

$$f \in \mathcal{M}_n^r \Leftrightarrow \forall \alpha \in \mathbb{N}^n : |\alpha| < r, D_0^{(\alpha)} f = 0$$

Définition 2.31. Un idéal $I \triangleleft \mathcal{E}_n$ est de codimension finie si $\mathcal{E}_n / I$ est un espace vectoriel de dimension finie. Ce qui revient à demander qu'on puisse complémenter I par un espace vectoriel de dimension fini, i.e il existe J un sous vectoriel de dimension fini tel que

$$\mathcal{E}_n = I + J$$

Une cobase pour un tel idéal est une suite finie $(e_1, \cdots, e_r)$ de $\mathcal{E}_n$ telle que

$$\mathcal{E}_n = \rangle e_1, \cdots, e_r \langle_{\mathbb{R}} \oplus I$$

Rappelons le lemme de Nakayama

Lemme 2.32. (Nakayama) Soit R un anneau et M un idéal tel que si $a \in M$ alors $a+1$ est un inversible. Soient de plus I,J des ideéaux de R avec $I = \langle i_1, \cdots, i_n \rangle$, on a

$$I \subset J + \mathcal{M}I \Rightarrow I \subseteq J$$

Proposition 2.33.

$$\operatorname{codim} I < \infty \Leftrightarrow \ \exists r \in \mathbb{N} : \mathcal{M}_n^r \subset I$$

Démonstration. Si $M_n^r \subseteq I$ alors considérons $W = \rangle \{x^\alpha | \alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| < r\} \langle_{\mathbb{R}}$ on remarque alors que

$$\forall f \in \mathcal{E}_n, f = j_0^{r-1} f + (f - j_0^{r-1} f) \in W + I$$

et donc $\mathcal{E}_n = W + I$ ce qui montre le premier sens. Pour l'autre implication, on commence par définir la suite d'ideaux $(I_r)_{r>0} = (I + \mathcal{M}_n^r)_{r>0}$ on vient de montrer qu'ils sont tous de codimension finie, on remarque, de plus, que cette suite est décroissante (pour l'inclusion). Posons $c_r = \dim(\mathcal{E}_n / I_r)$ avec $I_0 = I$, il vient alors que la suite $(c)_{r>1}$ est croissante et majorée par c_0 qui est un entier fini : la suite doit stabiliser. ainsi, on peut trouver k tel que $c_k = c_{k+1}$ donc $\operatorname{codim}(I_k) = \operatorname{codim}(I_{k+1})$ or $I_k \supseteq I_{k+1}$ donc

$$I + \mathcal{M}_n^k = I + \mathcal{M}_n^{k+1}$$

On conclut , grâce à Nakayama, que $\mathcal{M}_n^k \subset I$ comme exigé □

2.2.2 Détermination finie

C'est le coeur du sujet : on veut pouvoir se ramemener à l'étude d'un nombre fini de termes du dévellopement de Taylor, comment être sûr qu'on a pas perdu d'information essentielle en tronquant la série ?

Nous introduisons la notion suivante

Définition 2.34. Si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, on dit que f est *k-$\mathcal{R}$-déterminée* si

$$\forall g \in \mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) : j^k g = j^k f, (f, g) \in \mathcal{R}$$

A la façon de Wall dans [15] nous allons considérer des relations d'équivalence induites par des actions de groupes sur l'espace des germes. Cela nous évite de traiter les différentes notions d'équivalence "une par une" comme le fait Montaldi dans [12] et d'obtenir rapidement un résultat assez puissant et général

Plus précesimment : on rappelle que si G agit à droite sur E, alors on a la relation d'équivalence naturelle

$$\sim_G : e \sim_G f \Leftrightarrow \exists g \in G : g \cdot e = f$$

Si G agit à droite et H agit à gauche, on définit naturellement l'action de $G \times H$ sur E

$$(g, h) \cdot x = g \cdot x \cdot h$$

Le groupe le plus naturel est $D(n)$ l'ensemble des germes de difféomorphismes de $\mathcal{E}(0,\mathbb{R}^n)$, son action sur $\mathcal{E}(0,\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$ par composition à droite (resp. à gauche) induit *l'équivalence droite* (resp. gauche). L'action de $D(n)\times D(m)$ sur $\mathcal{E}(0,\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$ induit l'équivalence gauche droite.
On considère $C(n,m)$ les familles de germes de difféomorphismes $\Phi=(\varphi_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ où Λ est un voisinnage ouvert de l'origine de $\mathbb{R}^n$ et les φ_λ sont dans $DL(m)$, on impose aussi que la dépendance en λ soit lisse. Il est clair qu'on peut identifier l'ensemble de telles familles à l'ensemble des éléments de $D(n+m)$ Φ tels que

$$\pi_n\circ\Phi=\pi_n \text{ et } \Phi(\cdot,0)=(\cdot,0)$$

C'est clairement un groupe. Si $f\in\mathcal{E}(0,\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$ alors on défini

$$(\varphi_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}\cdot f=x\mapsto\varphi_x(f(x))$$

C'est action induit *l'équivalence fibrée gauche*. Enfin, on pose $K(n,m)=D(n)\ltimes C(n,m)$, son action induit *l'équivalence de contact*. Dans la suite,on écrira G pour signifier un des groupes décrits ci dessus, et E la relation d'équivalence induite par l'aciton de G. On peut alors reformuler le problème de la façon suivante : $f\in\mathcal{E}(0,\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^m)$ est k-E-déterminée si $\mathrm{orb}_G(f)$ contient les germes ayant le même jet d'ordre k que f. On veut un équivalent de ce magnifique résultat de théorie des groupes de Lie

Théorème 2.5

Si G est un groupe de lie, M une variété lisse, si G agit sur M (par exemple) par la gauche et si V est une sous variété connexe et lisse de M alors

$\exists m\in M: V\subseteq G\cdot m\Leftrightarrow\forall v\in V, T_v(G\cdot v)\supseteq T_v(V)$ et $\dim T_v(G\cdot v)$ est toujours la même

la première condition est assez intuitive : en effet si on prend l'exemple d'une surface S présentant une symmétrie de révolution selon un axe, S^1 agit sur S (via la rotation autour de l'axe central) et les orbites sont alors des cercles. Ainsi une courbe qui vit dans S sera contenue dans une orbite si c'est un cercle qui entoure l'axe de révolution et on remarque que celà revient à exiger qu'en chaque point, l'espace tangent (ici la droite tangente à la courbe) soit inclus dans celui du cercle entourant l'axe de révolution généré par S^1 et ce point. En général, on veut que les points de V "très proches" de v puissent être atteint par des "petites" G-transformations, i.e , si on pas l'inclusion des espaces tangents, on peut "sortir" de l'orbite. La deuxième condition permet d'éviter les situations "dégénérées" où

$$\left\{G\cdot v|v\in V\right\}$$

n'est pas une variété. On veut donc une notion "d'espace tangent" pour les orbites induites par les actions décrites ci-dessus.
Rappelons qu'un module est simplement un espace vectoriel mais sur anneau à la place d'un champ, il est important de noter que cette relaxation fait qu'on peut trouver des modules

qui ne possèdent pas de bases (modules dits "à torsion"), un module libre est alors un module qui possède une base. On remarque assez facilement que $\mathcal{E}_n^m$ est un module libre sur $\mathcal{E}_n$ et que

$$\mathcal{E}(0, \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \cong \mathcal{E}_n^m$$

le corrolaire [corollaire] nous permet aussi de dire que

$$J^k(n, m) \cong (\mathcal{E}_n / \mathcal{M}_n^{m+1})^m$$

Si on voit ces ensembles comme des variétés, il est alors naturel de tenter de définir une notion d'espace tangent. Etant donné qu'il s'agit d'un espace de fonctions, il est naturel de considérer la notion de vecteurs *le long* d'une fonction

si M et N sont des C^1-variétés, et si $f \in C^1(M, N)$, on pose

$$tf : \Gamma(TM) \to \Gamma(f^*TN), v \mapsto Tf \circ v$$

Intuitivement : On regarde un champ de vecteurs sur M, pour chaque vecteur lié $(x, v(x))$ On transporte la base sur $f(x)$ et le vecteur $v(x)$ sur $D_x f(v(x))$! Cette définition s'applique naturellement aux germes, la façon la plus propre de l'écrire serait via les faisceaux (cf. remarque 2.24). On définit alors les espace tangent droits et droits étendus :

$$TR_f = tf(\mathcal{M}_n \cdot \mathcal{V}(\mathbb{R}^n)) \text{ et } TR_f^e = tf(\mathcal{V}(\mathbb{R}^n))$$

Ces espaces sont associés à l'équivalence droite. Pour le premier, on fixe l'image de zéro à zéro, pour l'autre, on la laisse libre.
On pose, de plus

$$wf : \Gamma(TN) \to \Gamma(f^*(TN)), v \mapsto v \circ f$$

On définit alors les espaces tangents gauches, gauches étendus et gauche-droite

$$TL_f = wf(\mathcal{M}_n \cdot \mathcal{V}(\mathbb{R}^n)), \, TL_f^e = wf(\mathcal{V}(\mathbb{R}^n))$$

$$TA_f = TR_f + TL_f, \, TA_f^e = TR_f^e + TL_f^e$$

On définit enfin

$$TC_f = f^*(\mathcal{M}_n \cdot \mathcal{V}(R^n))$$

et

$$TK_f = TR_f + TC_f, TK_f^e = TR_f^e + TC_f$$

Ces espaces tangents on une dimension infinie en général... définit donc

$$d(f, G) = \dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{M}_n \cdot \Gamma(f^*T\mathbb{R}^m)/T_f G)$$

bien sûr, $d_e(f, G)$ se définit de façon similaire (avec l'espace tangent étendu). On notera TG_f un de ces espaces tangents, et toute affirmation sur TG_f est à comprendre comme une

affirmation sur l'ensemble des espaces tangents ci-dessus. Nous avons besoin de quelques lemmes techniques avant de pouvoir caractériser la détermination finie

Lemme 2.35. Si f,$g \in \mathcal{E}_n^m$ sont tels que $j_0^{k-1}f = j_0^{k-1}g$ alors
- pour toute germe de champ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ v, $tf(v) - tg(v) \in \mathcal{M}^{k-1} \cdot V(f)$
- si $\lambda \in \mathcal{E}_n$, $f^*\lambda - g^*\lambda \in \mathcal{M}_n^k$
- Pour toute germe de champ de vecteurs de $\mathbb{R}^m$ v, $wf(v) - wg(v) \in \mathcal{M}^{k-1} \cdot V(f)$

Preuve.

□

Corollaire 2.36. *Dans les hypothèses du lemme précédent, on a*

$$TR_f^e + \mathcal{M}_n^{k-1} \cdot V(f) = TR_g^e + \mathcal{M}_n^{k-1} \cdot V(g)$$

et , si G est un des groupes habituels,

$$TG_f + \mathcal{M}_n^k \cdot V(f) = TG_g + \mathcal{M}_n^k \cdot V(g)$$

Lemme 2.37.

2.2.3 Classification en dimension finie

Définition 2.38. si U est un ouvert de R^n et $f \in C^0(U, \mathbb{R}^m)$ alors $x_0 \in U$ est un point critique si $Df(x_0)$ n'est pas de rang maximal. On pose $S_f(U)$ l'ensemble des points critiques de f dans U. $y \in f(U)$ est une valeur régulière si $f^{-1}(y) \cap S_f(U) = \emptyset$ et est une valeur singulière sinon.

3 Méthodes topologiques

TO DO [paragraphe introductif]

3.1 Le degré de Leray-Schauder

3.1.1 Premières notions

Plaçons nous, dans un premier temps, en dimension finie et considérons un ouvert U de $\mathbb{R}^n$, $f \in C^0(\overline{U}, \mathbb{R}^n)$ et $y \notin f(\partial U)$ et suppsons qu'on veuille construire une fonction deg qui "compte" le nombre de de solutions de l'équation $f(x) = y$ dans U. Faisons une petite analyse de la situation : remarquons d'abord qu'on doit avoir la *normalité*

$$\forall y \in U, \deg(\mathrm{Id}, U, y) = 1$$

De fait, dans ce cas la seule solution est $x = y$. Mainenant, si on a deux sous ensemble ouverts de U, V_1 et V_2 et qu'ils sont disjoints. Supposons de plus que toutes les solutions soient dans V_1 ou V_2 et qu'elles sont en nombre fini, alors on aimerais bien avoir *l'additivité*

$$\deg(f, U, y) = \deg(f, V_1, y) + \deg(f, V_2, y)$$

Le lecteur familier avec la topologie trouvera particulièrement naturel d'exiger une notion *d'invariance par homotopie*. Précisons, on dira que f et $g \in C^0(\overline{U}, \mathbb{R}^n)$ sont homotopes si on peut trouver

$$H \in C^0([0,1] \times \overline{U}, \mathbb{R}^n) : H(0, \cdot) = f \text{ et } H(1, \cdot) = g$$

Informellement, on déforme cotinument f vers g. Attention, on peut pas déformer comme on veut, il faut que cette déformation n'affecte pas l'ensemble des solutions. On formule alors une troisième condition, ainsi, si on a

$$H \in C^0([0,1]\times, \mathbb{R}^n), y \in C^0([0,1], \mathbb{R}^n) : \forall t \in [0,1], y(t) \notin H(t, \partial U)$$

alors on voudrait que

$$\deg(H(t, \cdot), U, y(t))$$

Soit toujours le même. Notez qu'en plus la fonction, on s'autorise aussi à bouger la "cible", mais on s'interdit de toucher la frontière ! De façon remarquable, en dimension finie, il y'a qu'une seule fonction qui possède ces proriétés ! On peut donc parler "du" degré. On l'appelle le *degré de Brouwer*

Définition 3.1. Si $U \subseteq \mathbb{R}^n$ est ouvert et borné, si $f \in C^0(\overline{U}) \cap C^1(U)$ et $y \in \mathbb{R}^n \setminus f(\partial U \cup S_f(U))$ alors on pose

$$\deg(f, U, y) = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \operatorname{sign} \det Df(x)$$

On peut montrer que cette fonction remplit bien les 3 conditions et que c'est la seule. Ensuite, via le théorème de Morse-Sard et quelques techniques d'approximation classiques, on peut généraliser cette fonction à $C^0(\overline{U})$, voir [4] pour les détails. Notez que les 3 conditions mènent à une fonction qui ne compte pas vraiment le nombre de solutions , mais associe un *signe* à chacune d'entre elle. Si on voit l'ensemble $f^{-1}(y)$ comme une hypersurface, le signe est positif si on en "sort" et négatif si on "rentre"

3.1.2 Construction

Il est impossible de généraliser la notion du degré de Brouwer aux espaces de Banach. Pour le voir, nous montrons un cas particulier du théorème du point fixe en utilisant uniquement les propriétés du degré et montrons ensuite qu'il ne s'applique pas en dimension infinie

Proposition 3.2. si $r > 0$ et $f \in C^0(\overline{B(0,r)}, \overline{B(0,r)})$ alors f admet un point fixe

Preuve. Si il existe $x \in \partial\overline{B(0,r)}$ tel que $f(x) = x$, on a terminé. Sinon, Considérons

$$H : [0,1] \times \overline{B(0,r)} \to \mathbb{R}^n : (t,x) \mapsto x - tf(x) \text{ et } y(t) = 0$$

C'est une homotopie entre $\mathrm{Id} - f$ et l'identité et $0 \notin H([0,1] \times \partial\overline{B(0,r)})$ car, si $x \in \partial\overline{B(0,r)}$, $H(t,x) = x - f(x) \neq 0$ par hypothèse et si $0 \leq t < 1$

$$|H(t,x)| \geq |x| - t|f(x)| \geq (1-t)r > 0$$

et donc

$$\deg(\mathrm{Id} - f, B(0,r), 0) = \deg(\mathrm{Id}, B(0,r), 0) = 1$$

et donc il existe $x \in B(0,r)$ tel que $x - f(x) = 0$ □

Un petit contre exemple en dimension infinie

Exemple 3.3. Considérons $X = l_\infty$

$$f : B(0,1)_\infty \to B(0,1)_\infty, (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \mapsto (1 - ||x||_\infty, \sqrt{|x_1|}, \sqrt{|x_2|}, \cdots)$$

On vérifie facilement que f est continue. Supposons donc qu'elle a un point fixe y, on aurait alors

$$y_1 = 1 - ||y||_\infty \text{ et, si } k \geq 2 \; y_k = |y_1|^{\frac{1}{2^{k-1}}}$$

Si $||y||_\infty = 1$, alors tous les y_k sont nuls, absurdité. Si $||y||_\infty < 1$, alors y_1 et la suite converge vers 1, absurdité car celà impliquerait $||y||_\infty = 1$

Corollaire 3.4. *Il n'existe pas d'équivalent au degré de Brouwer en dimension infinie.*

Il faut alors restreindre l'ensemble des fonctions sur lequel on va travailler si on veut espérer définir une notion de degré. C'est le travail effectué par Juliusz Schauder et Jean Leray pendant les années 30, nous consacrons les prochaines paragraphes à en faire la

synthèse. Le degré de Leray-Schauder est défini sur les *perturbations compactes de l'identité* i.e on suppose F de la forme $I - G$ avec G une application compacte

Théorème 3.1 (Leray-Schauder)

Soit X un espace de Banach et

$$A = \left\{(I - G, U, y) : U \subseteq \mathcal{B}(X) \text{ et ouvert }, G \in \mathbb{K}(\overline{U}), y \notin (I - G)(\partial U)\right\}$$

l'ensemble des *triplets admissibles* il existe une unique fonction

$$\deg : A \to \mathbb{Z}$$

satisfaisant la normalité, l'invariance par homotopie et l'additivité.

Preuve. TO DO [faire les lemmes techniques et faire la preuve en détails] □

3.1.3 2 théorèmes classiques

Théorème 3.2 (Krasnosel'ski)

Théorème 3.3 (Rabinowitz)

3.2 Le degré orienté

3.2.1 Construction

Nous allons introduire une notion d'orientation pour les fonctions de Fredholm. Cette dernière, proposée par Furi dans [1], a ensuite été mobilisée dans [2] pour obtenir des résultats de bifurcation. Nous présentons ainsi les idées de ces 2 papiers.

Définition 3.5. Si X, Y sont des espaces de Banach et $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ alors E est une *correcteur* de D si $D + E$ est un isomorphisme et si son image est de dimension finie. On pose $\mathcal{C}(D)$ l'ensemble des correcteurs de D

Avant de pouvoir définir l'orientation, il nous faut une notion de "avoir la même orientation", on fait ça en définissant une relation d'équivalence sur $\mathcal{C}(D)$

Lemme 3.6. Soient $D \in \mathcal{F}_0(X, Y)$ et $E, E' \in \mathcal{C}(D)$ l'opérateur

$$F = \mathrm{Id}_X - (D + E')^{-1}(D + E)$$

a une image de dimension finie

Preuve. Bien sûr, $(D + E)^{-1}$ et $(D + E')^{-1}$ sont des automorphismes il vient alors

$$(D + E')F = (D + E') - (D + E) = E' - E$$

donc $\operatorname{im} F = \operatorname{im}(E - E')$ □

Lemme 3.7. Soit F comme dans le lemme précédent, alors pour tous $X_0, X_1 \subseteq X$ sous vectoriels de dimension finie contenant $\operatorname{im} F$

$$\det(I - F)|_{X_0} = \det(I - F)|_{X_1}$$

avec la convention que si $X_0 = \{0\}$, $\det(I - F)|_{X_0} = 1$

Preuve. Notez que $I - F$ est un isomorphisme, que $(I - F)(X_0) \subseteq X_0$, donc $(I - F)|_{X_0} : X_0 \to X_0$ est un automorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, la notion de déterminant à donc un sens. Supposons d'abord avoir $X_0 \subseteq X_1$, on le complémnete par X_0', i.e

$$X_1 = X_0 \oplus X_0'$$

On décompose alors $(I-F)_{X_1}$ comme ceci

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Id}_{X_0'} & 0 \\ -\pi_F & (I-F)_{E_0} \end{pmatrix}$$

où π_F est la projection sur X_0 de $F_{X_0'}$, on conlut immédiatement. Maintenant, dans le cas général, notez que $X_0 \cap X_1$ contient $\operatorname{im} F$ et est de dimension finie. On applique alors le résultat obtenu deux fois

$$\det(I-F)|_{X_0} = \det(I-F)|_{X_1 \cap X_0} = \det(I-F)|_{X_1}$$

□

Définition 3.8. Dans les conditions des deux lemmes précédents, on dit que les correcteurs E et E' sont *équivalents* si $\det(I-F)|_{X_0} > 0$

Il est facile de montrer que c'est bel et bien une relation d'équivalence, voir [1] pour les détails. Il est de plus clair que cette relation d'équivalence partitionne $\mathcal{C}(D)$ en deux classes d'équivalence. Notez que si D_1 et D_2 peuvent être composés et que si E_1 et E_2 sont des correcteurs de D_1 et D_2 respectivement, alors $D_2E_1 + E_2E_1 + E_2D_1$ est un correcteur de D_2D_1 , de fait

$$D_2D_1 + D_2E_1 + E_2E_1 + E_2D_1 = (D_1+E_1)(D_2+E_2)$$

Définition 3.9. Une *orientation* de $D \in \mathcal{F}_0(X,Y)$ est une des 2 classes d'équivalence de $\mathcal{C}(D)$. Un *opérateur orienté* est une paire (D,c) où c est une des classes d'équivalence de $\mathcal{C}(D)$. Si (D,c) est orienté, un correcteur sera dit *positif* si il est dans c et négatif sinon. On pose alors $\mathcal{C}_+(D)$ l'ensemble des correcteurs positifs et $\mathcal{C}_-(D)$ les négatifs. Lorsque D est un isomorphisme, 0 est un correcteur, on définit alors *l'orientation naturelle* $\nu(D)$ de D comme étant la classe d'équivalence contenant 0. Si (D',c) est isomorphisme orienté, on pose $\operatorname{Sign} D = 1$ si $0 \in c$, et -1 sinon

Définition 3.10. Si (D,c) et (D',c') sont des opérateurs orientés, l'orientation $c \circ c'$ de $D \circ D'$ est définie telle que

$$D_2E_1 + E_2E_1 + E_2D_1 \in c \circ c'$$

où $E_1 \in c$ et $E_2 \in c'$. La composition de deux opérateurs orientés sera, sauf si mention du contraire, la précédénte.

TO DO [Propriétés de base du degré orienté, lien avec les autres notions de degré]

Théorème 3.4

Soit U un ouvert de $X \times \Lambda$, $F : U \to Y$ une famille d'index zéro et ayant une branche triviale de solutions et soit $A \in \mathcal{C}(DF(x_0,\lambda_0))$ si la fonction

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \lambda \mapsto \det((DF(0,\lambda)+A)^{-1}DF(0,\lambda))$$

change de signe en λ_0, alors c'est un point de bifurcation.

Preuve. TO DO [PREUVE complete] □

3.2.2 Un résultat global via le degré orienté

TO DO [LEMMES]

Théorème 3.5 (Furi)

Dans les conditions du théorème précédent, si F est orientable alors il existe un ensemble connexe de solutions non-triviales S tell que son adhérence dans U contienent $(0, \lambda_0)$ et est soit non-compacte, soit contient $(0, \lambda_1)$ avec $\lambda_0 \neq \lambda_1$

Preuve. TO DO [PREUVE complete] □

3.3 Approche K-théorique

3.3.1 Rappels et compléments de topologie algébrique

Rappelons très brièvement les bases de la topologie algébrique. Nous donnons également un bref exposé sur la cohomologie. Le lecteur intéressé par les détails pourra simplement consulter un cours de topologie algébrique ([SOURCE], pour n'en citer qu'un).

Définition 3.11. Si X est un espace topologique, et Δ_p le simplexe standard de $\mathbb{R}^n$, on appele *p-simplexe singulier* un élément σ de $C^0(\Delta_p, X)$. On pose $\Sigma_p(X)$ l'ensemble des simplexes singuliers

par exemple , les 1-simplexes sont les chemins, certains 2-simplexes sont des surfaces (lorsque σ est injectif),etc... Maintenant, on va faire une construction similaire (et plus simple) à ce qu'on fera en K-théorie. Etant donné un ensemble E, on veut trouver le "plus petit groupe abélien qui contient E", ou plutôt, comment étendre E et munir cette extension d'une structure de groupe abélien et ce de la façon la *plus naturelle possible*. Il y'a plusieurs façon de faire équivalentes, on peut par exemple considérer

$$\mathbb{Z}^{(E)} = \left\{ f \in \mathbb{Z}^E | \operatorname{card}(e \in E : n(e) = 0) \leq \infty \right\}$$

On peut voir ça comme une somme formelle, en effet si $\forall e \in E$ on pose

$$\delta_e \in \mathbb{Z}^{(E)} : e' \mapsto \delta_{e,e'} \tag{15}$$

Il est clair que tout élément de $\mathbb{Z}^{(E)}$ s'écrit comme une combinaison linéaire finie de δ_e. En un certain sens, 15 est la façon "la plus naturelle" de faire, voir [SOURCE] pour les détails. On pose alors

$$C_p(X) = \mathbb{Z}^{(\Sigma_p(X))}$$

Si $x_0, \cdots, x_p \in \mathbb{R}^n$, on pose

$$\sigma_{(x_0,\cdots,x_p)} : \Delta_p \to \mathbb{R}^n : (\lambda_1, \cdots, \lambda_p) \mapsto x_0 + \sum_{i=1}^{p} \lambda_i (x_i - x_0)$$

Et on défini alors l'opérateur de bord, si $p \geq 1$

$$\partial_p^X : C_p(X) \to C_{p-1}(X) : \sigma \mapsto \sum_{j=0}^{p} (-1)^j \sigma \circ \sigma_{(e_0, \cdots, \hat{e_j}, \cdots e_p)}$$

En pose $\partial_p = 0$ si $p \leq 0$. On peut montrer que $\partial_{p+1}^X \circ \partial_p^X = 0$ et on définie le *complexe singulier* comme la donnée des bords et des esembles $C_p(X)$, on le résume avec le diagramme suivant

$$\cdots \xrightarrow{\partial_{p+1}^X} C_p(X) \xrightarrow{\partial_p^X} C_{p-1}(X) \xrightarrow{\partial_{p-1}^X} \cdots$$

On définit enfin les *groupes d'homologie* comme suit :

$$H_p(X) = \ker \partial_p^X / \operatorname{im} \partial_{p+1}^X, p \geq 0$$

Maintenant, la cohomologie ! On choisit un groupe abélien A, et considère les groupes duaux des $C_p(X)$ (par rapport à A) comme étant l'ensemble des homomorphismes de groupe ablien entre $C_p(X)$ et A, i.e $C_p(X, A)^* = \operatorname{Hom}(C_i, A)$ et on remplace alors l'opérateur bord par son dual

$$\partial_p^* : C_p(X, A)^* \to C_{p+1}(X, A)^* | \varphi \mapsto \varphi \circ \partial_{p+1}$$

On alors le complexe suivant

$$\cdots \xleftarrow{\partial_{p+1}^*} C_p(X, A)^* \xleftarrow{\partial_p^*} C_{p-1}(X, A)^* \xleftarrow{\partial_{p-1}^*} \cdots$$

et on définit enfin

$$H^p(X, A) = \ker \partial_{p+1}^* / \operatorname{im} \partial_p^*, p \geq 0$$

3.3.2 Fibrés et fibrés vectoriels

L'idée derrière la notion d'espace fibré est d'avoir une généralisation des espaces qui "ressemblent localement" à des espaces produits.

Définition 3.12. Un *fibré* est la donnée d'un 4-uple (E, B, π, F) où

- E est un espace topologique appelé *l'espace total*
- B est un espace topologique appelé *l'espace de base*, souvent supposé connexe (sinon, on étudie juste chaque composante connexe séparement)
- F est un espace topologique, appelé *modèle des fibres*

Qui respecte la *condition de trivialisation locale* suivante : Il exist un recouvrement d'ouverts $(U_i)_{i \in \mathcal{I}}$ de B et des $(\varphi_i)_{i \in \mathcal{I}}$ tels que

$$\forall i \in \mathcal{I}, \varphi_i \in \operatorname{HomTop}(\pi^{-1}(U_i), U_i \times F)$$

et le diagramme suivant commute :

$$\begin{tikzcd}
\pi^{-1}(U) \arrow[r] \arrow[d, "\pi"'] & U \times F \arrow[dl, "\pi_1"] \\
U &
\end{tikzcd}$$

la famille de paire $(U_i, \varphi_i)_{i \in \mathcal{I}}$ est appelé la trivialisation du fibré. Lorsque $E = B \times F$ et $\pi = \pi_1$, le fibré est qualifié de *trivial*

Remarque 3.13. Si Λ est un complexe cellulaire contractile (voir [SECTION]), et si E est un fibré ayant pour base un tel complexe cellulaire, alors E est trivial

Ainsi, alors qu'un fibré en général est "localement un produit cartésien", un fibiré trivial est globalement un produit. Ci-dessous, un exemple de fibré non trivial

Exemple 3.14. Un des plus viel exemple de l'occurence de tel structures est la *fibration de Hopf*. Ici, le modèle des fibres est le cerlce S^1, l'espace total la 3-sphère S^3 et l'espace de base la sphère S^2 et le π est donné par l'*application de Hopf*, qu'on décrit ci dessous à titre indicatif (en identiant $\mathbb{R}^4$ et $\mathbb{C}^2$ et $\mathbb{R}^3$ avec $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$)

$$p : S^3 \to S^2, (x + iy, z + iw) \mapsto (2(x + iy)(z - iw), ||x + iy||^2 - ||z + iw||^2)$$

Remarque 3.15. Ici, on a supposé que le modèle de la fibre, l'espace F était le même partout. L'étude de fibrés à "modèle variable" peut être aussi intéressante en soi, nous n'iront pas aussi loin dans ce travail.

Définition 3.16. Un *fibré* vectoriel est un fibré où suppose F être un espace vectoriel. Bien sûr, on demande aussi à ce que les $\varphi_i^{-1}(\cdot, v)$ soient linéaire.

Remarque 3.17. On peut se demander ce qu'il se passe lorsqu'on veut une autre structure algébrique que celle de l'espace vectoriel. Cela conduit naturellement à la notion de G-fibré, ou on prend G comme étant (par exemple) un groupe de Lie. Ainsi, les fibrés vectoriels sont un cas particulier des G-fibrés, qui sont un cas particulier des fibrés. Vous aurez sans doute remarqué que la fibration de hopf est un S^1-fibré ! Il existe des fibrés encore plus "méchants", voir par exemple la Fibration de Lefschetz.

Exemple 3.18. L'espace tanget d'une variété M , TM l'exemple canonique d'un fibré vectoriel. L'espace total est l'ensemble des unions disjointes, les fibres sont modellées sur $\mathbb{R}^k$ où k est la dimension de M. On munit TM de la topologie initiale relative aux projections sur M

Définition 3.19. Soient $A = (E', B', \pi', F')$ et $B = (E, B, \pi, F)$ des fibrés, un *morphisme de fibrés* entre entre F et F' est la donnée d'une paire de fontion $(f, g) \in \mathrm{IsoTop}(B, B') \times \mathrm{IsoTop}(E, E')$ telles que le diagramme suivant commute :

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "g"] \arrow[d, "\pi"'] & E' \arrow[d, "\pi'"] \\ B \arrow[r, "f"'] & B \end{tikzcd}$$

Quelques façons de construire des fibrés à partir d'autres

Définition 3.20. Soit $A = (E, B, \pi, F)$ un fibré, B' un espace topologique et $f : B' \to B$ une application continue, on défini le fibré "pullback" comme

$$(A', B', \pi', F) \text{ avec } A' = \{(b, a) \in B' \times E : f(e) = \pi(e)\} \text{ et } \pi' = \pi_1$$

on a le diagramme commutatif ci-dessous

$$\begin{tikzcd} A' \arrow[r, "\pi_2"] \arrow[d, "\pi_1"'] & A \arrow[d, "\pi"] \\ B' \arrow[r, "f"'] & B \end{tikzcd}$$

Le produit cartésien de deux fibrés se définit simplement en prenant les produits cartésiens des objets qui les composent. Et enfin, si $V_1 = (E, B, \pi, F_1)$ et $V_2 = (E', B, \pi', F_1)$ sont des fibrés vectoriels de même base , et $d : B \to B^2$ telle que $d(b) = (b, b)$ alors on définit la *somme de Whitney* comme

$$V_1 \oplus V_2 = d^*(V_1 \times V_2)$$

Si on se fixe un espace topologique X, on pose $\mathfrak{F}(X)$ la catégorie des fibirés vectoriels réels de dimension finie. Les morphismes sont les morphismes de fibrés

Définition 3.21. Une catégorie $\mathfrak{C}$ est *pré-additive* si tout ensemble de morphismes $\mathrm{Hom}(A, B)$ admet une structure de groupe abélien

Définition 3.22. Une catégorie additive

3.3.3 Introduction à la K-théorie

TO DO [Ajouter texte d'intro/motivation]

Définition 3.23. Soit $(H, +)$ un monoide commutatif, on lui associe une paire $(S(H), s)$ où $S(H)$ est un groupe abélien, $s : H \to S(H)$ un homomorphisme de groupe abélien qui répond au problème universel suivant :

$$\begin{tikzcd} H \arrow[rr, "s"] \arrow[dr, "f"'] & & S(H) \arrow[dl, dashed, "\overline{f}"] \\ & G & \end{tikzcd}$$

3.3.4 application à la détection globale d'une bifurcation

Théorème 3.6

Soit Λ un CW-complexe fini connexe, $f : \Lambda \times O \to Y$ une famille C^1 d'applications de Fredholm d'indice 0 et soit L la linéarisation de f le long de la branche triviale. Supposons que, pour δ suffisamment petit, les seules solutions de l'équation $f(\lambda, x) = 0$ avec $\|x\| \leq \delta$ soient celles de la forme $(\lambda, 0)$. Si, pour un certain (et donc pour tout) $\nu \in \Lambda$, la multiplicité $k = |\mathrm{mult}(f_\nu, 0)| \neq 0$, alors

(a) la première classe de Stiefel-Whitney $w_1(\mathrm{Ind}\, L) = 0$,

(b) pour un certain $i \in \mathbb{N}$, $k^i J(\mathrm{Ind}\, L) = 0$ dans $J(\Lambda)$.

En particulier, nous avons :

Corollaire 3.24. *Supposons que pour un certain $\nu \in \Lambda$, $k = |\mathrm{mult}(f_\nu, 0)|$ soit défini. Si $k \neq 0$, alors une bifurcation apparaît dès que soit le fibré d'indice $\mathrm{Ind}\, L$ est non orientable, soit $J(\mathrm{Ind}\, L) \neq 0$ et $k = |\mathrm{mult}(f_\nu, 0)|$ est premier avec l'ordre de $J(\Lambda)$.*

4 Introduction aux bifurcations équivariantes et symétries

5 Bifurcation de systèmes dynamiques

Références utilisées

[1] Pierluigi Benevieri et Massimo Furi. « A simple notion of orientability for Fredholm maps of index zero between Banach manifolds and degree theory ». In : *Annales des Sciences Mathématiques du Québec* 22.2 (1998), p. 131-148.

[2] Pierluigi Benevieri et Massimo Furi. « Bifurcation Results for Families of Fredholm Maps of Index Zero Between Banach Spaces ». In : *Nonlinear Analysis Forum* 6.1 (2001), p. 35-47.

[3] Rodney Coleman. *Calculus on Normed Vector Spaces*. Springer Undergraduate Mathematics Series. New York, NY : Springer, 2012.

[4] Klaus Deimling. *Nonlinear Functional Analysis*. Springer Books. Springer, 1985.

[5] Jean A. Dieudonné. *Foundations of Modern Analysis, Volume 8*. 1st. Pure and Applied Mathematics. New York : Academic Press, 1969.

[6] Michal Fečkan. *Topological Degree Approach to Bifurcation Problems*. T. 5. Topological Fixed Point Theory and Its Applications. Dordrecht, The Netherlands : Springer, 2008, p. ix + 261.

[7] A. Friedman. *Partial Differential Equations*. Dover Publications, 1969.

[9] Martin Golubitsky et David G. Schaeffer. *Singularities and Groups in Bifurcation Theory, Volume I*. 1st. T. 51. Applied Mathematical Sciences. New York : Springer-Verlag, 1985.

[10] Ioan Mărcuț. *Notes on Fredholm (and Compact) Operators*. Lecture notes for the course "Analysis on Manifolds". Oct. 2009.

[11] B. Marx. « Some Bifurcation Results Including Banach Space Valued Parameters ». In : *Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen* 13.3 (1994), p. 493-512.

[12] James Montaldi. *Singularities, Bifurcations and Catastrophes*. 1st. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2021.

[15] C. T. C. Wall. « Finite Determinacy of Smooth Map-Germs ». In : *Bulletin of the London Mathematical Society* 13 (1981), p. 481-539.

Pour aller plus loin

[8] Helge Glöckner. « Implicit Functions from Topological Vector Spaces to Banach Spaces ». In : *Israel Journal of Mathematics* 155 (2006), p. 205-252.

[14] J. T. Schwartz. « On Nash's Implicit Functional Theorem ». In : *Communications on Pure and Applied Mathematics* 13.4 (1960), p. 509-530.