

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO  
LABORATORIJ ZA MATEMATIČNE METODE  
V RAČUNALNIŠTVU IN INFORMATIKI

Aljaž Zalar

**REŠENE NALOGE IZ  
DISKRETNIH STRUKTUR**

Študijsko gradivo

Ljubljana, 2022



## Uvod

Naloge na naslednjih straneh so se pojavljale na teoretičnih izpitih pri predmetu Diskretne strukture za študente visokošolskega študija računalništva in informatike na FRI v študijskih letih 2019/20–2021/22.

Naloge so urejene po poglavjih, ki se obravnavajo pri predmetu, tako da jih lahko poskušate rešiti že sproti, ko obdelate posamezno poglavje.

To študijsko gradivo ni recenzirano in gotovo se v rešitvah pojavi kakšna napaka. Če opazite kakšno napako, jo prosim sporočite na elektronski naslov [aljaz.zalar@fri.uni-lj.si](mailto:aljaz.zalar@fri.uni-lj.si).

Za lažjo navigacijo po dokumentu so na voljo bližnjice. Če kliknete na simbol ↘ ob nalogi, boste skočili do rešitve. Če kliknete na simbol ↗ ob rešitvi, se boste vrnili k besedilu naloge.

Naloge računsko niso zahtevne, pomembno je predvsem razumevanje ideje v ozadju. Zato priporočam, da o nalogi nekaj časa razmišljate, pobrsate po zapiskih oz. literaturi, v kolikor ideje ne dobite, potem pa tudi v celoti napišete rešitev. Šele nato svojo rešitev primerjate z rešitvami v zbirki. Poleg razumevanja bistva nalog je namreč cilj predmeta tudi to, da se naučite svoje ideje pravilno matematično zapisati, pri čemer se osredotočite predvsem na bistven sklep in ne navajate več možnih sklepov, ki bi lahko vodili k pravi rešitvi.



## Kazalo

Uvod	3
<b>Del 1. Naloge</b>	7
Poglavje 1. Izjavni račun	9
Poglavje 2. Predikatni račun	13
Poglavje 3. Množice	17
Poglavje 4. Relacije in preslikave	19
Poglavje 5. Teorija grafov	21
Poglavje 6. Linearne diofantske enačbe in permutacije	25
<b>Del 2. Rešitve</b>	29
Izjavni račun	30
Predikatni račun	33
Množice	35
Relacije in preslikave	37
Teorija grafov	39
Linearne diofantske enačbe in permutacije	41



**Del 1**

**Naloge**





## POGLAVJE 1

### Izjavni račun

NALOGA 1.



Naj bodo  $p, q, r$  izjavne spremenljivke. V vsakega od spodnjih okvirčkov  $\square$  vpišite:

- a. Eno od izjavnih spremenljivk  $p, q, r$  ali njenih negacij, da dobite enega od osnovnih pravih sklepov.

$$p, p \Rightarrow \square \models q, \quad p \vee q, \square \models p.$$

- b. Enega od izjavnih veznikov  $\wedge, \vee, \underline{\vee}, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ , da dobite pravi sklep.

$$p \Rightarrow q, \neg q, \neg p \square r \models \neg r$$

- c. Enega od izjavnih veznikov  $\wedge, \vee, \underline{\vee}, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ , da dobite **nepravi** sklep.

$$p \Rightarrow q, \neg q, \neg p \square r \models \neg r$$

**Pojasnite**, zakaj je dopolnjen sklep nepravilen.

NALOGA 2.



Naj bosta  $p$  in  $r$  izjavni spremenljivki. Odgovorite na naslednja vprašanja. Vse odgovore dobro utemeljite.

- Ali je izjavni izraz  $p \Rightarrow r$  tautologija?
- Ali je izjavni izraz  $(p \Rightarrow r) \Rightarrow p$  tautologija?
- Ali je izjavni izraz  $((p \Rightarrow r) \Rightarrow p) \Rightarrow p$  tautologija?
- Samo z uporabo izjavnega izraza  $((p \Rightarrow r) \Rightarrow p) \Rightarrow p$ , veznika  $\Rightarrow$  in konstante 0 zapišite izjavni izraz, ki je protislovje.

NALOGA 3.



- Navedite nabor izjavnih veznikov z vsaj 2 veznikoma, ki ni poln. Odgovor utemeljite.
- Utemeljite, da je nabor izjavnih veznikov  $\{\neg, \wedge, \vee\}$  poln.  
(Namig: pomagajte si lahko z obstojem konjunktivne ali disjunktivne normalne oblike.)
- Naj bosta  $I$  in  $J$  izjavna izraza. Pri sklepu s protislovjem pravilnost sklepa  $I \models J$  preverimo s pravilnostjo sklepa  $I, \neg J \models 0$ . Razložite, zakaj to lahko naredimo.

NALOGA 4.



- a. Razvrstite izjavne veznike  $\wedge, \vee, \Leftrightarrow$  glede na število 1 v resničnostni tabeli. Začnite s tistim, ki ima največ 1.
- b. Naj bodo  $A, B, C$  izjavni izrazi. Obkrožite črke pred tistimi pari izjavnih izrazov, ki niso enakovredni za vse trojice  $A, B, C$ .
- (i)  $(A \wedge \neg B) \vee A, \neg B$       (ii)  $\neg(\neg A \wedge B), A \vee \neg B$       (iii)  $(A \vee B) \wedge C, (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$
- c. Naj bo  $\{\triangle, \bigcirc, \otimes\}$  nek poln nabor izjavnih veznikov,  $\{\bigcirc, \sqcup, *\}$  pa nabor, ki ni poln. Pod vsakega od naslednjih nabor napiši  $P$ , če je poln,  $N$ , če ni poln, in  $?$ , če iz podatkov ni moč določiti, ali je poln.
- $\{\triangle, \bigcirc\}, \quad \{\bigcirc, \sqcup\}, \quad \{\bigcirc, \sqcup, *, \otimes\}, \quad \{\bigcirc, \sqcup, \otimes, \triangle\}.$

NALOGA 5.



- a. Kdaj pravimo, da sta dva izjavna izraza enakovredna?
- b. Napišite disjunktivno normalno obliko izraza  $I(p, q)$ , ki ima naslednjo resničnostno tabelo:

$p$	$q$	$I(p, q)$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	0

- c. Napišite pravilo sklepanja modus ponens in dokažite, da velja.

NALOGA 6.



- a. Navedite oba de Morganova zakona iz izjavnega računa.
- b. Konjunktivna normalna oblika izjavnega izraza  $I(p, q, r)$  je naslednja:

$$(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r).$$

Izpolnite manjkajoč stolpec v resničnostni tabeli izraza  $I(p, q, r)$ :

$p$	$q$	$r$	$I(p, q, r)$
1	1	1	
1	1	0	
1	0	1	
1	0	0	
0	1	1	
0	1	0	
0	0	1	
0	0	0	

- c. Napišite pravilo sklepanja modus tollens in dokažite, da velja.

## NALOGA 7.



- a. Naj bosta  $A, B$  izjavna izraza. Pravilo sklepanja Modus ponens s simboli zapišemo kot

$$A \Rightarrow B, A \models B.$$

Z besedami na kratko razložite pomen tega zapisa.

(Opomba: Iz  $A \Rightarrow B$  in  $A$  sledi  $B$  ni zadostna utemeljitev.)

- b. Predpis za negacijo  $\neg$  lahko podamo s preslikavo  $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ ,  $f(p) = 1 - p$ . Kateri dvomestni izjavni veznik predstavlja preslikava  $g : \{0, 1\} \times \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ ,  $g(p, q) = pq$ ?
- c. Naj bosta  $f, g$  kot v (b). Kateri dvomestni izjavni izraz, zapisan z veznikoma  $\neg, \vee$ , predstavlja preslikava  $f \circ g$ ?

## NALOGA 8.



- a. Naj bosta  $A, B$  izjavna izraza. Pravilo sklepanja Modus tollens s simboli zapišemo kot

$$A \Rightarrow B, \neg B \models \neg A.$$

Z besedami na kratko razložite pomen tega zapisa.

(Opomba: Iz  $A \Rightarrow B$  in  $\neg B$  sledi  $\neg A$  ni zadostna utemeljitev.)

- b. Predpis za negacijo  $\neg$  lahko podamo s preslikavo  $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ ,  $f(p) = 1 - p$ . Kateri dvomestni izjavni veznik predstavlja preslikava  $g : \{0, 1\} \times \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ ,  $g(p, q) = |p - q|$ ?
- c. Naj bosta  $f, g$  kot v (b). Kateri dvomestni izjavni veznik predstavlja preslikava  $f \circ g$ ?

## NALOGA 9.



- a. Za vsakega od izjavnih izrazov  $p \Leftrightarrow p$  in  $p \Leftrightarrow p \Leftrightarrow p$  navedite, ali je tautologija. Odgovora utemeljite.
- b. Naj bosta  $p$  in  $r$  izjavni spremenljivki. Ali obstaja izjavni izraz  $I(p)$ , tako da je izjavni izraz

$$I(p) \vee r$$

tautologija? Če je odgovor da, navedite primer takega izjavnega izraza, sicer pa utemeljite, zakaj je odgovor ne.

## NALOGA 10.



- a. Ali je izjavni izraz  $p \Rightarrow p \vee p$  tautologija? Odgovor utemeljite.

- b. Naj bosta  $p$  in  $r$  izjavni spremenljivki. Ali obstaja izjavni izraz  $I(p)$ , tako da je izjavni izraz

$$I(p) \Rightarrow r$$

tavtologija? Če je odgovor da, navedite primer takega izjavnega izraza, sicer pa utemeljite, zakaj je odgovor ne.

## POGLAVJE 2

### Predikatni račun

NALOGA 11.



Dana je izjavna formula

$$(1) \quad (\forall x : \neg P(x)) \Rightarrow (\neg \exists x : P(x)).$$

- Izberite si področje pogovora  $\mathcal{D}$  in pomen predikata  $P(x)$ . Napišite interpretacijo izjavne formule (1) pri tej izbiri  $\mathcal{D}$  in  $P(x)$ .
- Izjavno formulo (1) preoblikujte v preneksno normalno obliko.
- Ali je izjavna formula (1) splošno veljavna? Če je odgovor da, to utemeljite, sicer pa poiščite protiprimer.

NALOGA 12.



- Navedite induktivno definicijo izjavne formule. (Definicije atoma vam ni potrebno razlagati.)
- Dane so tri izjavne formule

$$\forall x \exists y : (P(y, x) \vee Q(x)),$$

$$\forall x \exists y : (P(y, x) \vee R(z)),$$

$$\neg \forall x \exists y : P(y, x) \vee R(z).$$

V spodnji interpretaciji s področjem pogovora  $D$  z besedami zapišite pomen vsake od njih!

področje pogovora  $D$  : množica nalog na prvem izpitu iz DS.

$R(x)$  :  $x$  je naloga iz poglavja permutacij.

$Q(x)$  :  $x$  je najzahtevnejša naloga.

$P(x, y)$  :  $x$  je zahtevnejša naloga od naloge  $y$ .

$z$  : naloga 6 na prvem izpitu iz DS.

- Tisto izjavno formulo iz prejšnje točke, ki ni v preneksni normalni formi, preoblikujte vanjo.

NALOGA 13.



- Navedite oba distributivnostna zakona iz predikatnega računa.
- Prepišite naslednjo izjavno formulo in dodajte oklepaje tako, da nakažete po kakšen vrstnem redu se računa njeno vrednost:

$$\forall x \exists y : P(x, y) \vee R(y) \wedge \neg Q(z) \vee \exists y \forall w : (T(w) \vee Z(x, y, w))$$

c. Naj bo dano področje pogovora

$\mathcal{D}$  : predmeti v prvem letniku visokošolskega študija računalništva in informatike na FRI  
in predikata

$$P(x) : x \text{ se izvaja v zimskem semestru,}$$

$$Q(x, y) : x \text{ in } y \text{ se izvajata v istem semestru.}$$

Napišite izjavno formulo  $W$  v preneksni obliki, ki zadošča naslednjim pogojem:

- Vsebuje spremenljivki  $x$  in  $y$ , ki sta vezani.
- Vsebuje konstanto  $z$ .
- Vsebuje predikata  $P(x)$  in  $Q(x, y)$ .
- Ni resnična, če za konstanto  $z$  izberemo predmet *Diskretne strukture*.
- Je resnična, če za konstanto  $z$  izberemo predmet *Osnove verjetnosti in statistike*.

NALOGA 14.



a. Prepišite izjavno formulo

$$\forall x Q(x) \wedge \neg R(y) \Rightarrow P(x, y)$$

in dodajte oklepaje, ki nakazujejo prednostni red računanja.

b. Naj bo  $\mathcal{D} = \{\text{rdeča, modra, oranžna}\}$  področje pogovora in  $P, Q : \mathcal{D} \rightarrow \{0, 1\}$  predikata, podana z naslednjo tabelo:

$x$	$P(x)$	$Q(x)$
rdeča	1	1
modra	0	0
oranžna	0	1

Ali je formula

$$\exists x \forall y : (P(x) \vee Q(y))$$

v zgornji interpretaciji resnična? Odgovor utemeljite.

NALOGA 15.



a. Prepišite izjavno formulo

$$\exists x P(x, y) \Rightarrow \neg Q(x) \wedge R(y)$$

in dodajte oklepaje, ki nakazujejo prednostni red računanja.

- b. Naj bo  $\mathcal{D} = \{\text{rdeča, modra, oranžna}\}$  področje pogovora in  $P, Q : \mathcal{D} \rightarrow \{0, 1\}$  predikata, podana z naslednjo tabelo:

$x$	$P(x)$	$Q(x)$
rdeča	1	1
modra	1	0
oranžna	0	0

Ali je formula

$$\forall x \exists y : (P(x) \wedge Q(y))$$

v zgornji interpretaciji resnična? Odgovor utemeljite.

NALOGA 16.



Napišite preneksne normalne oblike naslednjih izjavnih formul:

- $\neg \forall x \exists y : (P(x) \wedge Q(y)).$
- $\forall x \neg \forall y : (\neg P(x) \vee Q(y)).$
- $\exists x \neg \forall y : (P(x) \Rightarrow Q(y)).$





## POGLAVJE 3

### Množice

NALOGA 17.



Naj bodo  $A, B, C$  množice.

- Navedite enega od zakonov distributivnosti iz teorije množic.
- Zakona absorpcije sta  $A \cap (A \cup B) = A$  in  $A \cup (A \cap B) = A$ . Dokazite veljavnost enega od njiju.
- Z uporabo zakonov distributivnosti in absorpcije preverite naslednjo enakost množic:

$$(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A.$$

NALOGA 18.



Naj bo  $U$  univerzalna množica,  $A, B, C$  pa njene podmnožice. V jeziku predikatnega računa vsebovanost  $A \subseteq B$  izrazimo z izjavno formulo

$$\forall x \in U : (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

V jeziku predikatnega računa izrazite še naslednje trditve, pri čemer lahko poleg izjavnih veznikov in kvantifikatorjev uporabljate še  $\in$  (ne pa tudi  $=$ ,  $\subseteq$ ,  $\subset$ ,  $\supseteq$ ,  $\supset$ ).

- $A = B$ .
- $A \cap B = \emptyset$ .
- Če sta množici  $A$  in  $B$  disjunktni, potem množici  $B$  in  $C$  nista disjunktni.

NALOGA 19.



- Navedite de Morganov zakon iz teorije množic.
- Definirajte potenčno množico  $\mathcal{P}A$  množice  $A$ .
- Za vsako od naslednjih množic ugotovite, ali je potenčna množica neke množice. Če je odgovor da, navedite to množico, sicer pa utemeljite, zakaj je odgovor ne.
  - $\{\emptyset, 1, 2, \{1, 2\}\}$ .
  - $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ .
  - $\{\emptyset, \{1\}, \{\{2, 7\}\}, \{1, \{2, 7\}\}\}$ .

NALOGA 20.



- Ena izmed lastnosti kartezičnega produkta množic  $A, B, C, D$  je

$$(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D).$$

Ali lahko od tod sklepamo tudi  $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times D) \cap (B \times C)$ ? Če je odgovor da, to utemeljite, sicer pa poiščite protiprimer.

- b. Napišite primer množice  $A$ , katere potenčna množica ima 64 elementov.
- c. Naj bo  $M$  množica refleksivnih relacij na vaši množici  $A$  iz (b). Koliko je  $|M|$ ?

NALOGA 21.



- a. Ena izmed lastnosti kartezičnega produkta množic  $A, B, C, D$  je
$$(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D).$$
Ali lahko od tod sklepamo tudi  $(A \cap B) \times (C \cap D) = (B \times C) \cap (A \times D)$ ? Če je odgovor da, to utemeljite, sicer pa poiščite protiprimer.
- b. Napišite primer množice  $A$ , katere potenčna množica ima 32 elementov.
- c. Naj bo  $M$  množica simetričnih relacij na vaši množici  $A$  iz (b). Koliko je  $|M|$ ?

NALOGA 22.



- a. Določite množico  $A$  tako, da bo imela množica  $\mathbb{N} \times A$  končno mnogo elementov. Napišite še, kaj je množica  $\mathbb{N} \times A$ .
- b. Naj bo  $B$  množica dvomestnih izjavnih veznikov. Napišite tri elemente iz množice  $\mathcal{P}(\mathbb{N} \times B)$ .
- c. Naj bo  $C$  množica tromestnih izjavnih veznikov in  $f : \mathbb{N} \rightarrow C$  preslikava. Ali je  $f$  lahko injektivna? Če je odgovor da, napišite primer, sicer pa utemeljite, zakaj je odgovor ne.

NALOGA 23.



- a. Določite množico  $A$  tako, da bo imela množica  $\{1, 2, 3\} \times A$  neskončno mnogo elementov.
- b. Naj bo  $B$  množica dvomestnih izjavnih veznikov. Napišite tri elemente iz množice  $\mathcal{P}(B \times \mathbb{N})$ .
- c. Naj bo  $C$  množica tromestnih izjavnih veznikov in  $f : C \rightarrow \mathbb{N}$  preslikava. Ali je  $f$  lahko surjektivna? Če je odgovor da, napišite primer, sicer pa utemeljite, zakaj je odgovor ne.

## POGLAVJE 4

### Relacije in preslikave

NALOGA 24.



Naj bo  $f : \mathbb{N} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$  **surjektivna** preslikava,  $A, B \subseteq \mathbb{N}$  množici in  $g : A \rightarrow B$  taka preslikava, da je kompozitum  $g \circ f : \mathbb{N} \rightarrow B$  dobro definirana preslikava. Odgovorite na naslednja vprašanja.

- Napišite primer preslikave  $f$  z zgornjimi lastnostmi.
- Kaj lahko iz dobre definiranosti  $g \circ f$  sklepamo o množici  $A$ ?
- Ali obstaja taka množica  $A$  in preslikava  $g : A \rightarrow \mathbb{N}$ , da je  $g \circ f$  surjektivna? Odgovor utemeljite.
- Izberite taki množici  $A, B$  in preslikavo  $g : A \rightarrow B$ , da bo  $g \circ f$  surjektivna.

NALOGA 25.



Naj bo  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  množica.

- Napišite primer relacije  $R \subseteq A \times A$  z natanko tremi elementi.
- Najmanj koliko elementov ima refleksivna relacija  $R \subseteq A \times A$ ? Odgovor utemeljite.
- Največ koliko elementov ima lahko relacija  $R \subseteq A \times A$ ? Odgovor utemeljite.
- Koliko različnih dvomestnih relacij na množici  $A$  obstaja? Odgovor utemeljite.

NALOGA 26.



Naj bosta  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  in  $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6\}$  množici.

- Napišite injektivno preslikavo  $f : A \rightarrow B$ .
- Koliko preslikav iz množice  $A$  v  $B$  obstaja?
- Koliko injektivnih preslikav iz množice  $A$  v  $B$  obstaja?
- Naj bo  $g : A \rightarrow B$  preslikava, definirana z  $g(1) = g(2) = b_1$ ,  $g(3) = b_2$ ,  $g(4) = b_6$ . Poiščite neko preslikavo  $h : B \rightarrow B$ , da velja  $g = h \circ f$ , kjer je  $f$  vaša preslikava iz (a).

NALOGA 27.



Naj bo  $A$  množica vseh obveznih predmetov na prvi stopnji Visokošolskega strokovnega študija FRI,  $B$  pa množica vseh obveznih predmetov na prvi stopnji Univerzitetnega študija FRI. Velja  $A \cap B = \emptyset$ . Naj bo  $R$  relacija na množici  $A$ , definirana s predpisom

$xRy$  natanko tedaj, ko se  $x$  in  $y$  izvajata v istem letniku študija.

Na isti način definiramo relacijo  $S$  na množici  $B$ .

- Navedite definicijo ekvivalenčne relacije. Ali je  $R$  ekvivalenčna?

- b. Kaj so ekvivalenčni razredi za  $S$ ?
- c. Če  $A$  in  $B$  vložimo v  $A \cup B$ , potem  $R$  in  $S$  postaneta relaciji na  $A \cup B$ . Določite  $R * S$  in  $R^{-2020}$  na množici  $A \cup B$ .

NALOGA 28.



- a. Kdaj je relacija  $f \subseteq A \times A$  preslikava na množici  $A$ ?
- b. Poiščite množico  $A$  in preslikavo  $f : A \rightarrow A$ , ki je injektivna, a ni surjektivna.
- c. Napišite in dokažite natančen pogoj za injektivnost kompozituma  $f \circ f$ , kjer je  $f : A \rightarrow A$  preslikava.

NALOGA 29.



- a. Kaj je dvomestna relacija  $R$  v množici  $A$ ?
- b. Naj bosta  $R$  in  $S$  dvomestni relaciji v množici  $A$ . Kaj je produkt relacij  $R * S$ ?
- c. Naj bo  $A = \{x, y, z, u, v\}$  in  $R = \{(x, y), (y, z), (z, u), (u, v)\}$ . Določite tranzitivno ovojnico relacije  $R$ .

NALOGA 30.



Na množici študentov, ki so se udeležili izpita iz Diskretnih struktur, definiramo relaciji  $R$  in  $S$ :

$$\begin{aligned} xRy &\Leftrightarrow x \text{ in } y \text{ sta dobila enako oceno,} \\ xSy &\Leftrightarrow \text{Rezultat } x \text{ in } y \text{ se razlikuje za največ 1 točko.} \end{aligned}$$

- a. Določite ekvivalenčne razrede tiste izmed relacij  $R$  in  $S$ , ki je ekvivalenčna.  
Opomba. Ni vam potrebno utemeljevati, da je relacija res ekvivalenčna.
- b. Utemeljite, zakaj druga izmed relacij  $R$  in  $S$  ni ekvivalenčna.
- c. Študent  $x$  je dosegel na izpitu 94, študent  $z$  pa 96 točk. Ali lahko z gotovostjo trdimo, da sta študenta  $x$  in  $z$  v relaciji  $S^2$ ? Odgovor utemeljite.

NALOGA 31.



Dana je množica  $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ . Preslikava  $f : C \rightarrow C$  zadošča pogojem  $f(1) = 2$ ,  $f(4) = 5$  in  $f \circ f = \text{id}_C$ . Določite  $f(2)$ ,  $f(3)$ ,  $f(5)$ .

## POGLAVJE 5

### Teorija grafov

NALOGA 32.



O enostavnem grafu  $G$  (nima večkratnih povezav med dvema vozliščema in nima zank) imamo naslednje informacije:

- $G$  vsebuje Hamiltonov cikel, ki je lihe dolžine.
- Največja stopnja vozlišča v grafu je 5.
- $G$  ni poln graf.

Za vsako od naslednjih trditev napišite, ali je pravilna ali ne. Vsak odgovor utemeljite.

- Graf  $G$  ni dvodelen.
- Graf  $G$  je Eulerjev.
- Za kromatično število  $\chi(G)$  velja  $3 \leq \chi(G) \leq 5$ .
- Graf  $G$  ima natanko 7 vozlišč.

NALOGA 33.



- Narišite primer dvodelnega grafa, ki je Eulerjev.
- Pojasnite, zakaj dvodelni graf na 12 točkah s 5 belimi in 7 črnimi točkami, ni Hamiltonov.
- Koliko različnih Hamiltonovih ciklov ima poln graf na 5 točkah? Pri tem cikla štejemo za različna, če se razlikujeta vsaj v eni uporabljeni povezavi.

NALOGA 34.



V tej nalogi so vsi grafi enostavni, tj. nimajo večkratnih povezav med dvema vozliščema in nimajo zank.

- Narišite dva neizomorfna grafa, ki imata stopnje vozlišč 2, 2, 2, 1, 1.
- Naj bo  $2k_1, 2k_2, \dots, 2k_m$ ,  $k_i \in \mathbb{N}$ , zaporedje sodih števil, ki je grafično. Ali je vsak graf, ki pripada temu zaporedju, Eulerjev? Če je odgovor da, to utemeljite, sicer pa napišite protiprimer (tj. izberete  $m$  in  $k_1, \dots, k_m$  ter narišete pripadajoč graf, ki ni Eulerjev).
- Naj bo  $n_1, n_2, \dots, n_m$ ,  $n_i \in \mathbb{N}$ , zaporedje naravnih števil, ki je grafično. Denimo, da je nek graf, ki pripada temu zaporedju, dvodelen. Ali je tudi vsak drug graf, ki pripada temu zaporedju, dvodelen? Če je odgovor da, to utemeljite, sicer pa napišite protiprimer (tj. izberete  $m$  in  $n_1, \dots, n_m$  ter narišete dva grafa s temi parametri, pri čemer je en dvodelen, drugi pa ne).

## NALOGA 35.



- a. Naj bo  $G$  graf z  $n$  točkami in  $m$  povezavami. Napišite zvezo med stopnjami točk in številom povezav, ki jo podaja lema o rokovanju.
- b. Kaj pomeni, da je končno zaporedje naravnih števil grafično?
- c. Obkrožite črke pred tistimi zaporedji, ki so grafična:
 

(i) 5, 2, 1, 0	(ii) 3, 3, 2, 1	(iii) 3, 3, 3, 3	(iv) 3, 3, 1, 1.
----------------	-----------------	------------------	------------------
- d. Naj bo dano neko *padajoče* grafično zaporedje naravnih števil  $n_1, n_2, n_3, \dots, n_k$ , kjer je  $k \in \mathbb{N}$ , in  $G$  eden izmed pripadajočih grafov.
  - (a) Kaj mora veljati za števila  $n_i$ , da bo  $G$  Eulerjev?
  - (b) Največ koliko je kromatično število  $\chi(G)$ ? Odgovor utemeljite.

## NALOGA 36.



- a. Naj bo  $K_9$  poln graf na 9 točkah,  $H = (V, E)$  pa njemu izomorfen graf. Izpolnite:
 

(i) $ V  =$	(ii) $ E  =$	(iii) $\chi(H) =$	(iv) $H^c =$
-------------	--------------	-------------------	--------------
- b. Naj bo  $G = (V, E)$  graf, kjer je  $V$  množica vozlišč,  $E$  pa množica povezav. Kaj pomeni, da je množica  $S \subseteq V$  prerezna za graf  $G$ ?
- c. Naj bo  $G$  Hamiltonov graf in  $S$  prerezna množica moči  $k$ . Največ koliko komponent za povezanost ima  $G - S$ ? Odgovor utemeljite.

## NALOGA 37.



Za vsako od naslednjih trditev napišite, ali drži ali ne in odgovor pojasnite.

- a. Poln graf na 5 točkah ima 20 povezav.
- b. Komplement dvodelnega grafa s 5 točkami ni nikoli dvodelen.
- c. Hamiltonov graf ima lahko dve komponenti za povezanost.
- d. Obstaja graf z  $n$  vozlišči in  $m$  povezavami,  $m > 2$ , ki ima kromatično število  $n \cdot m$ .
- e. Če Eulerjevemu grafu dodamo eno povezavo, potem novi graf ni Eulerjev.

## NALOGA 38.



Vsi grafi v tej nalogi naj imajo neusmerjene povezave, nimajo zank in nimajo večkratnih povezav.

- a. Narišite dva neizomorfna grafa s 4 vozlišči, ki sta Hamiltonova, a nista Eulerjeva.
- b. Razložite, kaj v Brooksovem izreku ne velja v primeru, ko je  $G$  lih cikel.
- c. Naj bo  $G$  graf s 27 vozlišči in kromatičnim številom  $\chi(G) = 2$ . Ali je  $G$  lahko Hamiltonov? Če je odgovor da, napišite primer, sicer pa utemeljite, zakaj je odgovor ne.

NALOGA 39.



Relacija  $\mathcal{R}$  na množici grafov (neusmerjeni, brez zank in brez večkratnih povezav) je podana s predpisom

$$G \mathcal{R} H \quad \Leftrightarrow \quad |V(G)| = |V(H)| \quad \text{in} \quad ||E(G)| - |E(H)|| = 2.$$

Narišite 2 neizomorfna grafa, ki sta v relaciji  $\mathcal{R}$  z grafom  $P_4$  (pot na 4 točkah).

NALOGA 40.



Ali obstaja povezan graf  $G$ , ki zadošča  $\chi(G) = 2022$  in  $\Delta(G) = 2020$ ? Kaj pa povezan graf  $H$ , ki zadošča  $\chi(H) = 2022$  in  $\Delta(H) = 2021$ ?

Kot ponavadi nas zanimajo samo neusmerjeni grafi, ki nimajo zank ali večkratnih povezav. Če je odgovor da, navedite primer takega grafa, sicer pa utemeljite, zakaj je odgovor ne.

.





## POGLAVJE 6

### Linearne diofantske enačbe in permutacije

NALOGA 41.



- a. Z razširjenim Evklidovim algoritmom poiščite največji skupni delitelj števil 65 in 26.
- b. Obkrožite črke pred tistimi linearnimi diofantskimi enačbami, ki nimajo nobene celoštevilске rešitve:

$$\begin{array}{ll} \text{(i)} & 65x + 26y = 16, \\ \text{(ii)} & 65x + 26y = 130, \\ \text{(iii)} & 65x + 26y = -39, \\ \text{(iv)} & 65x + 26y = 27. \end{array}$$

- c. Izberite eno od linearnih diofantskih enačb iz prejšnje točke, ki ima celoštevilске rešitve, in napišite formulo, ki opiše vse njene celoštevilске rešitve.

NALOGA 42.



- a. Dana je enačba  $84x + 63y = c$ , kjer sta  $x, y$  celoštevilski spremenljivki,  $c$  pa celoštevilski parameter. Za katere parametre  $c$  ima enačba vsaj eno celoštevilsko rešitev?
- b. Za najmanjši pozitiven celoštevilski  $c$ , pri katerem ima zgornja enačba celoštevilsko rešitev, napišite formulo, ki opiše vse celoštevilске rešitve.

NALOGA 43.



- a. Dana je enačba  $ax + by = c$ , kjer sta  $x, y$  celoštevilski spremenljivki,  $a, b, c$  pa celoštevilski parametri.
- (a) Napišite potreben in zadosten pogoj na parametre  $a, b, c$ , da bo imela enačba vsaj eno celoštevilsko rešitev  $(x_0, y_0)$ .
- (b) V primeru  $a = 35$ ,  $c = 21$  ugotovite, ali obstaja parameter  $b$ , za katerega ima enačba vsaj eno celoštevilsko rešitev. Odgovor utemeljite.

NALOGA 44.



Naj bosta

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 3 & 6 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{in} \quad \psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

permutaciji.

- Določite definicijsko območje in zalogo vrednosti permutacije  $\pi$ ?
- Zapišite permutacijo  $\pi$  v obliki produkta disjunktnih ciklov in določite njen red.
- Zapišite permutacijo  $\pi$  v obliki produkta transpozicij in določite njeno parnost.
- Izračunajte produkt  $\pi * \psi$ .

NALOGA 45.



- Naj bodo  $a, b, c$  pozitivna cela števila. Če  $a$  deli  $b \cdot c$  in sta si  $a, b$  tuja, koliko je največji skupni delitelj števil  $a$  in  $c$ ? Odgovor utemeljite.
- Naj bosta  $a, b$  pozitivni celi števili, ki sta si tuji. Ali obstajata pozitivni celi števili  $k, \ell$ , da velja  $ka + \ell b = 1$ ?
- Napišite permutacijo  $\alpha$  množice  $\{1, 2, \dots, 9\}$  s ciklično strukturo  $[4, 4, 1]$ .
- Rešite enačbo  $\pi^2 = \alpha$ , kjer je  $\alpha$  vaša rešitev točke (c).

NALOGA 46.



- Naj bodo  $b, c, d$  pozitivna cela števila. Če  $b$  deli  $c \cdot d$  in sta si  $b, d$  tuja, koliko je največji skupni delitelj števil  $b$  in  $c$ ? Odgovor utemeljite.
- Naj bosta  $a, b$  pozitivni celi števili, ki sta si tuji. Ali obstajata negativni celi števili  $k, \ell$ , da velja  $ka + \ell b = -1$ ?
- Napišite permutacijo  $\alpha$  množice  $\{1, 2, \dots, 7\}$  s ciklično strukturo  $[3, 3, 1]$ .
- Rešite enačbo  $\pi^2 = \alpha$ , kjer je  $\alpha$  vaša rešitev točke (c),  $\pi$  pa nima ciklične strukture  $[3, 3, 1]$ .

NALOGA 47.



- Napišite primer naravnih števil  $a, b$ , za kateri velja  $\gcd(a, b) = 2$  in  $\text{lcm}(a, b) = 20$ .
- Napišite permutacijo  $\alpha$  reda 6 na množici 5 točk.

NALOGA 48.



- Napišite primer naravnih števil  $a, b$ , za kateri velja  $\gcd(a, b) = 2$  in  $\text{lcm}(a, b) = 12$ .
- Napišite permutacijo  $\alpha$  reda 6 na množici 6 točk, ki nima ciklične strukture  $\mathcal{C}(\alpha) = [6]$ .

NALOGA 49.



- a. Naj bosta  $a$  in  $b$  števili, za kateri velja  $\gcd(a, b) = 2$ . Koliko celoštevilskih rešitev  $(x, y \in \mathbb{Z})$  ima enačba

$$ax + by = 2022?$$

Odgovor utemeljite.

- b. Ali obstajata naravni števili  $a$  in  $b$ , za kateri velja  $\gcd(a, b) = 2^5$  in  $\text{lcm}(a, b) = 3^7$ ? Če je odgovor da, ju poiščite, sicer pa utemeljite, zakaj je odgovor ne.
- c. Rešite permutacijsko enačbo

$$\varphi^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 1 & 6 & 7 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$



**Del 2**

**Rešitve**

## Izjavni račun

REŠITEV NALOGE 1.



a.  $p, p \Rightarrow \boxed{q} \models q, \quad p \vee q, \boxed{\neg q} \models p.$

b.  $p \Rightarrow q, \neg q, \neg p \boxed{\vee} r \models \neg r$

c. Pravilni so vezniki  $\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ . Protiprimer za pravilnost sklepa so vrednosti izjavnih spremenljivk  $p = 0, q = 0, r = 1$ , saj je v tem primeru

$$p \Rightarrow q \sim 1, \quad \neg q \sim 1, \quad \neg p \boxed{\{\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}} r \sim 1, \quad \neg r \sim 0.$$

REŠITEV NALOGE 2.



a. Izjavni izraz ni tautologija. Za  $p = 1$  in  $r = 0$  vrednost izraza ni 1:  $1 \Rightarrow 0 \sim 0$ .

b. Izjavni izraz ni tautologija. Za  $p = 0$  in  $r = 0$  vrednost izraza ni 1:

$$(0 \Rightarrow 0) \Rightarrow 0 \sim 1 \Rightarrow 0 \sim 0.$$

c. Izjavni izraz je tautologija. Preveriti moramo, da ima pri vseh naborih vrednosti izjavnih spremenljivk  $p$  in  $r$  izjavni izraz vrednost 1, tj.

$$p = 1, r = 1 : \quad ((1 \Rightarrow 1) \Rightarrow 1) \Rightarrow 1 \sim 1 \Rightarrow 1 \sim 1,$$

$$p = 1, r = 0 : \quad ((1 \Rightarrow 0) \Rightarrow 1) \Rightarrow 1 \sim 1 \Rightarrow 1 \sim 1,$$

$$p = 0, r = 1 : \quad ((0 \Rightarrow 1) \Rightarrow 0) \Rightarrow 0 \sim (1 \Rightarrow 0) \Rightarrow 0 \sim 0 \Rightarrow 0 \sim 1,$$

$$p = 0, r = 0 : \quad ((0 \Rightarrow 0) \Rightarrow 0) \Rightarrow 0 \sim (1 \Rightarrow 0) \Rightarrow 0 \sim 0 \Rightarrow 0 \sim 1.$$

d.  $((p \Rightarrow r) \Rightarrow p) \Rightarrow p \Rightarrow 0$ .

REŠITEV NALOGE 3.



a. Nabor  $\{\vee, \wedge\}$  ni poln, saj ohranja logično vrednost 1, tj.  $1 \vee 1 \sim 1$  in  $1 \wedge 1 \sim 1$ .

b. Za vsak izjavni izraz  $I$  obstaja izjavni izraz  $I'$ , v katerem nastopajo samo vezniki  $\neg, \wedge, \vee$ , pri čemer imata  $I$  in  $I'$  isto resničnostno tabelo. Primera takega izjavnega izraza  $I'$  sta konjunktivna in disjunktivna normalna oblika izraza  $I$ .

- c.
- Sklep  $I \models J$  je pravilen natanko tedaj, ko iz  $I \sim 1$  sledi  $J \sim 1$ .
  - Sklep  $I, \neg J \models 0$  pa je pravilen, ko iz  $I \sim 1$  in  $\neg J \sim 1$ , sledi  $0 \sim 1$ . To pa je ekvivalentno temu, da iz  $I \sim 1$  in  $J \sim 0$ , sledi  $0 \sim 1$ . Ker je  $0 \not\sim 1$ , je  $I, \neg J \models 0$  pravilen natanko tedaj, ko predpostavki  $I \sim 1$  in  $J \sim 0$  nista nikoli izpolnjeni. To pa je res natanko tedaj, ko iz  $I \sim 1$  sledi  $J \sim 1$ .
  - Torej sta sklepa  $I \models J$  in  $I, \neg J \models 0$  enakovredna.

REŠITEV NALOGE 4.



- a. Največ 1 ima  $\vee$ , najmanj pa  $\wedge$ .
- b. Izraza v (i) nista enakovredna. Za  $A \sim 1$  in  $B \sim 1$  je  $(A \wedge \neg B) \vee A \sim 1$  in  $\neg B \sim 0$ .

Izraza v (ii) sta enakovredna, saj velja

$$\neg(\neg A \wedge B) \sim \neg\neg A \vee \neg B \sim A \vee \neg B.$$

Izraza v (iii) sta enakovredna, saj velja

$$(A \vee B) \wedge C \sim (A \wedge C) \vee (B \wedge C).$$

- c.
- $\{\triangle, \bigcirc\}$ : ?. Če od polnega nabora odvzamemo nek veznik, nov nabor ni nujno več poln.
  - $\{\bigcirc, \sqcup\}$ : N. Če od nepolnega nabora odvzamemo nek veznik, nov nabor ni poln.
  - $\{\bigcirc, \sqcup, *, \otimes\}$ : ?. Ta nabor ne vsebuje polnega nabora, niti ni podmnožica nepolnega nabora. Torej ne moremo nič sklepati o njegovi polnosti.
  - $\{\bigcirc, \sqcup, \otimes, \triangle\}$ : P. Ta nabor vsebuje poln nabor, torej je poln.

REŠITEV NALOGE 5.



- a. Izjavna izraza sta enakovredna, kadar imata za vsak nabor vrednosti izjavnih spremenljivk enaki logični vrednosti.
- b.  $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$ .
- c. Modus ponens:  $A \Rightarrow B, A \models B$ .

$A$	$B$	$A \Rightarrow B$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Predpostavki  $A \Rightarrow B$  in  $A$  sta resnični samo v prvi vrstici zgornje tabele, kjer je resničen tudi zaključek  $B$ . Torej je sklep pravilen.

REŠITEV NALOGE 6.



- a.  $\neg(A \wedge B) \sim \neg A \vee \neg B$  in  $\neg(A \vee B) \sim \neg A \wedge \neg B$ .

b.

$p$	$q$	$r$	$I(p, q, r)$
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	0	1

c. Modus tollens:  $A \Rightarrow B, \neg B \models \neg A$ 

Iz resničnostne tabele

$A$	$B$	$A \Rightarrow B$	$\neg B$	$\neg A$
1	1	1	0	0
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
0	0	1	1	1

opazimo, da imata obe predpostavki  $A \Rightarrow B$  in  $\neg B$  hkrati vrednost 1 samo za  $A \sim B \sim 0$ . Takrat pa ima tudi zaključek  $\neg A$  vrednost 1.

## REŠITEV NALOGE 7.



- a. Pri vseh naborih vrednosti  $A, B$ , za katere sta izraza  $A \Rightarrow B$  in  $A$  resnična, je resničen tudi izraz  $B$ .
- b. Ker je  $g(1, 1) = 1$  in  $g(1, 0) = g(0, 1) = g(0, 0) = 0$ ,  $g$  predstavlja  $\wedge$ .
- c. 1. možnost: Ker je  $(f \circ g)(1, 1) = f(g(1, 1)) = f(1) = 0$  in podobno  $(f \circ g)(0, 0) = (f \circ g)(1, 0) = (f \circ g)(0, 1) = 1$ ,  $g$  predstavlja  $\neg p \vee \neg q$ .
2. možnost:  $(f \circ g)(p, q) = f(g(p, q)) = f(p \wedge q) = \neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$ .

## REŠITEV NALOGE 8.



- a. Pri vseh naborih vrednosti  $A, B$ , za katere sta izraza  $A \Rightarrow B$  in  $\neg B$  resnična, je resničen tudi izraz  $\neg A$ .
- b. Ker je  $g(1, 1) = g(0, 0) = 0$  in  $g(1, 0) = g(0, 1) = 1$ ,  $g$  predstavlja  $\vee$ .



- c. 1. možnost: Ker je  $(f \circ g)(1, 1) = f(g(1, 1)) = f(0) = 1$  in podobno  $(f \circ g)(0, 0) = 1$ ,  $(f \circ g)(1, 0) = (f \circ g)(0, 1) = 0$ ,  $g$  predstavlja  $\Leftrightarrow$ .
2. možnost:  $(f \circ g)(p, q) = f(g(p, q)) = f(p \vee q) = \neg(p \vee q) = p \Leftrightarrow q$ .

REŠITEV NALOGE 9.



- a. Ker je  $1 \Leftrightarrow 1 \sim 1$  in  $0 \Leftrightarrow 0 \sim 1$ , je izraz  $p \Leftrightarrow p$  tautologija. Ker je  $(0 \Leftrightarrow 0) \Leftrightarrow 0 \sim 1 \Leftrightarrow 0 \sim 0$ , izraz  $p \Leftrightarrow p \Leftrightarrow p$  ni tautologija.
- b. Če za  $I(p)$  vzamemo katerokoli tautologijo, bo izraz  $I(p) \vee r$  tautologija.  $I(p)$  je npr.  $1, p \vee \neg p, p \Leftrightarrow p, \dots$

REŠITEV NALOGE 10.



- a. Ker je  $1 \Rightarrow (1 \vee 1) \sim 1 \Rightarrow 1 \sim 1$  in  $0 \Rightarrow (0 \vee 0) \sim 0 \Rightarrow 0 \sim 1$ , je izraz  $p \Rightarrow p \vee p$  tautologija.
- b. Če za  $I(p)$  vzamemo katerokoli protislovje, bo izraz  $I(p) \Rightarrow r$  tautologija.  $I(p)$  je npr.  $0, p \wedge \neg p, p \Leftrightarrow \neg p, \dots$

## Predikatni račun

REŠITEV NALOGE 11.



- a. Pri izbiri  $\mathcal{D} = \mathbb{N}$  in  $P(x) : \text{'x je sodo število.'}$  je interpretacija formule (1): Če za vsako naravno število velja, da ni sodo, potem ne obstaja naravno število, ki bi bilo sodo.
- b.

$$\begin{aligned} & (\forall x : \neg P(x)) \Rightarrow (\neg \exists x : P(x)) \\ & \sim (\forall x : \neg P(x)) \Rightarrow (\neg \exists y : P(y)) \\ & \sim \neg (\forall x : \neg P(x)) \vee (\neg \exists y : P(y)) \\ & \sim (\exists x : P(x)) \vee (\forall y : \neg P(y)) \\ & \sim \exists x : (P(x) \vee \forall y : \neg P(y)) \\ & \sim \exists x \forall y : (P(x) \vee \neg P(y)). \end{aligned}$$

- c. Formula je splošno veljavna. V interpretaciji s področjem pogovora  $\mathcal{D}$  mora obstajati  $d \in \mathcal{D}$ , tako da za vsak  $d' \in \mathcal{D}$  velja  $P(d) \vee \neg P(d') \sim 1$ . Če obstaja  $d_0$ , da velja  $P(d_0) \sim 1$ , potem je  $d = d_0$  dober za vse  $d'$ . Če pa tak  $d_0$  ne obstaja, potem za vsak  $d'$  velja  $\neg P(d') \sim 1$  in za  $d$  lahko vzamemo katerikoli element iz  $\mathcal{D}$ .

REŠITEV NALOGE 12.



a. Izjavne formule so definirane induktivno:

- Atomi so izjavne formule.
- Če sta  $W$  in  $V$  izjavni formuli in je  $x$  spremenljivka, potem so tudi

$$(\neg W), (W \wedge V), (W \vee V), (W \Rightarrow V), (W \Longleftrightarrow V), \dots$$

$$(\exists x W) \quad \text{in} \quad (\forall x W)$$

izjavne formule.

- b.
- Na prvem izpitu iz DS za vsako nalogo velja naslednja trditev: Naloga je najzahtevnejša ali pa obstaja naloga, ki je zahtevnejša od nje.
  - Na prvem izpitu iz DS za vsako nalogo velja naslednje trditev: Obstaja naloga, ki je zahtevnejša od nje ali pa je naloga  $z$  iz področja permutacij.
  - Na prvem izpitu iz DS velja naslednja trditev: Ni res, da za vsako nalogo obstaja naloga, ki je zahtevnejša od nje ali pa je naloga  $z$  iz področja permutacij.

c.  $\exists x \forall y : (\neg P(y, x) \wedge \neg R(z)).$

REŠITEV NALOGE 13.



a.  $\forall x : (W \wedge V) \sim \forall x : W \wedge \forall x : V$  in  $\exists x : (W \vee V) \sim \exists x : W \vee \exists x : V.$

b.

$$((\forall x \exists y : P(x, y)) \vee (R(y) \wedge (\neg Q(z)))) \vee (\exists y \forall w : (T(w) \vee Z(x, y, w)))$$

c. Primer izjavne formule  $W$ :

$$\exists x \exists y : (P(x) \wedge Q(x, y) \wedge \neg P(z)).$$

REŠITEV NALOGE 14.



a.  $((\forall x Q(x)) \wedge (\neg R(y))) \Rightarrow P(x, y).$

b. Da, formula je resnična. Ko ima  $x$  vrednost 'rdeča', je za vsak  $y$  izjava  $P(\text{rdeča}) \vee Q(y)$  resnična.

REŠITEV NALOGE 15.



a.  $(\exists x P(x, y)) \Rightarrow ((\neg Q(x)) \wedge R(y)).$

b. Ne, formula ni resnična. Ko ima  $x$  vrednost 'oranžna', ne obstaja  $y$ , da bi bila izjava  $P(\text{oranžna}) \wedge Q(y)$  resnična.

REŠITEV NALOGE 16.



a.  $\exists x \forall y : (\neg P(x) \vee \neg Q(y)).$

b.  $\forall x \exists y : (P(x) \wedge \neg Q(y)).$

c.  $\exists x \exists y : (P(x) \wedge \neg Q(y)).$

## Množice

## REŠITEV NALOGE 17.



a.  $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$  ali  $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ .

b.  $A \cap (A \cup B) = A$  :

Vsebovanost  $\subseteq$ : Naj bo  $x \in A \cap (A \cup B)$ . Posebej velja  $x \in A$ . Torej je  $A \cap (A \cup B) \subseteq A$ .

Vsebovanost  $\supseteq$ : Velja  $A \subseteq A$  in  $A \subseteq A \cup B$ . Torej je  $A \subseteq A \cap (A \cup B)$ .

$A \cup (A \cap B) = A$  :

Vsebovanost  $\subseteq$ : Velja  $A \subseteq A$  in  $A \cap B \subseteq A$ . Torej je  $A \cup (A \cap B) \subseteq A$ .

Vsebovanost  $\supseteq$ : Iz  $A \subseteq A$  sledi  $A \subseteq A \cup (A \cap B)$ .

c. Velja:

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cup (A \cap B^c) &= ((A \cap B) \cup A) \cap ((A \cap B) \cup B^c) \\ &= A \cap ((A \cap B) \cup B^c) \\ &= A \cap ((A \cup B^c) \cap (B \cup B^c)) \\ &= A \cap (A \cup B^c) \\ &= A, \end{aligned}$$

kjer smo v prvi in tretji enakosti uporabili zakon distributivnosti, v drugi in peti zakon absorpcije, v četrti pa dejstvo, da je  $B \cup B^c$  enako univerzalni množici.

## REŠITEV NALOGE 18.



a. Pravilni odgovor je katerikoli od naslednjih:

- $\forall x \in U : ((x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \in A)),$
- $\forall x \in U : (x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge \forall x \in U : (x \in B \Rightarrow x \in A),$
- $\forall x \in U : (x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge \forall y \in U : (y \in B \Rightarrow y \in A),$
- $\forall x \in U : (x \in A \wedge x \in B \vee \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B)).$
- $\forall x \in U : (x \in A \wedge x \in B \vee x \notin A \wedge x \notin B).$

b. Pravilni odgovor je katerikoli od naslednjih:

- $\forall x \in U : (\neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)),$
- $\forall x \in U : (x \notin A \vee x \notin B),$
- $\forall x \in U : ((x \in A \Rightarrow \neg(x \in B)) \wedge (x \in B \Rightarrow \neg(x \in A))),$
- $\forall x \in U : (x \in A \wedge \neg(x \in B) \vee \neg(x \in A) \wedge x \in B \vee \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B)).$

c. Pravilni odgovor je

$$\forall x \in U : (\neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)) \Rightarrow \exists x \in U : (x \in B \wedge x \in C).$$

## REŠITEV NALOGE 19.



a.  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$  in  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ .

- b.  $\mathcal{P}A = \{X : X \subseteq A\}$ .
- c.
  - Ni potenčna množica, saj elementa 1, 2 nista množici.
  - Ni potenčna množica, saj ne vsebuje  $\emptyset$ .
  - Je potenčna množica množice  $\{1, \{2, 7\}\}$ .

REŠITEV NALOGE 20.



- a. Da, saj lahko v  $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$  zamenjamo vlogi množic  $C$  in  $D$ .
- b.  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ . V tem primeru ima  $\mathcal{P}(A)$  natanko  $2^6 = 64$  elementov.
- c. Refleksivna relacija  $R$  vsebuje vse pare  $(1, 1), \dots, (6, 6)$ . Vsi ostali urejeni pari  $(i, j)$ ,  $i \neq j$ ,  $i, j \in A$ , pa so lahko vsebovani v  $R$  ali pa ne. Takih parov je  $6 \cdot 5 = 30$ . Torej je refleksivnih relacij  $2^{30} = |M|$ .

REŠITEV NALOGE 21.



- a. Da, saj lahko v  $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$  zamenjamo vlogi množic  $A$  in  $B$ .
- b.  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ . V tem primeru ima  $\mathcal{P}(A)$  natanko  $2^5 = 32$  elementov.
- c. Vsak par  $(1, 1), \dots, (5, 5)$  je lahko vsebovan v simetrični relaciji  $R$  ali pa ne. Za vsak urejen par  $(i, j)$ ,  $i \neq j$ ,  $i, j \in A$ , ki je v  $R$ , pa mora biti v  $R$  tudi  $(j, i)$ . Takih dvojic  $(i, j), (j, i)$  je  $\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ . Vsaka je vsebovana v  $R$  ali pa ni. Torej je simetričnih relacij  $2^{5+10} = 2^{15} = |M|$ .

REŠITEV NALOGE 22.



- a.  $A = \emptyset$  in  $\mathbb{N} \times A = \emptyset$ . Če ima  $A$  vsaj en element, je množica  $\mathbb{N} \times A$  neskončna.
- b.  $\mathcal{P}(\mathbb{N} \times B) = \{\emptyset, \mathbb{N} \times B, \{(1, \wedge)\}, \{(1, \wedge), (1, \vee)\}, \dots\}$ .
- c.  $f$  ne more biti injektivna, saj je njena domena neskončna množica  $\mathbb{N}$ , njena kodomena pa končna množica  $C$ .

REŠITEV NALOGE 23.



- a. Npr.  $A = \mathbb{N}$ . Katerakoli neskončna množica je ustrezna. Če ima  $A$  končno mnogo elementov, bo imela tudi množica  $\{1, 2, 3\} \times A$  končno mnogo elementov.
- b.  $\mathcal{P}(B \times \mathbb{N}) = \{\emptyset, B \times \mathbb{N}, \{(\wedge, 1)\}, \{(\wedge, 1), (\vee, 1)\}, \dots\}$ .
- c.  $f$  ne more biti surjektivna, saj je njena domena končna množica  $C$ , njena kodomena pa neskončna množica  $\mathbb{N}$ .

## Relacije in preslikave

## REŠITEV NALOGE 24.



a. Pravilni odgovori so npr.:

- $f(x) = \begin{cases} x, & \text{za } 1 \leq x \leq 5, \\ 1, & \text{sicer.} \end{cases}$
- Katerokoli premešanje števil 1 do 5, vsa ostala števila pa preslikana kamorkoli v množico  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ .
- $f(x) = (x \bmod 5) + 1$ .

b. Ker je  $f$  surjektivna, je  $\mathcal{Z}_f = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ . Torej moramo poznati  $g(i)$  za vsak  $i = 1, 2, 3, 4, 5$ . Zato je  $\{1, 2, 3, 4, 5\} \subseteq A$ .

c. Ne obstaja. Ker je zaloga vrednosti  $\mathcal{Z}_f$  moči 5, je tudi zaloga vrednosti kompozituma  $g \circ f$  največ moči 5. Ker je  $g \circ f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , bi morala biti tudi slika kompozituma enaka  $\mathbb{N}$ . To pa ne gre.

d. Npr.  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{1\}$  in  $g(i) = 1$  za vsak  $i \in A$ .

## REŠITEV NALOGE 25.



a. Primer relacije je  $R = \{(a, b), (c, d), (e, f)\}$ , kjer so  $a, b, c, d, e, f$  katera koli števila (ne nujno različna) iz  $A$ .

b. Najmanj 5, tj.  $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)$ . Lahko pa še katerega koli od preostalih.

c. 25, saj je različnih elementov v množici  $A \times A$  ravno  $25 = 5^2$ .

d. Vsak izmed elementov iz  $A \times A$  je bodisi element  $R$  bodisi ni. Torej je različnih relacij  $2^{\text{št. elementov } A \times A} = 2^{25}$ .

## REŠITEV NALOGE 26.



a.  $f(1) = b_1, f(2) = b_2, f(3) = b_3, f(4) = b_4$ .

b.  $6^4$ , saj lahko vsak element iz  $A$  preslikamo v kateregakoli izmed šestih elementov množice  $B$ .

c.  $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$ . Element 1 lahko preslikamo v kateregakoli izmed šestih elementov množice  $B$ , 2 v kateregakoli izmed petih preostalih, 3 v kateregakoli izmed štirih preostalih in 4 v kateregakoli izmed treh preostalih.

d. Veljati mora

$$\begin{aligned}b_1 &= g(1) = (h \circ f)(1) = h(f(1)) = h(b_1), \\b_1 &= g(2) = (h \circ f)(2) = h(f(2)) = h(b_2), \\b_2 &= g(3) = (h \circ f)(3) = h(f(3)) = h(b_3), \\b_6 &= g(4) = (h \circ f)(4) = h(f(4)) = h(b_4).\end{aligned}$$

Ostala elementa  $b_5, b_6$  pa se lahko slikata kamorkoli v  $B$ , npr.  $h(b_5) = h(b_6) = b_1$ .

REŠITEV NALOGE 27.



- Ekvivalenčna relacija  $R$  je relacija na množici  $A$ , ki je refleksivna ( $(x, x) \in R$  za vsak  $x \in A$ ), simetrična ( $(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$  za vsaka  $x, y \in A$ ) in tranzitivna (Za vse trojice  $x, y, z \in A$  iz  $(x, y) \in R$  in  $(y, z) \in R$ , sledi  $(x, z) \in R$ ). Relacija  $R$  v nalogi je ekvivalenčna.
- Relacija  $S$  ima tri ekvivalenčne razrede. V prvem so obvezni predmeti, ki se izvajajo v prvem letniku prve stopnje uni študija na FRI, v drugem predmeti drugega letnika, v tretjem pa predmeti tretjega letnika.
- $R * S = \emptyset$ . Ker je  $R$  ekvivalenčna relacija na  $A$ , je  $R^{-2020} = (R^{-1})^{2020} = R^{2020} = R$ . Torej tudi na  $A \cup B$  velja  $R^{-2020} = R$ .

REŠITEV NALOGE 28.



- Relacija  $f$  je preslikava, če je enolična, je njena domena  $D_f$  cela množica  $A$  in je njena slika  $Z_f$  podmnožica  $A$ .
- $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $f(x) = x + 1$ .
- Kompozitum  $f \circ f$  je injektiven natanko tedaj, ko je preslikava  $f$  injektivna.

Dokaz v smer ( $\Rightarrow$ ). Če  $f$  ne bi bila injektivna, bi obstajala  $x$  in  $y$  z  $x \neq y$ , za katera bi bilo  $f(x) = f(y)$  in zato  $f(f(x)) = f(f(y))$ . Toda to je v nasprotju z injektivnostjo  $f \circ f$ .

Dokaz v smer ( $\Leftarrow$ ). Dokazati moramo, da iz  $(f \circ f)(x) = (f \circ f)(y)$  sledi  $x = y$ . Po definiciji kompozituma velja  $f(f(x)) = f(f(y))$ . Ker je  $f$  injektivna, sledi od tod  $f(x) = f(y)$ . Ker je  $f$  injektivna, je  $x = y$ .

REŠITEV NALOGE 29.



- Dvomestna relacija  $R$  v  $A$  je množica urejenih parov elementov iz  $A \times A$ .
- Pravilen odgovor je katerikoli od naslednjih:
  - $R * S$  je relacija v množici  $A$ , katere elementi so urejeni pari  $(x, y) \in A \times A$ , za katere obstaja nek  $z \in A$ , tako da velja  $xRz$  in  $zSy$ .

$$\bullet R * S = \{(x, y) \in A \times A : \text{za nek } z \in A \text{ velja } xRz \text{ in } zSy\}.$$

$$c. R^+ = \{(x, y), (y, z), (z, u), (u, v), (x, z), (x, u), (x, v), (y, u), (y, v), (z, v)\}.$$

REŠITEV NALOGE 30.



- Ekvivalenčna relacija je  $R$ . Vsi študentje, ki so na izpitu dobili enako oceno, so v istem ekvivalenčnem razredu. Ekvivalenčni razredi so  $R[5] = \{x : x \text{ je dobil oceno } 5\}$ ,  $\dots$ ,  $R[10] = \{x : x \text{ je dobil oceno } 10\}$ .
- Relacija  $S$  ni ekvivalenčna, saj ni tranzitivna. Za študente  $x, y, z$ , ki so na izpitu dosegli 63, 64, 65 točk velja,  $xSy$  in  $ySz$ , ne velja pa  $xSz$ .
- $x$  in  $z$  sta v relaciji  $S^2$  natanko tedaj, ko obstaja  $y$ , da velja  $xSy$  in  $ySz$ . Tak  $y$  bo obstajal, če se bo njegov rezultat razlikoval največ za 1 točko od 94 in 96. Torej bosta  $x$  in  $z$  v relaciji  $S^2$  natanko tedaj, ko obstaja študent, ki je na izpitu dosegel 95 točk.

REŠITEV NALOGE 31.



Iz pogoja  $f \circ f = \text{id}_C$  sledi  $f(2) = 1$  in  $f(5) = 4$ . Iz bijektivnosti pa sledi še  $f(3) = 3$ .

## Teorija grafov

REŠITEV NALOGE 32.



- Trditev je pravilna. Graf  $G$  vsebuje cikel lihe dolžine, zato ni dvodelen.
- Trditev ni pravilna. Graf  $G$  ni Eulerjev, saj obstaja točka lihe stopnje (tj. 5).
- Trditev je pravilna. Kromatično število je  $\chi(G)$  je več kot 2, saj graf  $G$  ni dvodelen. Ker je največja stopnja vozlišča 5, je  $\chi(G) \leq 6$ . Ker pa graf ni niti lih cikel (saj obstaja točka stopnje več kot 2) niti poln graf, po Brooksovem izreku velja  $\chi(G) \leq 5$ .
- Trditev ni pravilna. Graf  $G = (V, E)$  z 9 vozlišči, ki ustreza pogojem naloge, je
 
$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_9\},$$

$$E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_8, v_9), (v_1, v_3), (v_1, v_4), (v_1, v_5), (v_1, v_6)\}$$

REŠITEV NALOGE 33.



- Npr. cikel na 4 točkah.
- Če odstranimo vseh 5 belih točk, graf razpade na 7 komponent. Po izreku o razpadu zato prvotni graf ni Hamiltonov.

- c. Fiksirajmo neko vozlišče. Cikel lahko začnemo po kateri koli od štirih povezav. V naslednjem vozlišču izbiramo med tremi preostalimi, nato med dvema, zadnja povezava pa je določena. Upoštevati moramo še, da smo vsak cikel dvakrat šteli, saj smo ga lahko prepotovali v eno ali v druge smer, tj.  $v_1v_3v_5v_4v_2$  je isti cikel kot  $v_1v_2v_4v_5v_3$ . Imamo  $\frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{2} = 12$  ciklov.

## REŠITEV NALOGE 34.



- a. Prvi graf je pot na pet točkah, drugi pa unija cikla na treh točkah in poti na dveh točkah.
- b. Če je graf povezan, potem je odgovor da, saj je graf Eulerjev natanko tedaj, ko so vsa vozlišča sodih stopnj. Če pa graf ni povezan, je odgovor ne.
- c. Ne. Za zaporedje 2, 2, 2, 1, 1 sta grafa iz rešitve točke (a) protiprimera. Prvi je dvodelen, drugi pa ni.

## REŠITEV NALOGE 35.



- a. Naj bo  $G = (V, E)$  graf, kjer je  $V$  množica vozlišč,  $E$  pa množica povezav. Velja  $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$ .
- b. Zaporedje je grafično, če obstaja graf, katerega stopnje vozlišč so v bijektivni korespondenci z danim zaporedjem.
- c.
  - Zaporedje 5, 2, 1, 0 ni grafično, saj bi moralo biti prvo vozlišče povezano s 5 vozlišči, na razpolago pa so le 3.
  - Zaporedje 3, 3, 2, 1 ni grafično, saj vsota števil v zaporedju ni soda.
  - Zaporedje 3, 3, 3, 3 je grafično. Ustreza mu poln graf na 4 točkah.
  - Po izreku je zaporedje 3, 3, 1, 1 grafično natanko tedaj, ko je 2, 2, 0, 0 grafično. To pa ni grafično, saj bi moralo biti prvo vozlišče povezano z dvema vozliščema, na razpolago pa je le eno.
- d.
  - Vsa števila  $n_i$  bi morala biti soda.
  - Kromatično število grafa je največ za 1 večje od stopnje največjega vozlišča, saj požrešna metoda barvanja deluje. Torej je največ  $n_1 + 1$ .

## REŠITEV NALOGE 36.



- a.  $|V| = 9$ ,  $|E| = \frac{9 \cdot 8}{2} = 36$ ,  $\chi(H) = 9$ ,  $H^c = \emptyset$ .
- b. Množica  $S \subseteq V$  je prerezna, če po odstranitvi vseh vozlišč in povezav, ki imajo vsaj eno krajišče v  $S$ , graf razpade na več povezanih komponent, kot jih je imel prvotni graf.
- c. Graf  $G - S$  ima največ  $k$  komponent za povezanost. Če bi jih imel več, bi moral Hamiltonov cikel vsaj  $(k + 1)$ -krat zamenjati komponento, pri čemer bi moral iti na vsakem koraku prek vozlišča v  $S$ . Ker je teh le  $k$ , to ne bi šlo.




## REŠITEV NALOGE 37.



- Ne drži, saj ima poln graf na 5 točkah  $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$  povezav.
- Drži, saj ima vsaj ena množica razbitja grafa vsaj 3 vozlišča. V komplementu grafa so vse vozlišča iste množice razbitja povezana, torej dobimo cikel dolžine 3.
- Ne drži. Če ima graf dve komponenti za povezanost, potem ne obstaja cikel, ki vsebuje vse točke grafa.
- Ne drži. Kromatično število grafa je navzgor omejeno s številom vozlišč, tj.  $n$ .
- Drži. Če Eulerjevemu grafu dodamo eno povezavo, potem obstajata natanko dve vozlišči lihe stopnje. Graf je namreč Eulerjev natanko tedaj, ko so vsa vozlišča sodih stopenj.

## REŠITEV NALOGE 38.




- V primeru, ko je  $G$  lih cikel, ne velja desna neenakost  $\chi(G) \leq \Delta(G)$  v Brooksovem izreku, saj je  $\chi(G) = 3$  in  $\Delta(G) = 2$ .
- Ker je  $\chi(G) = 2$ , je  $G$  dvodelen. Ker je vozlišč liho mnogo, barvna razreda nista enako velika. Za take grafe pa vemo (npr. z uporabo izreka o razpadu, kjer za prerezno množico vzamemo barvni razred z manjšim številom točk), da niso Hamiltonovi.

## REŠITEV NALOGE 39.



Dva primera grafov sta



## REŠITEV NALOGE 40.



Za povezan neusmerjen graf brez zank ali večkratnih povezav velja  $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$ . Ker ne velja  $2022 \leq 2021$ , tak graf  $G$  ne obstaja.

Primer grafa  $H$  je poln graf na 2022 točkah.

## Linearne diofantske enačbe in permutacije

## REŠITEV NALOGE 41.



a.

$$\begin{aligned}(1) : \quad & 65 = 1 \cdot 65 + 0 \cdot 26, \\(2) : \quad & 26 = 0 \cdot 65 + 1 \cdot 26, \quad 65 = 2 \cdot 26 + 13, \\(3) = (1) - 2(2) : \quad & 13 = 1 \cdot 65 - 2 \cdot 26, \quad 26 = 2 \cdot 13 + 0, \\(4) = (2) - 2(3) : \quad & 0 = -2 \cdot 65 + 5 \cdot 26.\end{aligned}$$

Torej je  $D(65, 26) = 13$ .

b. Veljati mora, da  $D(65, 26)$  deli desno stran enačbe. Enačbi z desno stranjo 16 oz. 27 nimata celoštevilskih rešitev, tisti z 130 in  $-39$  pa imata celoštevilske rešitve.

c. Izberimo enačbo  $65x + 26y = 130$ . Eno od rešitev  $(x_0, y_0)$  dobimo tako, da predzadnjo vrstico razširjenega Evklidovega algoritma pomnožimo z  $\frac{130}{13} = 10$ . Torej  $130 = 10 \cdot 65 - 20 \cdot 26$  in zato  $(x_0, y_0) = (10, -20)$ . Vse rešitve pa so oblike

$$\left(x_0 + k \cdot \frac{26}{13}, y_0 - k \cdot \frac{65}{13}\right) = (10 + 2k, -20 - 5k),$$

kjer je  $k \in \mathbb{Z}$ .

#### REŠITEV NALOGE 42.



a.

$$\begin{aligned}(1) : \quad & 84 = 1 \cdot 84 + 0 \cdot 63, \\(2) : \quad & 63 = 0 \cdot 84 + 1 \cdot 63, \quad 84 = 1 \cdot 63 + 21, \\(3) = (1) - (2) : \quad & 21 = 1 \cdot 84 - 1 \cdot 63, \quad 63 = 3 \cdot 21 + 0, \\(4) = (2) - 3(3) : \quad & 0 = -3 \cdot 84 + 4 \cdot 63.\end{aligned}$$

Torej je  $D(84, 63) = 21$ . Zato mora biti  $c$  celoštevilski večkratnik števila 21.

b. Najmanjši tak  $c$  je 21. Eno od rešitev  $(x_0, y_0)$  dobimo iz predzadnje vrstice razširjenega Evklidovega algoritma. Torej  $(x_0, y_0) = (1, -1)$ . Vse rešitve pa so oblike

$$\left(x_0 + k \cdot \frac{84}{21}, y_0 - k \cdot \frac{63}{21}\right) = (1 + 4k, -1 - 3k),$$

kjer je  $k \in \mathbb{Z}$ .

#### REŠITEV NALOGE 43.



a. Največji skupni delitelj parametrov  $a$  in  $b$  mora deliti  $c$ .

b. Ustrezen je vsak  $b$ , za katerega velja, da največji skupen delitelj števil 35 in  $b$  deli 21. Npr. 1, 7, 14, 21, ...

#### REŠITEV NALOGE 44.



a. Definicijsko območje in zaloga vrednosti sta  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .

- b.  $\pi = (1, 4, 6)(2, 5)$ . Red je najmanjši skupni večkratnik dolžin ciklov, tj. 6.
- c.  $\pi = (1, 6)(1, 4)(2, 5)$ . Parnost permutacije  $\pi$  je liha.
- d.  $\pi * \psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 2 & 6 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ .

REŠITEV NALOGE 45.



- a. Ker je  $a|b \cdot c$  in  $D(a, b) = 1$ , sledi  $a|c$ . Torej je  $D(a, c) = a$ .
- b. Ne. Ker so  $a, b, k, \ell$  pozitivna cela števila, je  $ka + \ell b \geq 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2 > 1$ .
- c.  $\alpha = (1234)(5678)(9)$ .
- d. Ciklična struktura  $\pi$  je  $[8, 1]$ . Torej je  $\pi = (15263748)(9)$ .

REŠITEV NALOGE 46.



- a. Ker je  $b|c \cdot d$  in  $D(b, d) = 1$ , sledi  $b|c$ . Torej je  $D(b, c) = b$ .
- b. Ne. Ker sta  $a, b$  pozitivni celi števili,  $k, \ell$  pa negativni celi števila, je  $ka + \ell b \leq (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = -2 < -1$ .
- c.  $\alpha = (123)(456)(7)$ .
- d. Ciklična struktura  $\pi$  je  $[6, 1]$ . Torej je  $\pi = (142536)(7)$ .

REŠITEV NALOGE 47.



- a. Primeri so pari  $(a, b) \in \{(2, 20), (4, 10), (10, 4), (20, 2)\}$ .
- b. Primer je npr.  $\alpha = (123)(45)$ . Edina možna ciklična struktura je  $\mathcal{C}(\alpha) = [3, 2]$ .

REŠITEV NALOGE 48.



- a. Primeri so pari  $(a, b) \in \{(2, 12), (4, 6), (6, 4), (12, 2)\}$ .
- b. Primer je npr.  $\alpha = (123)(45)(6)$ . Edina možna ciklična struktura je  $\mathcal{C}(\alpha) = [3, 2, 1]$ .

REŠITEV NALOGE 49.



- a. Ker  $\gcd(a, b) = 2$  deli 2022, je enačba rešljiva nad  $\mathbb{Z}$ , rešitev pa je neskončno mnogo.

- b. Taki naravni števili  $a, b$  ne obstajata, saj bi moral  $\gcd(a, b)$  deliti  $\text{lcm}(a, b)$ .
- c. Velja  $\varphi^2 = (57)(46)(123)$ . Zato je  $\mathcal{C}(\varphi^2) = [3, 2, 2]$ . Sledi  $\mathcal{C}(\varphi) = [4, 3]$ . Dve rešitvi sta  $\varphi = (5476)(132)$  in  $\varphi = (5674)(132)$ .