

# Залікова робота з диференціальних рівнянь

Студента 2 курсу групи МП-21 Захарова Дмитра

23 травня 2023 р.

**Варіант 6.**

**Завдання.**

**Умова.** Знайти визначник крайової задачі та функцію Гріна:

$$\begin{cases} y'' - 4y = f(x) \\ y(0) - y(1) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases}$$

**Розв'язок.** Спочатку згадаємо, що таке визначник крайової задачі:

## Означення 1: Визначник крайової задачі

Якщо ми маємо диференціальне рівняння

$$y^{(n)} + \sum_{j=1}^n a_j(t)y^{(n-j)} = f(t), \quad a_k(1), f(t) \in \mathcal{C}[a, b]$$

з крайовими умовами

$$U_i(y) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}y^{(j-1)}(a) + \sum_{j=1}^n \beta_{ij}y^{(j-1)}(b) = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Якщо  $\{\varphi_k(t)\}_{k=1}^n \in \text{ФСР ЛОР}$ , то **визначником** крайової задачі називається

$$\Delta = \det\{U_i(\varphi_j)\}_{i,j=1}^n$$

Для нашого конкретного випадку маємо  $n = 2, a = 0, b = 1$ . Крайові умови:

$$U_1(y) = y(0) - y(1), \quad U_2(y) = y'(1)$$

Для знаходження ФСР ЛОР знаходимо розв'язок  $y'' - 4y = 0$ . Характеристичний поліном  $\lambda^2 - 4 = (\lambda - 2)(\lambda + 2)$ , отже маємо ФСР  $\{e^{2x}, e^{-2x}\}$ . Отже, наш визначник, якщо позначити  $\varphi_1(x) = e^{2x}, \varphi_2(x) = e^{-2x}$ :

$$\begin{aligned} \Delta &= \det \begin{bmatrix} \varphi_1(0) - \varphi_1(1) & \varphi_2(0) - \varphi_2(1) \\ \varphi_1'(1) & \varphi_2'(1) \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 - e^2 & 1 - e^{-2} \\ 2e^2 & -2e^{-2} \end{bmatrix} = \\ &= -2e^{-2} + 2 - 2e^2 + 2 = 4 - 2e^{-2} - 2e^2 = 4(1 - \cosh 2) \neq 0 \end{aligned}$$

Оскільки  $\Delta \neq 0$ , то крайова задача має єдиний розв'язок. Тепер, зна-

йдемо функцію Коші:

$$K(x, \xi) = \frac{\det \begin{bmatrix} \varphi_1(\xi) & \varphi_2(\xi) \\ \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} \varphi_1(\xi) & \varphi_2(\xi) \\ \varphi_1'(\xi) & \varphi_2'(\xi) \end{bmatrix}} = \frac{\det \begin{bmatrix} e^{2\xi} & e^{-2\xi} \\ e^{2x} & e^{-2x} \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} e^{2\xi} & e^{-2\xi} \\ 2e^{2\xi} & -2e^{-2\xi} \end{bmatrix}} = \frac{e^{-2x+2\xi} - e^{2x-2\xi}}{-2-2} = \frac{1}{2} \sinh 2(x - \xi)$$

Отже, шукатимемо функцію Гріна у вигляді:

$$g(x, \xi) = \begin{cases} K(x, \xi) + \sum_{i=1}^2 C_i(\xi) \varphi_i(x), & x > \xi \\ \sum_{i=1}^2 C_i(\xi) \varphi_i(x), & x < \xi \end{cases}$$

Або якщо розписати:

$$g(x, \xi) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sinh 2(x - \xi) + C_1(\xi) e^{2x} + C_2(\xi) e^{-2x}, & x > \xi \\ C_1(\xi) e^{2x} + C_2(\xi) e^{-2x}, & x < \xi \end{cases}$$

Отже, підставляємо її у наші крайові умови:

$$\begin{cases} C_1(\xi) + C_2(\xi) - C_1(\xi) e^2 - C_2(\xi) e^{-2} = \frac{1}{2} \sinh 2(1 - \xi) \\ \cosh 2(1 - \xi) + 2C_1(\xi) e^2 - 2C_2(\xi) e^{-2} = 0 \end{cases}$$

Або:

$$\begin{cases} (1 - e^2)C_1(\xi) + (1 - e^{-2})C_2(\xi) = \frac{1}{2} \sinh 2(1 - \xi) \\ 2e^2 C_1(\xi) - 2e^{-2} C_2(\xi) = -\cosh 2(1 - \xi) \end{cases}$$

Звідси:

$$C_1(\xi) = -\frac{1}{2(e^2 - 1)} \cosh 2(1 - \xi) + \frac{1}{2(e^2 - 1)^2} \sinh 2(1 - \xi),$$

$$C_2(\xi) = -\frac{e^2}{2(e^2 - 1)} \cosh 2(1 - \xi) + \frac{e^4}{2(e^2 - 1)^2} \sinh 2(1 - \xi)$$

Далі це можна підставити у вираз  $g(x, \xi)$ , але він буде дуже об'ємним, тому залишимо так.

Далі якщо нам потрібно знаходити розв'язок нашого рівняння, то достатньо просто знайти значення  $\int_0^1 g(x, \xi) f(\xi) d\xi$ .

**Відповідь.**  $g(x, \xi) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sinh 2(x - \xi) + C_1(\xi)e^{2x} + C_2(\xi)e^{-2x}, & x > \xi \\ C_1(\xi)e^{2x} + C_2(\xi)e^{-2x}, & x < \xi \end{cases}$  з функціями  $C_1(\xi), C_2(\xi)$ , що вказані у розв'язку.