

# **Залікова робота з Фінансового Аналізу**

**Захаров Дмитро, Варіант 3**

26 травня, 2025

## **Зміст**

<b>1</b>	<b>Задача 1</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Задача 2</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Задача 3</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Задача 4</b>	<b>7</b>

# 1 Задача 1

**Умова 1.1.** Диверсифікація ризику.

**Відповідь.** Нехай маємо  $n$  ймовірнісних фінансових операцій  $\xi_1, \dots, \xi_n$ . Дуже часто,  $\{\xi_i\}_{i \in \{1, \dots, n\}}$  є випадковими некорельованими доходами, тобто  $r[\xi_i, \xi_j] = \delta_{ij}$ .

Зокрема, розглянемо випадок, коли випадкові величини є однаковими незалежними і нехай математичне сподівання кожної з них дорівнює  $\mu$  та дисперсія кожної з них дорівнює  $\sigma^2$ . Введемо величину  $\xi := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$  — середній арифметичний дохід. В такому разі цікаво глянути на ефективність та ризик цієї операції в залежності від кількості активу  $n$ . Ефективність дорівнює:

$$\mathbb{E}[\xi] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[\xi_i] = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu.$$

Отже, при зміні кількості активів, ефективність не змінюється. Проте, цікава ситуація з ризиком:

$$\sigma_\xi^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n} \Rightarrow \sigma_\xi = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Отже, при збільшенні кількості активів  $n$ , ризик зменшується за такої самої ефективності.

Цей приклад демонструє суть диверсифікації ринку. Її сенс полягає в зниженні ризику фінансової операції шляхом вкладання в частки різних некорельованих активів з такою самою ефективністю та ризиком. Узагальнемо попередній приклад наступним чином: нехай ми вкладаємось в  $n$  незалежних фінансових операцій  $\xi_1, \dots, \xi_n$  з різними вагами  $w_1, \dots, w_n$  ( $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ ). Розглянемо дохідність  $\xi = \sum_{i=1}^n w_i \xi_i$ . Тоді її ефективність:

$$\mathbb{E}[\xi] = \sum_{i=1}^n w_i \mathbb{E}[\xi_i] = \mu \sum_{i=1}^n w_i = 1.$$

У свою чергу для ризику маємо:

$$\sigma_\xi^2 = \sum_{i=1}^n w_i^2 \sigma_i^2 = \sigma^2 \sum_{i=1}^n w_i^2 < \sigma^2.$$

Отже, так само отримали зниження ризику при такій самій ефективності. Причому, мінімум ризику досягається при рівномірному розподілі ваг, тобто

$w_i = \frac{1}{n}$  для всіх  $i$ . Дійсно, якщо розглянути функцію Лагранжа

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, \lambda) = \mathbf{w}^\top \mathbf{w} + \lambda(\mathbf{1}_n^\top \mathbf{w} - 1)$$

То тоді з умови  $\nabla_{\mathbf{w}} \mathcal{L}(\mathbf{w}, \lambda) = 2\mathbf{w} + \lambda \mathbf{1}_n = 0$  маємо  $w_i = -\frac{\lambda}{2}$  — однакові, а отже з умови на суму маємо  $w_i = \frac{1}{n}$ . Чому це мінімум можна побачити з матриці Гессе:  $\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}^2} = 2E_{n \times n} \succ 0$ , де  $E_{n \times n}$  — одинична матриця розміру  $n$ .

## 2 Задача 2

**Умова 2.1.** Дано таблиці розподілу двох незалежних ймовірнісних фінансових операцій  $\xi, \eta$ .

$$\begin{aligned}\Pr[\xi = -1] &= 0.2, & \Pr[\xi = 2] &= 0.8, \\ \Pr[\eta = -1] &= 0.4, & \Pr[\eta = 1] &= 0.6.\end{aligned}$$

Визначити ефективність та ризик суми операцій  $\xi + \eta$ .

**Розв'язання.** Маємо операцію  $\zeta := \xi + \eta$ . Ефективністю операції називають її математичне сподівання, тобто  $\mathbb{E}[\zeta]$ . В силу лінійності математичного сподівання, маємо:

$$\mathbb{E}[\zeta] = \mathbb{E}[\xi] + \mathbb{E}[\eta].$$

Знайдемо математичне сподівання кожної з операцій окремо:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\xi] &= \sum_i \Pr[\xi = x_i]x_i = (-1) \cdot 0.2 + 2 \cdot 0.8 = 1.4, \\ \mathbb{E}[\eta] &= \sum_i \Pr[\eta = y_i]y_i = (-1) \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.6 = 0.2.\end{aligned}$$

Таким чином, **ефективність суми операцій  $\zeta$  дорівнює  $\mathbb{E}[\zeta] = 1.6$** . Розглянемо ризик суми операцій  $\zeta$ . Ризиком операції називають корінь з дисперсії, тобто  $\sigma_\zeta = \sqrt{\text{Var}[\zeta]}$ . Знайдемо дисперсію:

$$\text{Var}[\zeta] = \text{Var}[\xi + \eta] = \text{Var}[\xi] + \text{Var}[\eta] + 2\text{cov}[\xi, \eta].$$

Оскільки операції  $\xi$  та  $\eta$  незалежні, то їхня коваріація дорівнює нулю і тому  $\text{Var}[\zeta] = \text{Var}[\xi] + \text{Var}[\eta]$ . Знайдемо квадрати математичних сподівань:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\xi^2] &= \sum_i \Pr[\xi = x_i]x_i^2 = (-1)^2 \cdot 0.2 + 2^2 \cdot 0.8 = 3.4, \\ \mathbb{E}[\eta^2] &= \sum_i \Pr[\eta = y_i]y_i^2 = (-1)^2 \cdot 0.4 + 1^2 \cdot 0.6 = 1.0\end{aligned}$$

Отже, можемо знайти дисперсії:

$$\begin{aligned}\text{Var}[\xi] &= \mathbb{E}[\xi^2] - \mathbb{E}[\xi]^2 = 3.4 - 1.4^2 = 1.44, \\ \text{Var}[\eta] &= \mathbb{E}[\eta^2] - \mathbb{E}[\eta]^2 = 1.0 - 0.2^2 = 0.96.\end{aligned}$$

Таким чином, **ризик суми дорівнює  $\sigma_\zeta = \sqrt{\text{Var}[\xi] + \text{Var}[\eta]} = \sqrt{2.4} \approx 1.55$** .

**Відповідь.** Ефективність суми операцій  $\zeta$  дорівнює 1.6, ризик — 1.55.

### 3 Задача 3

**Умова 3.1.** Побудувати оптимальний портфель Марковіца максимальної ефективності та одиничного ризику ( $\sigma_R := 1$ ) з двох цінних паперів з ефективностями та ризиками  $\mu_1 = 4$ ,  $\sigma_1 = 1$ ,  $\mu_2 = 6$ ,  $\sigma_2 = 2$ . Коефіцієнт кореляції дохідностей цінних паперів дорівнює  $\rho = 0.5$ .

**Розв'язання.** Маємо вектор ефективності  $\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$ . Побудуємо коваріаційну матрицю  $\Sigma$ . За означенням, якщо цінні папери позначити випадковими величинами  $\xi_1, \xi_2$ , то:

$$\Sigma \triangleq \begin{bmatrix} \text{Var}[\xi_1] & \text{cov}[\xi_1, \xi_2] \\ \text{cov}[\xi_1, \xi_2] & \text{Var}[\xi_2] \end{bmatrix}$$

Знаючи, що  $\text{Var}[\xi_1] = \sigma_1^2$ ,  $\text{Var}[\xi_2] = \sigma_2^2$  та  $\text{cov}[\xi_1, \xi_2] = \rho\sigma_1\sigma_2$ , маємо:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1^2 & 0.5 \cdot 1 \cdot 2 \\ 0.5 \cdot 1 \cdot 2 & 2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Нехай оптимальний портфель Марковіца є  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ . Тоді, задача оптимізації виглядає наступним чином:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} \rightarrow \max, \\ \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} = \sigma_R^2, \\ \mathbf{1}_n^\top \mathbf{x} = 1, \end{cases}$$

Перша умова вимагає максимальності ефективності  $\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x}$ , друга — те, що ризик  $\mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x}$  є одиничним ( $\sigma_R = 1$ ), а третя умова те, що сума ваг портфеля дорівнює одиниці. Запишемо задачу конкретно для нашого випадку (поки в загальному вигляді, не підставляючи конкретні значення):

$$\begin{cases} \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 \rightarrow \max, \\ \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 x_1 x_2 = 1, \\ x_1 + x_2 = 1. \end{cases}$$

Складемо функцію Лагранжа:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda_1, \lambda_2) &= -\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} + \lambda_1(\mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} - \sigma_R^2) + \lambda_2(\mathbf{1}_n^\top \mathbf{x} - 1) \\ &= -\mu_1 x_1 - \mu_2 x_2 + \lambda_1(\sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 x_1 x_2 - \sigma_R^2) + \lambda_2(x_1 + x_2 - 1) \end{aligned}$$

Знайдемо часткові похідні та прирівняємо їх до нуля:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} &= -\mu_1 + 2\lambda_1\sigma_1^2x_1 + 2\rho\sigma_1\sigma_2\lambda_1x_2 + \lambda_2 = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} &= -\mu_2 + 2\lambda_1\sigma_2^2x_2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2\lambda_1x_1 + \lambda_2 = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1} &= \sigma_1^2x_1^2 + \sigma_2^2x_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2x_1x_2 - \sigma_R^2 = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_2} &= x_1 + x_2 - 1 = 0.\end{aligned}$$

Підставимо конкретні значення. Маємо наступну систему рівнянь:

$$\begin{cases} 2\lambda_1x_1 + 2\lambda_1x_2 + \lambda_2 = 4, \\ 8\lambda_1x_2 + 2\lambda_1x_1 + \lambda_2 = 6, \\ x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_1x_2 = 1, \\ x_1 + x_2 = 1. \end{cases}$$

Спочатку розв'яжемо перші два рівняння і останнє відносно  $(x_1, x_2, \lambda_2)$ , а далі підставимо у третє. Отже, з перших рівнянь отримуємо:

$$x_1 = \frac{3\lambda_1 - 1}{3\lambda_1}, \quad x_2 = \frac{1}{3\lambda_1}, \quad \lambda_2 = 4 - 2\lambda_1.$$

Підставляємо у третє:

$$\frac{(3\lambda_1 - 1)^2}{9\lambda_1^2} + \frac{4}{9\lambda_1^2} + \frac{2(3\lambda_1 - 1)}{9\lambda_1^2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{3\lambda_1^2} = 0.$$

Як бачимо, розв'язку рівняння не існує. В такому разі постає питання, який саме портфель Марковіца треба побудувати. Для цього помітимо наступне: для заданої задачі, існує єдиний портфель Марковіца з ризиком  $\sigma_R = 1$ . Дійсно, нехай  $x_1 = \omega$ , тоді  $x_2 = 1 - \omega$ . Підставимо це у умову ризику:

$$\omega^2 + 4(1 - \omega)^2 + 2\omega(1 - \omega) = 1$$

Це спрощується до  $3\omega^2 - 6\omega + 4 = 1$  або  $\omega^2 - 2\omega + 1 = 0$ , звідки  $\omega = 1$ . Таким чином, єдиним можливим портфелем Марковіца з ризиком  $\sigma_R = 1$  є портфель з  $x_1 = 1, x_2 = 0$ .


**Відповідь.** Оптимальний портфель Марковіца з ризиком  $\sigma_R = 1$  має ваги  $x_1 = 1, x_2 = 0$  (весь капітал в першому цінному папері).

## 4 Задача 4

**Умова 4.1.** В моделі Кокса-Роса-Рубінштейна відповідні початкові вартості безризикового і ризикового активу наступні  $B_0 = 1$ ,  $S_0 = 200$ , відсоткова ставка  $r = 0.1$ . Розподіл дохідностей ризикового активу наступний:  $\Pr[\rho_n = -0.5] = \Pr[\rho_n = 0.5] = 0.5$  (позначимо  $a := -0.5$ ,  $b := 0.5$ ). Знайти справедливу вартість  $\hat{f}$  опціону  $f = (S_0 - S_2)^+$ .

**Розв'язання.** Модель Кокса-Роса-Рубінштейна складається з двох фінансових активів:  $B_n = B_0(1+r)^n$  – безризиковий актив та  $S_n = S_0 \prod_{i=1}^n (1 + \rho_i)$  – ризиковий актив, де  $\rho_i$  – дохідність ризикового активу на  $i$ -му кроці. В нашому конкретному випадку  $n = 2$ . Як було показано в теорії, за умови  $r \in (a, b)$ , фінансовий ринок є безарбітражним. Знаходимо мартингальну ймовірність  $\theta = p^*(\rho_n = b) = \frac{r-a}{b-a} = \frac{0.1+0.5}{0.5+0.5} = 0.6$ , відповідно також позначимо  $\bar{\theta} := 1 - \theta = 0.4$ . Побудуємо біноміальне дерево цін:

**Біноміальне дерево для  $S_t$  та  $f = (200 - S_2)^+$**



Згадаємо, що справедлива вартість опціону дорівнює очікуванню його виплати в момент часу  $n = 2$  зваженого за мартингальною ймовірністю:

$$\hat{f} = \mathbb{E}_{p^*} \left[ \frac{f}{(1+r)^2} \right] = \frac{1}{(1+r)^2} \mathbb{E}_{p^*}[f]$$

Знайдемо очікування виплати опціону  $f$ :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{p^*}[f] &= \theta^2 f(S_0(1+b)^2) + 2\theta\bar{\theta} f(S_0(1+a)(1+b)) + \bar{\theta}^2 f(S_0(1+a)^2) \\ &= 0.6^2 \cdot 0 + 2 \cdot 0.6 \cdot 0.4 \cdot 50 + 0.4^2 \cdot 150 = 24 + 24 = 48. \end{aligned}$$

Таким чином, справедлива вартість опціону дорівнює  $\hat{f} = \frac{48}{1.1^2} \approx 39.67$ .

**Відповідь.** Справедлива вартість опціону дорівнює приблизно 39.67.