

Домашня робота з диференціальної геометрії #3

Студента 2 курсу групи МП-21 Захарова Дмитра Олеговича

5 березня 2023 р.

Завдання 2.1.

Умова. Розглянемо наступні параметрично задані криві:

$$\gamma_1 : \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} a \cos t \\ b \sin t \end{bmatrix}$$

$$\gamma_2 : \mathbf{g}(t) = \begin{bmatrix} A \cosh t \\ B \sinh t \end{bmatrix}$$

За яких параметрів $A, B, a, b > 0$ криві перетинаються під кутом $\pi/2$?

Розв'язок. Спочатку знайдемо точки перетину, тобто:

$$\mathbf{f}(t_0) = \mathbf{g}(t_0) \rightarrow \begin{bmatrix} a \cos t_0 = A \cosh t_0 \\ b \sin t_0 = B \sinh t_0 \end{bmatrix}$$

Явно це ми не можемо розв'язати, тому одразу запишемо умову перетину під кутом $\pi/2$. Напрямні вектори у точці t_0 мають вид $\frac{d\mathbf{f}(t_0)}{dt}, \frac{d\mathbf{g}(t_0)}{dt}$. Оскільки кут між ними прямий, то:

$$\left\langle \frac{d\mathbf{f}(t_0)}{dt}, \frac{d\mathbf{g}(t_0)}{dt} \right\rangle = 0$$

Знаходимо вирази для похідних:

$$\frac{d\mathbf{f}}{dt} = \begin{bmatrix} -a \sin t \\ b \cos t \end{bmatrix}, \quad \frac{d\mathbf{g}}{dt} = \begin{bmatrix} A \sinh t \\ B \cosh t \end{bmatrix}$$

Отже:

$$-aA \sin t_0 \sinh t_0 + bB \cos t_0 \cosh t_0 = 0$$

Трохи перепишемо:

$$aA \sin t_0 \sinh t_0 = bB \cos t_0 \cosh t_0 \rightarrow \tan t_0 \tanh t_0 = \frac{bB}{aA}$$

Проте, з умови перетину, якщо поділити одне рівняння на інше:

$$\frac{b}{a} \tan t_0 = \frac{B}{A} \tanh t_0 \rightarrow \tanh t_0 = \frac{bA}{aB} \tan t_0$$

Підставляємо у рівняння вище:

$$\tan^2 t_0 \cdot \frac{bA}{aB} = \frac{bB}{aA} \rightarrow \tan^2 t_0 = \frac{B^2}{A^2} \rightarrow \tan t_0 = \pm \frac{B}{A}$$

А отже можемо знайти і гіперболічний тангенс:

$$\tanh t_0 = \frac{bB}{aA \cdot (\pm B/A)} = \pm \frac{b}{a}$$

Отже бачимо, що повинно виконуватись:

$$\tanh^{-1} \left(\pm \frac{b}{a} \right) = \tan^{-1} \left(\pm \frac{B}{A} \right)$$

Знаки можна прибрати. Отримуємо:

$$\tanh^{-1} \frac{b}{a} = \tan^{-1} \frac{B}{A}$$

Завдання 2.2.

Ця задача є еквівалентною задачі 2.1, оскільки маємо коло та гіперболу, яку параметрично можна задати згідно рівнянням з 2.1. Якщо б її довелось розв'язувати чесно, то потрібно замість умов з 2.1., окрім умов на перетин, записати перпендикулярність градієнтів.

Завдання 2.3.

Умова. Розглянемо наступну параметрично задану криву γ :

$$\gamma : \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} \rho(t) \cos t \\ \rho(t) \sin t \end{bmatrix},$$

де $\rho(t)$ є неперервно диференційованою функцією.

За яких умов на функцію $\rho(t)$ задана крива γ буде регулярною?

Підберіть функцію $\rho(t)$ так, щоб задана крива γ перетиналась з будь-яким променем, що виходить з початку координат O , під одним і тим же кутом α .

Розв'язок.

Питання 1. Крива є регулярною, коли ми не знайдемо жодного $t = t_0$, що $\frac{d\mathbf{f}(t_0)}{dt} = 0$. Знайдемо вираз для похідної:

$$\frac{d\mathbf{f}}{dt} = \frac{d\rho}{dt} \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \end{bmatrix} + \rho(t) \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix}$$

Прирівнюємо до 0:

$$\begin{cases} \dot{\rho}(t_0) \cos t_0 = \rho(t_0) \sin t_0 \\ \dot{\rho}(t_0) \sin t_0 = -\rho(t_0) \cos t_0 \end{cases}$$

Якщо поділити одне рівняння на інше:

$$\frac{\cos t_0}{\sin t_0} = \frac{\sin t_0}{-\cos t_0} \rightarrow \sin^2 t_0 + \cos^2 t_0 = 0$$

Ця умова ніколи не виконується, отже не знайдеться жодної точки t_0 , що може задовольнити умові нерегулярності. Єдине, що ми не розглянули: це випадки якщо $\dot{\rho} = 0$ або $\rho = 0$. Другий випадок відповідає єдиній точці 0, а перший випадок задає коло, що є регулярною кривою.

Питання 2. Будь-який промінь ми можемо задати параметрично як:

$$\ell : \mathbf{g}(t) = \begin{bmatrix} t \cos \beta \\ t \sin \beta \end{bmatrix}$$

де $\mathbf{e} = \begin{bmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{bmatrix}$ є напрямним вектором якогось довільного променя. Отже, знайдемо кут між ℓ та γ . Як ми вже знайшли, похідна нашої функції:

$$\dot{\mathbf{f}} = \begin{bmatrix} \dot{\rho} \cos t - \rho \sin t \\ \dot{\rho} \sin t + \rho \cos t \end{bmatrix}$$

Знайдемо модуль:

$$\|\dot{\mathbf{f}}\|_2 = \sqrt{(\dot{\rho} \cos t - \rho \sin t)^2 + (\dot{\rho} \sin t + \rho \cos t)^2} = \sqrt{\dot{\rho}^2 + \rho^2}$$

Запишемо умову перетину:

$$\mathbf{f}(t_0) = \mathbf{g}(t_0) \rightarrow \begin{cases} \rho(t_0) \cos t_0 = t_0 \cos \beta \\ \rho(t_0) \sin t_0 = t_0 \sin \beta \end{cases}$$

Кут між векторами, що за умовою є α :

$$\cos \alpha = \frac{\langle \dot{\mathbf{f}}, \mathbf{e} \rangle}{\|\dot{\mathbf{f}}\|_2}$$

Залишилось записати лише скалярний добуток:

$$\begin{aligned} \langle \dot{\mathbf{f}}(t_0), \mathbf{e} \rangle &= \cos \beta (\dot{\rho} \cos t - t_0 \sin \beta) + \sin \beta (\dot{\rho} \sin t + t_0 \cos \beta) = \\ &= \dot{\rho}(t_0) (\cos t_0 \cos \beta + \sin \beta \sin t_0) = \dot{\rho}(t_0) \cos(t_0 - \beta) \end{aligned}$$

Окрім цього помітимо, що з умови перетину $\tan \beta = \tan t_0$. Тоді $\beta = t_0 + \pi k$, але оскільки додток $+\pi k$ у подальшому лише змінить знак, то для простоти можна вважати $\beta = t_0$. Тоді:

$$\langle \dot{\mathbf{f}}(t_0), \mathbf{e} \rangle = \dot{\rho}(t_0) \cos 0 = \dot{\rho}(t_0)$$

В такому разі кут:

$$\cos \alpha = \frac{\dot{\rho}(t_0)}{\sqrt{\dot{\rho}^2(t_0) + \rho^2(t_0)}} \rightarrow \dot{\rho}^2 = \frac{\rho^2}{\tan^2 \alpha} \rightarrow \dot{\rho} = \pm \frac{1}{\tan \alpha} \rho$$

Розв'язок цього рівняння:

$$\rho(t) = \rho_0 \exp \left(\pm \frac{t}{\tan \alpha} \right)$$

Завдання 3.1.

Умова. Перевірте, що для параметрично заданої гвинтової лінії γ в \mathbb{R}^3

$$\gamma : \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \\ ht \end{bmatrix}$$

щільнотичні площини в усіх точках кривої нахилені однаково по відношенню до вертикального координатного напрямку x^3 .

Обчисліть величину кута між щільнотичною площиною кривої в довільній точці та координатною віссю x^3 .

Розв'язок. Запишемо рівняння щільнотичної площини:

$$\pi : \mathbf{p}(u, v) = \mathbf{f}(t_0) + \frac{d\mathbf{f}(t_0)}{dt}u + \frac{d^2\mathbf{f}(t_0)}{dt^2}v$$

З нього бачимо, що площина утворена двома векторами:

$$\frac{d\mathbf{f}}{dt}(t_0) = \begin{bmatrix} -\sin t_0 \\ \cos t_0 \\ h \end{bmatrix}, \quad \frac{d^2\mathbf{f}}{dt^2} = \begin{bmatrix} -\cos t_0 \\ -\sin t_0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Знайдемо кут між вектором нормалі та вектором вздовж вісі x^3 , нехай $\mathbf{e} = [0, 0, 1]^\top$. Вектор нормалі:

$$\mathbf{n} = \left[\frac{d\mathbf{f}}{dt} \times \frac{d^2\mathbf{f}}{dt^2} \right] = \begin{bmatrix} h \sin t \\ -h \cos t \\ 1 \end{bmatrix}$$

В такому разі кут між цим вектором та \mathbf{e} :

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{n}, \mathbf{e} \rangle}{\|\mathbf{n}\|_2} = \frac{1}{\sqrt{h^2 + 1}}$$

Отже бачимо, що дійсно кут постійний і незалежить від обраної точки на γ , причому цей кут дорівнює $\arccos \frac{1}{\sqrt{h^2+1}}$.