

# Домашня робота #3 з курсу “Комплексний аналіз” (частина перша)

Студента 3 курсу групи МП-31 Захарова Дмитра

5 грудня 2023 р.

## Завдання 1.

**Умова.** Знайти область збіжності ряду

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{i^n}{(z+4)^n}$$

**Розв’язок.** Маємо геометричну прогресію зі знаменником  $q = \frac{i}{z+4}$ . Геометрична прогресія буде збігатися тоді, коли  $|q| < 1$ , тобто  $\left| \frac{i}{z+4} \right| = \frac{1}{|z+4|} < 1$ . Отже  $|z+4| > 1$ .

## Завдання 2.

**Умова.** Вказати число доданків у головній частині ряду Лорана

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(z-i)^{n-2}}$$

**Розв'язок.** Головна частина ряду Лорана складається з елементів виду  $\gamma_{-n}(z - z_0)^{-n}$  для  $n \in \mathbb{N}$ . Перепишемо ряд у вигляді:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(z-i)^{n-2}} &= \sum_{n=1}^2 \frac{n}{(z-i)^{n-2}} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{n}{(z-i)^{n-2}} \\ &= \underbrace{2 + (z-i)}_{\text{Голоморфна частина}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(z-i)^{-n}}_{\text{Головна частина}} \end{aligned}$$

Як бачимо, головна частина складається з нескінченної кількості елементів.

### Завдання 3.

**Умова.** Вказати число доданків у голоморфній частині ряду Лорана

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{-n-3}}{n!},$$

вважаючи, що ряд розглянуто в околі нескінченності.

**Розв'язок.** Робимо заміну  $w = \frac{1}{z}$ . Тоді розглядання ряду аналогічно розглядання наступного ряду в околі нуля:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot w^{n+3}$$

Тут весь ряд є голоморфним, отже число доданків у голоморфній частині безліч.

### Завдання 6.

**Умова.** Розкласти в ряд Лорана в області  $|z| > 3$  функцію

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 5z + 6}$$

**Розв’язок.** Розкладемо  $f(z)$  на прості дробі:

$$f(z) = \frac{1}{z^2 - 5z + 6} = \frac{1}{(z-2)(z-3)} = \frac{\alpha}{z-2} + \frac{\beta}{z-3}$$

З останньої рівності  $(\alpha + \beta)z - (3\alpha + 2\beta) \equiv 1$ . Отже:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ 3\alpha + 2\beta = -1 \end{cases} \implies (\alpha, \beta) = (-1, 1)$$

Таким чином:

$$f(z) = \frac{1}{z-3} - \frac{1}{z-2}$$

Розглянемо розкладання у ряд Лорана наступної функції:

$$g(z; \theta) = \frac{1}{z - \theta}$$

Для цього перепишемо її у вигляді

$$g(z; \theta) = \frac{1}{z(1 - \frac{\theta}{z})} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\theta}{z}\right)^n, \quad |z| > |\theta|$$

Отже:

$$\begin{aligned} f(z) &= g(z; 3) - g(z; 2) = \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{1}{z} \cdot \left(\frac{3}{z}\right)^n - \frac{1}{z} \cdot \left(\frac{2}{z}\right)^n \right\} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{3^n}{z^{n+1}} - \frac{2^n}{z^{n+1}} \right\} = \boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{z^{n+1}}, \quad |z| > 3} \end{aligned}$$

## Завдання 9.

**Умова.** Вказати область, у якій ряд Лорана функції  $f(z) = \frac{e^z}{z-2}$  буде збігатися з рядом Тейлора.

**Розв’язок.** Розглянемо два випадки.

**Випадок 1.**  $|z| > 2$ . Тоді:

$$f(z) = \frac{e^z}{z-2} = \frac{e^z}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = \frac{e^z}{z} = \frac{e^z}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^n} = \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}} \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \right)$$

Ми не можемо знайти явний вид у формі  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \gamma_n z^n$ , проте можемо сказати, чи буде ряд Лорана збігатися з рядом Тейлора. Ряд Лорана є рядом Тейлора тоді і тільки тоді, коли  $\gamma_{-n} = 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$ .

У такому добутку існує безліч елементів виду  $\gamma_{-n} z^{-n}$  для  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\gamma_{-n} \neq 0$ . Дійсно, візьмемо коефіцієнт при  $z^{-1}$ . В такому разі:

$$\gamma_{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} = e^2 \neq 0$$

**Випадок 2.**  $|z| < 2$ . Тоді:

$$f(z) = -\frac{e^z}{2(1-\frac{z}{2})} = -\frac{e^z}{2} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{2^k} = -\frac{1}{2} \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \right) \cdot \left( \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{2^k} \right)$$

Як бачимо, у такого добутку немає доданків виду  $\gamma_{-n} z^{-n}$  для  $n \in \mathbb{N}$ . Отже, цей ряд повністю збігається з рядом Тейлора.

Остаточна відповідь –  $\boxed{|z| < 2}$