

Kromatično število Kneserjevih grafov

Seminar

Žan Hafner Petrovski
Fakulteta za matematiko in fiziko
Oddelek za matematiko

12. maj 2017

1 Uvod

V teoriji grafov poznamo mnogo različnih tipov grafov. Razlikujemo jih glede na njihove specifične lastnosti. V tem seminarju se bomo ukvarjali s *Kneserjevimi grafi* oziroma podrobneje, s *kromatičnim številom* le-teh. Najprej podajmo nekaj glavnih definicij.

Definicija 1 Graf $K(n, k)$, $n \geq k \geq 1$ in $n, k \in \mathbb{N}$, imenujemo **Kneserjev**, če je množica vozlišč $V(n, k)$ družina vseh k -elementnih podmnožic množice $\{1, 2, \dots, n\}$. Dve vozlišči sta povezani natanko takrat, ko sta disjunktni.

Povejmo še, da za število vozlišč velja $|V(n, k)| = \binom{n}{k}$. V primeru, ko je $n < 2k$, imata vsaki dve k -elementni množici neprazen presek. Tak Kneserjev graf nima nobenih povezav, zato privzemimo, da velja $n \geq 2k$.

Definicija 2 Preslikavo $c : V \rightarrow \{1, \dots, m\}$, ki slika vozlišča grafa v množico barv, imenujemo **barvanje vozlišč grafa**. Barvanje vozlišč je pravilno, če sta vsaki dve sosednji vozlišči pobarvani z različnima barvama.


Definicija 3 Najmanjše število m , za katero obstaja pravilno barvanje vozlišč grafa G z m barvami, imenujemo **kromatično število**. Označimo ga s $\chi(G)$.

Kromatično število grafa G je torej najmanjše število barv, s katerimi lahko pobarvamo vozlišča grafa tako, da nobeni dve sosednji vozlišči nista iste barve. Množico vozlišč V bi radi predstavili kot disjunktno unijo barvnih razredov $V = V_1 \sqcup V_2 \sqcup \dots \sqcup V_{\chi(G)}$, teh pa želimo, da je najmanj.


Za vsak barvni razred velja, da imajo vsi njegovi elementi, torej k -elementne množice, neprazen presek. To sledi iz definicije Kneserjevih grafov, če bi imele te množice prazen presek, to je, obstajali bi vsaj dve disjunktni, med katerima bi obstajala povezava, zato pa bi bili pobarvani z različno barvo.

Vozlišča Kneserjevega grafa $K(n, k)$ bomo razdelili na disjunktno množico $V = V_1 \sqcup V_2 \sqcup \dots \sqcup V_{\chi(K(n, k))}$, kjer bo vsak V_i družina k -elementnih množic z nepraznim presekom. Ker smo predpostavili, da je $n \geq 2k$, poenostavimo zapis in pišimo $n = 2k + d$, $k \geq 1$, $d \geq 0$.

Zgled 1 Kneserjev graf $K(5, 2)$ je zelo znan primer, imenujemo ga Peterse-
nov graf.



Slika 1: Primer barvanja tega
grafa z $d + 2$, torej 3 barvami



Slika 2: Prikaz povezav med dis-
junktnimi množicami

Da dobimo idejo, s koliko barvami zanesljivo lahko pobarvamo Kneserjev
graf, si oglejmo naslednjo trditev.

Trditev 1 Vozlišča Kneserjevega grafa $K(2k + d, k)$ lahko pobarvamo z $d + 2$
barvami.

Dokaz: Zapišimo preprost predpis za barvanje grafa $K(2k + d, k)$, pri katerem
uporabimo $d + 2$ barv. Za števila i iz $\{1, 2, \dots, d + 1\}$ naj množica V_i sestoji
iz vseh k -elementnih množic, ki imajo i za najmanjši element. Preostale
 k -elementne množice so vsebovane v množici $\{d + 2, d + 3, \dots, 2k + d\}$, katere
moč je le $2k - 1$. Sledi, da imajo te množice neprazen presek in lahko zanje
uporabimo barvo $d + 2$. \square

Tako smo dobili $\chi(K(2k + d, k)) \leq d + 2$. Kneser je postavil domnevo, da je
 $d + 2$ kar najmanjše možno število barv, torej kromatično število Kneserjevega
grafa $K(2k + d, k)$ je $d + 2$.

2 Kneserjeva domneva

Cilj tega seminarja je dokazati naslednji izrek:

Izrek 1 (Kneser) *Za kromatično število Kneserjevega grafa velja*

$$\chi(K(2k + d, k)) = d + 2.$$

Preformulirajmo ta izrek v obliko problema obstoja na sledeč način:

Izrek 2 (Ekvivalenten Kneserjevemu izreku) *Če družino k -elementnih podmnožic množice $\{1, 2, \dots, 2k + d\}$ razdelimo na $d + 1$ razredov, $V = V_1 \sqcup V_2 \sqcup \dots \sqcup V_{d+1}$, potem obstaja i tako, da V_i vsebuje par disjunktnih k -elementnih množic A in B .*

Tako smo prišli do splošnejše različice izreka. Ta nam, še preden se poglobimo v sam dokaz, nudi drugačen pogled na zastavljen problem, saj ne omenja grafov. Želimo le pokazati obstoj množic A in B . László Lovász je uvidel, da bistvo problema tiči v slavnem izreku o d -dimenzionalni enotski sferi S^d v \mathbb{R}^{d+1} , $S^d = \{x \in \mathbb{R} : |x| = 1\}$. Zapišimo še ta izrek.

Izrek 3 (Borsuk-Ulam) *Za vsako zvezno preslikavo $f : S^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ d -sfere v d -prostor, obstajata antipodni točki x^* in $-x^*$, ki ju f slika v isto točko, torej $f(x^*) = f(-x^*)$.*

Dokaz tega izreka lahko bralec najde v knjigi "Using the Borsuk-Ulam theorem" matematika Jirija Matouška, mi pa se bomo posvetili njegovi uporabi pri dokazu izreka Lyusternika in Shnirel'mana.


Izrek 4 (Lyusternik-Shnirel'man) *Če je d -sfera S^d pokrita z $d + 1$ množicami,*

$$S^d = U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_d \cup U_{d+1},$$

tako, da je vsaka izmed prvih d množic U_1, U_2, \dots, U_d bodisi odprta bodisi zaprta, potem ena izmed $d + 1$ množic vsebuje par antipodnih točk x^ in $-x^*$.*

Za dokaz Kneserjeve domneve potrebujemo le primer, ko so U_1, \dots, U_d odprte, vseeno pa je naveden splošnejši izrek, ki od množic zahteva le odprtost ali pa zaprtost. Iz dokaza je razvidno, da odprtost in zaprtost uporabimo vsakič le za posamezno množico.

Zgled 2 Za občutek si oglejmo sfero S^1 pokrito z $d+1$, torej z 2 množicama. Množica A , ki je na sliki narisana z zvezno krivuljo, je odprta, B , ki je narisana črtkano, pa poljubna taka, da velja $A \cup B = S^1$. V tem primeru je očitno, da B vsebuje antipodni točki.



Slika 3: Sfera S^1

Dokaz s protislovjem in uporabo Borsuk-Ulamovega izreka:

Naj bo pokritje $S^d = U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_d \cup U_{d+1}$ dano, kot je zapisano v izreku. Predpostavimo, da noben izmed U_i ne vsebuje dveh antipodnih točk.

Definirajmo preslikavo $f : S^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ na sledeč način:

$$f(x) := (d(x, U_1), d(x, U_2), \dots, d(x, U_d)).$$

Tu $d(x, U_i)$ označuje razdaljo med točko x in množico U_i . Ker je to zvezna funkcija na x , je tudi f zvezna. Torej lahko uporabimo Borsuk-Ulamov izrek, ki nam pove, da na domeni f , torej na S^d , obstajata antipodni točki x^* in $-x^*$ z lastnostjo $f(x^*) = f(-x^*)$. Ker po predpostavki z začetka dokaza U_{d+1} ne vsebuje antipodnih točk, sklepamo, da je vsaj en izmed x^* in $-x^*$ vsebovan v eni izmed množic U_i , recimo v U_k za $k \leq d$. Brez škode za splošnost lahko privzamemo, da je to x^* , torej $x^* \in U_k$. To pomeni, da je $d(x^*, U_k) = 0$, ključno pa je, da je zaradi lastnosti $f(x^*) = f(-x^*)$ tudi $d(-x^*, U_k) = 0$.

Obravnavajmo najprej primer, ko je U_k zaprt. Potem iz $d(-x^*, U_k) = 0$ sledi, da je $-x^* \in U_k$, kar pa je protislovje s predpostavko, da noben izmed U_i ne vsebuje para antipodnih točk.


Če je U_k odprt, potem iz $d(-x^*, U_k) = 0$ sledi, da $-x^*$ leži v zaprtju U_k , torej v $\overline{U_k}$. Ta množica pa je vsebovana v $S^d \setminus (-U_k)$, $-U_k = \{-x; x \in U_k\}$. Množica $S^d \setminus (-U_k)$ je namreč zaprta in vsebuje U_k , pri tem smo upoštevali predpostavko, da U_k ne vsebuje antipodnih točk. Ampak, ker je zaprta in vsebuje U_k , vsebuje tudi $\overline{U_k}$. To pomeni, da $-x^*$ leži v $S^d \setminus (-U_k)$, torej ne more ležati v $-U_k$. Ker pa smo privzeli, da $x^* \in U_k$, smo prišli do protislovja. \square

V svojem dokazu iz leta 1978 je Imre Bárány uporabil še Galeov izrek o obstoju določene postavitve točk na sfero S^d . Bárány je svoj dokaz objavil nekaj tednov za tem, ko je László Lovász prvi dokazal Kneserjevo domnevo s pomočjo Borsuk-Ulamovega dokaza.

Izrek 5 (Gale) *Za vsak $d \geq 0$ in vsak $d \geq 1$ obstaja taka postavitve $2k + d$ točk na d -dimenzionalno sfero S^d , da vsaka odprta polsfera vsebuje vsaj k izmed teh točk.*

Tudi dokaz tega izreka lahko bralec najde v Matouškovi knjigi "Using the Borsuk-Ulam theorem". Dokaz ni tako preprost, zato je še večjega pomena Greenova poenostavitev Bárányjevega dokaza. Leta 2002 je Joshua Greene namreč ugotovil, da zadošča, če so točke iz izreka v splošni legi na sferi. Tu je zapisan njegov dokaz.

Definicija 4 *Točke iz množice $\{1, 2, \dots, 2k + d\}$ so v **splošni legi** na sferi S^{d+1} , če nobenih $d + 2$ točk iz omenjene množice ne leži na hiperravnini skozi središče sfere.*




Slika 4: Primer za $d = 0$, postavitve 4 točk sfere S^1

Dokaz Kneserjeve domneve:

Vzemimo množico $2k + d$ točk v splošni legi na sferi S^{d+1} . Naj bo $V(n, k)$ množica vseh k -elementnih podmnožic začetne množice, razdelimo jo na $d + 1$ razredov, $V(n, k) = V_1 \sqcup V_2 \sqcup \dots \sqcup V_{d+1}$. Naš cilj je najti par disjunktnih k -elementnih množic A in B , ki pripadata istemu razredu V_i .

Za $i = 1, 2, \dots, d + 1$ definirajmo

$$O_i = \{x \in S^{d+1}; \text{odprta polsfera } H_x \text{ z vrhom } x \\ \text{vsebuje } k\text{-elementno množico iz } V_i\}.$$



Vsaka množica O_i je odprta. Za vsak $x \in O_i$ namreč obstaja neka odprta okolica, za vsak element y iz te okolice pa še vedno velja, da polsfera, katere vrh je y , vsebuje istih k -elementov kot polsfera, katere vrh je x . To sledi iz dejstva, da smo v definiciji množic O_i uporabili *odprte* polsfere.

Odprte množice O_i in zaprta množica $C = S^{d+1} \setminus (O_1 \cup \dots \cup O_{d+1})$ tvorijo pokritje S^{d+1} . To pokritje zadošča pogoju iz izreka Lyusternik-Shnirel'mana, zato vemo, da ena izmed množic iz omenjenega pokritja vsebuje antipodni točki x^* in $-x^*$.

To ne more biti množica C , saj po definiciji polsferi H_{x^*} in H_{-x^*} , ko velja $x^*, -x^* \in C$, vsebujeta manj kot k točk. To je res, saj unija množic O_i vsebuje vse vrhove polsfer, ki vsebujejo k -elementne podmnožice začetne množice, C pa je komplement te unije. Sledi, da vsaj $d + 2$ točki ležita na ekvatorju $\overline{H_{x^*}} \cap \overline{H_{-x^*}}$, torej na hiperravnini skozi središče sfere. To pa ne more biti res, saj so točke v splošni legi.

Zato ena izmed množic O_i vsebuje antipodni točki x^* in $-x^*$. Po definiciji množic O_i obstajata k -elementni množici $A, B \in V_i$ z lastnostjo $A \subseteq H_{x^*}$ in $B \subseteq H_{-x^*}$.

Ker pa govorimo o *odprtih* polsferah, sta H_{x^*} in H_{-x^*} disjunktni. Sledi, da sta tudi A in B disjunktni. Našli smo torej disjunktni k -elementni množici, ki pripadata istemu razredu množic V_i . \square

Angleško-slovenski slovar strokovnih izrazov

Kneser graph Kneserjev graf
graph coloring barvanje grafa
chromatic number kromatično število
unit sphere enostka sfera
antipodal points antipodni točki
covering pokritje
general position splošna lega
hemisphere polsfera
hyperplane hiperravnina
equator ekvator

Literatura

- [1] M. Aigner in G. M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK*, 4. izdaja, Springer, Berlin–Heidelberg–New York, 2010.
- [2] J. Matoušek, *Using the Borsuk-Ulam theorem*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003.