1. Con el propósito de llegar a conclusiones más favorables en un estudio, el investigador a cargo de la edición y análisis de los datos suprimió casos, modificó medidas y alteró parámetros estadísticos. ¿Qué falta ética a la publicación científica cometió?
   A. Autoría fantasma
   B. Fraude científico
   C. Publicación redundante
   D. Conflicto de intereses

2. Varón de 50 años, tiene a su familia enferma y necesita un trabajo, quechua hablante, consigue un trabajo en una fábrica; por su aspecto y dificultad para comunicarse le indican actividades menores y con baja remuneración. Según las políticas de salud. ¿Qué tipo de análisis se aplica para determinar su inequidad?
   A. Situacional
   B. Económico
   C. Regional
   D. Demográfico

3. En un estudio de casos y controles en niños con catarata, con madres expuestas o no a la rubeola durante el embarazo, se prevee que la exposición a rubeola está relacionada con la enfermedad. Por lo tanto la tasa de ..... de antecedentes de exposición será mayor.
   A. latencia
   B. cohortes
   C. casos
   D. prevalencia

4. Gestante de 35 años; EG: 28 semanas; acude al PS 1-3, quedó satisfecha con la comunicación, empatía, asertividad del profesional serumista que permitió tomar decisiones basadas en guías de práctica clínica, con la máxima evidencia científica, para manejo y seguimiento de su caso, atendiendo a su contexto particular y sus prioridades. Esta cualidad hace referencia al principio de:
   A. Equidad
   B. Universalidad
   C. Calidad
   D. Solidaridad

5. Debe recomendarse suplementación con ácido fólico a toda mujer que desee embarazarse al menos 1 mes antes de la concepción en pacientes de bajo riesgo y 3 meses en las de alto riesgo de malformaciones, y luego durante las 12 primeras semanas de embarazo. La dosis recomendada de ácido fólico (mg/dia) en población general es ..... y de alto riesgo de malformaciones es ...
   A. 0.4 / 0.8
   B. 0.5 / 6
   C. 0.4 / 1
   D. 0.4 / 4

6. En un EESS, un personal de salud ha sido diagnosticado con TB; por tanto, tiene derecho a una licencia ...
   A. con goce de remuneraciones.
   B. sin goce de remuneraciones.
   C. a cuenta de periodo vacacional.
   D. las fechas de su cita médica.

7. En un colegio de una comunidad campesina se reporta un brote de rubeola; como parte de su confirmación se recolecta información de los niños afectados y definir el caso; encontrándose signos y síntomas compatibles con la enfermedad, con evidencia epidemiológica definitiva de laboratorio de contacto. ¿A qué tipo de caso se refiere?
   A. Sospechoso
   B. Probable
   C. Índice
   D. Compatible

8. Obstetra serumista detecta factores de riesgo en gestante a término de la comunidad “Chopcca”, que pone en peligro la vida del producto. El profesional indica su traslado, pero no cuenta con un lugar para albergar a la paciente. ¿Cuál de las dimensiones del enfoque intercultural se ha vulnerado?
   A. Comunicación y trato en los servicios de salud
   B. Referencia y contrarreferencia
   C. Infraestructura de los servicios de salud
   D. Consentimiento informado del parto

9. En un EESS el equipo de farmacovigilancia identificó una RAM (reacción adversa al medicamento), para ello aplica el método de estudio más común, que se basa en la identificación de las sospechas de RAM por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria y el envío al organismo central. ¿Cuál es el método aplicado?
   A. Sistema de farmacovigilancia intensiva
   B. Sistema de notificaciones espontáneas
   C. Estudios epidemiológicos de casos y control
   D. Estudios centrados en el medicamento

10. Mujer 22 años, puérpera inmediata de parto domiciliario hace 1 horas acude a establecimiento I-2 por sangrado vaginal profuso. Examen: FC: 112X'; FR:24X'; T°:36.5°C; PA: 80/40 mmHg. Examen Físico: letárgica, palidez de piel y mucosas, llenado capilar >2 segundos. Útero aumentado de tamaño que no se contrae, sangrado vaginal abundante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y medida a seguir antes de la referencia?
A. Retención placentaria/ extracción.
B. Lesión en canal / taponear con gasas.
C. Atonía uterina / activar clave roja.
D. CID / ácido tranexámico

11. En un EESS un paciente reingresa por el mismo diagnóstico de hace tres días y genera una queja porque no encuentra mejoría a sus molestias. Por tanto, el jefe del este establecimiento indica que debe iniciarse una ..... y comunicarlo a la instancia superior.
A. sanción administrativa
B. investigación inmediata
C. auditoria de caso
D. auditoría externa

12. En el adolescente, el alcanzar el desarrollo físico, maduración mental, desarrollo emocional y desarrollo social, es un objetivo de:
A. Componente de salud
B. Promoción de la salud
C. Rehabilitación en salud
D. Cuidado integral por curso de vida

13. En un centro de salud, la técnica de enfermería se acerca al personal obstetra y le pide mantener en secreto su resultado positivo para VIH que se realizó; a la semana, la noticia se difundió provocando daño emocional a la técnica. ¿A qué principio del código ética y deontología faltó el profesional?
A. Responsabilidad
B. Confidencialidad
C. Solidaridad
D. Claridad

14. Gestante de 25 años; EG 21 semanas es llevada a establecimiento de salud I-4 por ingerir órganos fosforados (plaguicida), este hecho podría considerarse como...
A. depresión perinatal.
B. crisis de salud mental.
C. conducta autolesiva.
D. emergencia psiquiátrica.

15. Mujer de 24 años, acude a un establecimiento de salud presentando náuseas y vómitos, la obstetra del establecimiento está a unos minutos de su horario de salida y decide atenderla sin registrar la atención. ¿Qué proceso técnico administrativo de la historia clínica se ve vulnerado?
A. Conservación
B. Confidencialidad y acceso
C. Apertura
D. Organización y manejo del archivo

16. En el informe final de investigación debe explicarse el objeto de estudio, a través de la definición y conceptualización de sus variables, incluyendo criterios de los investigadores que se debe asumir con una determinada posición de manera esquemática. Esta parte del informe corresponde a:
A. Marco teórico y conceptual
B. Resultados y discusión
C. Objetivos general y específicos
D. Materiales y métodos

17. El enfoque de investigación ..... se utiliza en procesos que por naturaleza son medibles, en el cual se obtienen resultados de frecuencia, medición y parámetros de las conclusiones de una población.
A. inferencial
B. cualitativo
C. cuantitativo
D. referencial

18. Al C.S. de Yauyos acude una gestante con diagnóstico de sífilis a la que le falta cuatro semanas para el parto. El tratamiento completo y adecuado para la prevención de sífilis congénita es con Penicilina G Benzatínica vía IM, debe administrarse una vez por semana, durante tres semanas consecutivas. ¿Cuál es la dosis recomendada?
A. 3.4 millones UI
B. 2.5 millones UI
C. 2.4 millones UI
D. 1.2 millones UI

19. Una comunidad solicita que la partera tradicional participe en la atención institucional del parto. ¿Cuál sería la mejor decisión que tomaría el personal de salud?
A. Permitirle su participación en la atención del parto
B. Integrarla como facilitadora respetando al equipo
C. Derivar el parto al domicilio de la paciente
D. Referir a la paciente para evitar conflictos

20. Los medicamentos ..... son aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país que han demostrado ser seguros, eficaces y costo-efectivos.
A. analgésicos
B. antibióticos
C. esenciales
D. antiinflamatorios

21. La ..... implica que un cambio en una variable es responsable, directa o indirectamente, de un cambio observado en otra variable.
A. relación
B. causalidad
C. exposición
D. asociación

22. Mujer de 55 años, nulípara, IMC 32, acude al establecimiento I-2 para tamizaje por examen clínico para cáncer de mama, nunca se ha realizado un chequeo. ¿Qué indica en este caso luego de la evaluación?
A. Referencia para mamografía
B. Dieta, ejercicio y autoexamen
C. Referencia para resonancia
D. Examen clínico en 2 años

23. El EESS desarrolla acciones de evaluación y mejora continua de la calidad de atención a adolescentes. La población adolescente está satisfecha con la atención y cuidados recibidos. ¿A qué tipo de proceso de evaluación pertenece?
A. Gestión de la calidad
B. Empoderamiento y seguridad del adolescente
C. Atención de las necesidades de salud
D. Gestión del talento humano

24. La investigación en salud se ha definido como la generación de conocimientos nuevos mediante la aplicación del ..... , a fin de identificar y hacer frente a los problemas de salud, de tal manera que no solo se limita al campo biomédico.
A. método científico
B. análisis poblacional
C. método estadístico
D. análisis epidemiológico

25. La enfermera ingresa al turno y evidencia que su recipiente de punzocortantes está lleno, evidenciando riesgo de bioseguridad para todo el personal que labora en su unidad; por lo que solicita al personal técnico desechar y cambiar el recipiente por uno nuevo. Este aduce que no es necesario porque todavía falta llenar. Según las especificaciones para el cambio. ¿Cuál es el volumen máximo permitido?
A. Un tercio
B. 3/4 partes
C. Mitad
D. Lleno total

26. Representa la organización racional de todas las acciones y condiciones dirigidas a proteger a la colectividad de los factores de riesgo, a mejorar su convivencia y calidad de vida, que garanticen el bienestar físico, psicológico y social, básico para la vida de la persona desde el momento de la concepción hasta la muerte. Hace referencia a salud...
A. colectiva.
B. social.
C. pública.
D. comunitaria.

27. ¿Cuál es una estrategia esencial para garantizar la justicia, protección y bienestar para las mujeres que sufren violencia, en el cual el equipo de salud enlaza con los representantes de los diferentes sectores en conjunto con los Centros Emergencia Mujer y los establecimientos de salud?
A. Promoción de la salud mental
B. Atención en salud mental comunitaria
C. Abordaje multisectorial
D. Articulación con acceso a justicia

28. Es un instrumento de gestión que define la estrategia del pliego del sector público para lograr sus objetivos en un periodo de cinco (5) años, a través de intervenciones diseñadas para producir bienes, servicios y productos:
A. Pliego presupuestario institucional
B. Plan operativo institucional
C. Plan sectorial multianual
D. Plan estratégico institucional

29. En nuestro país estamos en el proceso del predominio de enfermedades infecciosas a la preponderancia de enfermedades crónicas, por diferentes causas; así mismo hay enfermedades erradicadas, otras reemergentes y nuevas. Este proceso hace referencia a:
A. Evolución demográfica
B. Cambios en antigenicidad
C. Transición demográfica
D. Transición epidemiológica

30. En una comunidad, se produjo volcadura de camión que trasladaba insumos médicos, que incluía 1000 termómetros de mercurio. El personal de salud se apresura a prestar apoyo y tiene contacto con el metal. ¿Cuál es la acción inmediata que realiza el médico serumista?
A. Elaborar el plan de acción regional
B. Determinar factores de riesgo ambiental
C. Lavado de manos al personal expuesto
D. Notificación epidemiológica

31. Durante la redacción del artículo científico el investigador usó inteligencia artificial generativa para la sección de discusión; sin embargo, omitió verificar la correspondencia de las citas y no dio el debido crédito a las fuentes. ¿Qué falta contra la conducta responsable en investigación ha cometido?
A. Fabricación
B. Plagio
C. Cuestionable
D. Falsificación

32. En una comunidad altoandina, se presentan varios casos de rubéola; una gestante de 7 semanas expuesta, acude al establecimiento de salud sin síntomas. Según la historia natural de la enfermedad. ¿En qué momento del proceso se encuentra?
A. Inducción
B. Subclínico
C. Clínico
D. Resolutivo

33. En el establecimiento de salud asignado necesitamos construir su razón de ser tomando como insumo la información analizada de la situación actual de éste, contribuyendo así a la política nacional. A esto se le denomina ..... institucional.
A. categorización
B. misión
C. gestión
D. visión

34. Si calculamos el cociente entre el número de muertes en un periodo dado entre la población promedio en dicho periodo. Hacemos referencia a una:
A. Mediana
B. Proporción
C. Media
D. Tasa

35. Cuando el servidor público no ejerce presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. Este accionar corresponde a:
A. Un principio de respeto y equidad
B. Un principio y deber
C. Una responsabilidad y deber
D. Una prohibición ética

36. Gestante 19 años; EG:39 semanas; ingresa al establecimiento I-4 en trabajo de parto, se le informa sobre el acompañamiento en el parto y la posición que desee adoptar para el mismo, indicándole los beneficios de ambas intervenciones para su decisión informada. Este modelo de participación de las personas en el cuidado de su salud, hace referencia a:
A. Elegir en solitario la acción terapéutica
B. Consentir la intervención propuesta
C. Toma de decisiones compartida
D. Imposición de la alternativa consultada

37. ¿Cuál es el servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población?
A. Teleorientación
B. Telesalud
C. Teletriaje
D. Telemonitoreo

38. Se encuentra realizando su Serums en la Sierra peruana, es llamada por la partera de la jurisdicción para constatar el nacimiento de un niño. ¿Según el código de ética y deontología del COP que le correspondería hacer?
A. Emitir y entregar certificado de nacimiento.
B. Registrar el acto obstétrico.
C. Confeccionar el certificado obstétrico.
D. Proporcionar constancia de nacimiento.

39. Las enfermedades crónicas no trasmisibles causan muerte y discapacidad, siendo la HTA un factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular y cardíaca isquémica, pudiéndose prevenir mediante la reducción de factores de riesgo modificables como:
A. Antecedente familiar de HTA
B. Edad mayor de 55 en varones y 65 en mujeres
C. Inactividad física
D. Sexo masculino

40. El plan multisectorial de lucha contra la anemia plantea la articulación ..... de intervenciones efectivas a cargo de los sectores de salud, educación, vivienda, agricultura, producción, cultura y transporte, en el marco de sus funciones y competencias.
A. intercultural
B. institucional
C. internacional
D. intersectorial

41. La problemática nutricional de nuestro país no solo está enmarcada en la prevalencia de anemia y desnutrición crónica, sino también por patrones de alimentación inadecuados; por ello en los EESS el nutricionista debe realizar sesiones demostrativas de preparaciones de alimentos para población gestante y niños/niñas menores de 2 años en coordinación con los responsables de materno infantil. ¿Qué requisito se debe tener en cuenta para esta sesión demostrativa?
A. Realizarlo mientras el padre espera la evaluación de CRED de su niño
B. Realizarlo mientras la gestante espera su control prenatal
C. La sesión debe ser convocada con 6 a 10 gestantes como máximo
D. La sesión con padres se debe hacerse con un mínimo de 11 participantes

42. El modelo de la Red Integrada de Salud (RIS) tiene 4 dimensiones para su funcionamiento. ¿A qué dimensión corresponde el atributo del primer nivel de atención en salud como puerta de entrada al sistema nacional de salud?
A. Prestación
B. Gestión
C. Gobernanza
D. Financiamiento

43. Mujer de 31 años acude a establecimiento I-2 para tamizaje de cáncer de cuello uterino, tiene un resultado negativo del año anterior con prueba molecular para PVH ¿Cada cuánto años se realiza el nuevo tamizaje en este caso?
A. 2
B. 5
C. 4
D. 3

44. En un EESS, el personal responsable de salud ambiental realiza supervisión inopinada a las áreas asistenciales; evaluando de manera especial la correcta segregación de residuos sólidos. Se identifica la presencia de tres contenedores medianos con bolsa de color rojo, amarillo y negro; según el orden mencionado. ¿Qué residuos descarta en cada contenedor?
A. Biocontaminados - especiales - comunes
B. Químicos - hemoderivados - corrosivos
C. Hemoderivados - comunes - especiales
D. Radioactivos - farmacéuticos - alimentos

45. Al terminar la investigación en la comunidad Shipibo que se ubican en Lima sobre "Factores de riesgo asociados a la anemia infantil", se debe presentar el informe final siguiendo un esquema ordenado: Introducción, materiales y métodos, resultados, ..., conclusiones y referencias bibliográficas.
A. anexos
B. recomendaciones
C. discusión
D. objetivos

46. Obstetra serumista de I nivel de atención, recibe paciente con factores de riesgo, a la que evalúa y determina situación transversa del producto con fase latente del trabajo de parto. ¿Cuál es la mejor decisión que toma ante este caso?
A. Permitir el progreso del parto
B. Derivarla a su domicilio
C. Estabilizar y referir a paciente
D. Albergarla en la casa de espera

47. Primigesta 36 años; 29 semanas; acude a su primer control prenatal, deberá iniciar inmediatamente su esquema de vacunación para la inmunización pasiva contra la tos ferina. ¿Qué vacuna se indicaría?
A. AMA
B. HVA
C. VRS
D. Tdap

48. Se necesita realizar un estudio descriptivo en la comunidad de Tornameza-Huarochirí, para conocer las características de la población que acude a nuestro establecimiento de salud. ¿Cuál de las siguientes investigaciones cumple las características de un estudio descriptivo?
A. Efectos de un temblor según el tipo de vivienda en la población estudio
B. Aspectos y características de las viviendas de la población estudio
C. Relación del tipo de vivienda con los ingresos mensuales por familia de la población estudio
D. Efectos del tipo de vivienda en la morbilidad familiar de la población estudio

49. Es la probabilidad de producir efectos nocivos para el individuo, ocasionadas por animales o plantas en un desastre natural, desequilibrando el proceso salud-enfermedad. ¿A qué tipo de riesgo se refiere?
A. Social
C. Biológico
B. Epidémico
D. Ambiental

50. En un estudio de investigación donde deseamos comparar las medias de los valores de hemoglobina de dos grupos de niños en diferentes departamentos del Perú. ¿Qué prueba estadística se aplica para determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de estos dos grupos?
A. ANOVA
C. Rho de Spearman
B. Chi cuadrado
D. Prueba t de Student

51. El diseño ..... se basa en un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad.
A. preexperimental
C. experimental
B. descriptivo
D. correlacional

52. El jefe de una zona sanitaria, en reunión con sus coordinadores de estrategias y el comité multisectorial, definen las condiciones futuras que esperan lograr, enunciados claros y precisos de los resultados en salud que se esperan obtener. Esto es un ejemplo de:
A. Manual de operaciones
C. Análisis estratégicos
B. Análisis situacional
D. Objetivos estratégicos

53. Gestante 17 años, con EG: 16 semanas acude a su primera visita odontológica en el puesto de salud I-3; para intervenciones y actividades de salud bucal, en su caso presenta gingivitis inducida por placa dental asociada al embarazo. ¿Cuál es la medida a seguir por el profesional?
A. Postergar tratamiento hasta después del parto
C. Promover el autocuidado de su salud oral
B. Prevención de caries y dieta baja en carbohidratos
D. Iniciar el tratamiento inmediatamente

54. La ..... es el estudio de la distribución y determinantes de la enfermedad en la población humana. Es la ciencia básica y práctica fundamental de la salud pública.
A. causalidad
C. epidemiología
B. demografía
D. estadística

55. Una paciente joven presenta hemorragia después de su parto domiciliario atendido inicialmente por partera, quien identifica la gravedad y solicita apoyo al establecimiento de salud. ¿Cuál fue la condición más importante que identificó?
A. Uso de plantas medicinales
C. Edad de la paciente
B. Parto domiciliario
D. Reconocimiento del riesgo

56. Mujer de 66 años, viene al EESS en compañía de familiar, presentando de manera brusca, dificultad para hablar, miastenia, trastorno psicomotor, hemiparesia derecha, parálisis facial derecha, caída de la comisura labial. Es evaluada por médico de turno, quien indica su referencia inmediata. Familiar se opone y no acepta la referencia. Según la gravedad del caso. ¿Qué medida de urgencia debe tomar el médico?
A. Explicar que no perderá su derecho de atención
C. Citarlo para el día siguiente
B. Solicitar la intervención del ministerio público
D. Obligar a que acepte la referencia

57. En un EESS un personal de salud ha denunciado a la dependencia superior la sobrecarga de trabajo, comunicaciones deficientes, programación de turnos poco equitativos que le ha provocado estrés laboral. ¿A qué factor de riesgo de seguridad y salud del trabajo se refiere?
A. Biológico
C. Psicosocial
B. Ergonómico
D. Físico

58. Es la ..... y evaluación integral de la gestante y el feto, antes de las ..... semanas de gestación, para brindar intervenciones que permitan la detección oportuna de signos de alarma, factores de riesgo, la educación oportuna para el autocuidado y la participación de la familia, así como para el manejo adecuado de las ...
A. atención - doce - dificultades.
C. supervisión - diez - circunstancias.
B. revisión - ocho - consecuencias.
D. vigilancia - catorce - complicaciones.

59. En el CS se ha determinado un problema de investigación para lo cual se ha desarrollado un cuestionario estructurado para ser aplicado al estudio de niños con anemia para determinar la cantidad de casos y tipos de anemia. ¿Qué es el cuestionario estructurado?
A. Métodos de confiabilidad
B. Prueba de normalidad
C. Instrumento de recolección de datos
D. Propiedades psicométricas

60. Una gestante solicita mantenerse abrigada durante el trabajo de parto por que considera que el frio dificulta el nacimiento de su bebe. ¿Cuál sería la conducta a seguir por el profesional obstetra?
A. Retirar la ropa para facilitar la monitorización
B. Indicar ingesta restringida de líquidos tibios
C. Prohibir cualquier práctica tradicional
D. Garantizar la temperatura ambiente

61. Mujer de 15 años es llevada a establecimiento I-3 por violación sexual, la intervención clínica busca la prevención y tratamiento de ITS, el resultado negativo de ITS no excluye infección por el período de incubación y la ausencia de síntomas. ¿Cuál la medida a seguir en caso de Gonorrea?
A. PR para VIH - Condones - Profilaxis Antirretroviral
B. Muestra de endocérvix - Gram y cultivo - Ceftriaxona 1 g IM
C. Antígeno de superficie - Vacunación - Completar esquema
D. PR Treponémica - RPR cuantitativo - PNC benzatínica

62. Personal de salud, en visita a su sector, brinda consejería para evitar la presencia del vector, como el cuidado de recipientes de almacenamiento de agua (tapado y limpieza) y eliminación adecuada de criaderos del zancudo en casa. Esto forma parte de:
A. Fumigación domiciliaria
B. Detección de casos
C. Intervención epidemiológica
D. Medidas preventivas

63. ¿Cómo se le denomina al modelo de atención centrado en la comunidad, que fomenta la promoción y protección de la salud mental, continuidad de cuidados de las personas, familias y colectividades con problemas psicosociales y/o trastornos mentales, con la participación protagónica de la propia comunidad?
A. Convencional de la salud mental
B. Tradicional territorial
C. Comunitario de salud mental
D. Cuidado integral por curso de vida

64. En un EESS se registraron 5 casos de mujeres con endometritis de un total de 100 partos en el año 2025. La tasa de incidencia de endometritis en esa población es de ...../año.
A. 0.5
B. 0.02
C. 0.05
D. 0.2

65. Toda gestante adolescente tiene derecho a recibir atención ..... y de ..... de acuerdo a su edad, situación psicosocial y a su contexto cultural para el cuidado de salud durante el embarazo, parto y puerperio.
A. integral / oportuna
B. excelente / única
C. diferenciada / calidad
D. médica / cuidado

66. Las medidas para ..... son aquellas acciones que permitirán en los siguientes trimestres del año, mejorar la implementación del plan operativo institucional (POI).
A. cumplimiento de actividades
B. mejora continua
C. cumplimiento de logros
D. cumplimiento de meta

67. En un EESS nivel I-2 se desea conocer la prevalencia de obesidad en niños menores de 10 años; por lo cual, necesitamos recopilar datos antropométricos, hábitos alimenticios, ejercicio físico, escolaridad y relación familiar con variables que sean medibles. ¿Qué tipo de investigación sería la más conveniente aplicar en esta población?
A. Analítica
B. Pre experimental
C. Descriptiva
D. Explicativa

68. Como obstetra, usted evidencia que en su comunidad, las pacientes continúan eligiendo la atención de parto domiciliario. ¿En qué dimensión debe priorizar su intervención?
A. Comunicación y trato
B. Fortalecimiento institucional
C. Autonomía de la mujer indígena
D. Participación comunitaria

69. En una unidad ejecutora. ¿Qué oficina se encarga de coordinar, ejecutar y diseñar los programas de fortalecimiento de capacidades del capital humano?
A. Desarrollo institucional
B. Recursos humanos
C. Planeamiento estratégico
D. Organización y racionalización

70. Obstetra serumista coloca un ovillo de lana y una faja, que le ha entregado la madre de la parturienta, sobre el fondo uterino después de la atención del parto. Esta práctica ancestral aplicada por el profesional, identifica:
A. Las capacidades y competencias con pertinencia cultural
B. El riesgo de aplicar esta práctica por estar descontinuada
C. El estado de la infraestructura de los servicios de salud
D. Grado de participación de la comunidad en la atención

71. El conocimiento de la ..... y de la epidemiología permite realizar conclusiones válidas a partir de conjuntos de datos. Con esta información se determinan las asociaciones entre los factores de riesgo y la enfermedad y, en último término, se utilizan para reducir la enfermedad y la lesión.
A. demografía
B. bioestadística
C. causalidad
D. mortalidad

72. Una estrategia para la prevención del dengue es utilizar medios alternativos de comunicación de la comunidad, para asegurar la cobertura a toda la población sin segregar a ningún sector, por ejemplo, haciendo ..... en peluquerías, ferias y medios de comunicación local, para así transmitir el mensaje con un lenguaje claro, concreto y entendible.
A. convenios públicos
B. alianzas estratégicas
C. promoción de la salud
D. acuerdos intersectoriales

73. Mujer de 16 años con antecedente de desnutrición y anemia, no recibió atención prenatal, fue captada por el profesional de la salud cerca al parto, tuvo su niño con RCIU; según los estudios su hijo desarrollará hipertensión, problemas cardiovasculares y DBT en la etapa adulta. Esta serie de eventos que influyen desde la preconcepción hasta la muerte hacen referencia a:
A. Ciclo vital
B. Curso de vida
C. Cuidado de salud
D. Cuidado integral

74. ¿Qué deber de la función pública está cumpliendo el servidor público que no adopta represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas?
A. Ejercicio adecuado del cargo
B. Transparencia
C. Responsabilidad
D. Discreción

75. La OMS refiere que la lactancia materna exclusiva durante 6 meses es la forma de alimentación óptima para los lactantes; por tanto, en la consejería prenatal de lactancia materna, la gestante debe conocer las tres etapas de la leche materna: la primera; el calostro, la segunda; la leche de ..... y finalmente la leche madura; cuyo contenido se adapta a las necesidades de cada bebé en cada etapa de su vida.
A. reserva
B. transición
C. destete
D. fisiológica

76. Puérpera mediata del 4to día; 16 años, reingresa al establecimiento nivel I-4 refiriendo sensación de alza térmica y loquios con mal olor. Examen: FC: 112 X'; FR: 18 X'; T°: 39.5 °C; PA: 90/60 mmHg. Útero: subinvolucionado, doloroso a palpación; GE: loquios purulentos ++/+++. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta infección que se asocia a la atención en salud?
A. Pelviperitonitis
B. Retención de secundinas
C. Parametritis
D. Endometritis puerperal

77. En los últimos 20 años la prevalencia de anemia en el Perú ha sido una constante preocupación para los gestores de salud, por tanto, se ha implementado intervenciones para la determinación de la Hb. como los hemoglobinómetros portátiles. En una campaña de salud del EESS a 800 msnm. un valor de 10.7g/dL de Hb. en mujer no gestante de 15 años a más se considera:
A. anemia leve
B. sin anemia
C. anemia severa
D. anemia moderada

78. La prevención combinada comprende el enfoque integral del VIH a partir de la administración simultánea de intervenciones estratégicas biomédicas, estructurales y conductuales; ésta última hace referencia a:
A. Acceso a preservativos y lubricantes
B. Manejo de ITS (sindrómico y etiológico)
C. Vacunación contra la hepatitis B
D. Consejería pre test y de reducción de riesgos

79. El equipo de salud de un EESS está elaborando un diagnóstico situacional de su comunidad; por tanto se analiza los ingresos socioeconómicos, nivel educativo y ocupación de sus habitantes. ¿A qué tipo de determinantes sociales corresponde este análisis?
A. Psicosociales
B. Intermedios
C. Conductuales
D. Estructurales

80. En un EESS se ha registrado una alta incidencia de ISO (infección de sito operatorio) en postcesareadas; por tanto, el equipo de epidemiología decide recolectar datos de los casos específicos para su investigación, y así controlar este evento. ¿A qué tipo de vigilancia epidemiológica se está refiriendo?
A. De casos
B. Especializada
C. Pasiva
D. Activa

81. Un grupo de estudiantes de primaria acuden al puesto de salud nivel I-2 luego de visitar las aguas termales en la sierra, por presentar irritación en mucosas. ¿Qué elemento produjo esta lesión?
A. Metabólico
B. Farmacológico
C. Xenobiótico
D. Inmunológico

82. La población no se mantiene estática en el tiempo; por tanto, sus características a lo largo de los años, han pasado de altas tasas de natalidad y mortalidad general a que desciendan de manera considerable. ¿Cómo se conoce a este fenómeno?
A. Migración demográfica
B. Migración epidemiológica
C. Transición epidemiológica
D. Transición demográfica

83. Para disminuir el riesgo de infección por M. tuberculosis en la población, el personal de salud realiza la búsqueda …… y…… de casos de TB en trabajadores de salud y público que acude a las áreas asistenciales y administrativas del establecimiento de salud.
A. intensa / formal
B. periódica / semestral
C. masiva / amplia
D. activa / pasiva

84. El conocimiento integral de la realidad, el futuro deseado, políticas y planes coordinados así como el seguimiento y evaluación para la mejora continua del país son fases del ciclo del:
A. Plan operativo
B. Foro consultivo
C. Desarrollo estratégico
D. Planeamiento estratégico

85. El ..... es la aceptación expresa de la o el adolescente de recibir prestaciones de salud o participar en actividades organizadas por el establecimiento de salud, luego de haber recibido una explicación completa y clara del proceso de atención o de la actividad.
A. consentimiento informado
B. derecho de salud
C. registro escrito
D. asentimiento informado

86. La suplementación preventiva para anemia en adolescentes y mujeres en edad fértil se inicia cuando la hemoglobina es ≥ 12 g/dL, 2 veces por semana por un periodo de 3 meses, cada año. La dosis recomendada de hierro elemental + ácido fólico es …
A. 30 mg + 100 ug.
B. 60 mg + 400 ug.
C. 300 mg + 100 ug.
D. 120 mg + 400 ug.

87. Obstetra serumista detecta que la mayoría de partos en la comunidad se realizan en domicilio y son atendidos por una partera o familiar. ¿Cuál de las prácticas e indicadores por dimensión y percepción es prioritario reforzar?
A. Fortalecimiento institucional
B. Participación comunitaria
C. Comunicación y trato
D. Autonomía de la mujer

88. Se asigna nuevo jefe en un EESS del primer nivel de atención; al llegar percibe insatisfacción y quejas de los trabajadores sobre el ambiente de trabajo. Es por ello, que decide hacer gestión del ..... dividido en tres fases: planificación, intervención y evaluación; para promover un ambiente de trabajo agradable y así el logro de objetivos institucionales.
A. trabajo en equipo
B. desarrollo profesional
C. clima organizacional
D. ambiente laboral

89. Los establecimientos de salud de primer nivel de atención deben contar con un centro de acopio que debe permitir el volumen de almacenamiento por ..... horas.
A. 36
B. 48
C. 24
D. 12

90. Es muy importante que la consejería en lactancia materna se inicie desde el embarazo, por lo que las gestantes a partir de las …… semanas conocen la importancia y manejo de la lactancia materna y de esta forma incrementan su propia confianza y seguridad.
A. 32
B. 20
C. 24
D. 28

91. Se atiende en la madrugada primigesta de 23 años con 38 semanas de edad gestacional sin ningún factor de riesgo en periodo expulsivo. Se procede a la atención del parto, alumbramiento y puerperio inmediato con la atención inmediata del recién nacido e internamiento posterior de rutina. ¿A qué categoría pertenece este EESS?
A. I-1
B. I-3
C. I-4
D. I-2

92. Primigesta 19 años; EG: 34 semanas x ECO del I Trimestre; acude por presentar cefalea (que no responde a medicación y no tiene un diagnóstico alternativo). Examen: FC: 98X'; FR: 18X'; T° 36.6°C; PA: 160/100 mmHg. Examen Físico: AU: 25cm. Feto: LCD. DU: esporádica. MF: presentes. Laboratorio: Proteína cualitativa 2 a 3 + (test ácido sulfosalicílico) ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la medida a seguir antes de la referencia?
A. Hipertensión Gestacional / administrar metildopa
B. Preeclampsia con signos de severidad / activar clave azul
C. Hipertensión crónica / indicar reposo
D. Preeclampsia sin signos de severidad / observar DLI

93. Al llegar al establecimiento de salud el nuevo jefe observa que existen en el archivo historias clínicas muy antiguas y deterioradas. Por tanto, la primera acción, como procedimiento de gestión, es conservar por ..... años las historias clínicas en el archivo activo, considerando su última fecha de atención, el resto se trasladará al archivo pasivo.
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15

94. ¿En qué estructura organizativa se muestran las relaciones entre las líneas y el staff de la organización, describiendo posiciones, delineando relaciones y definiendo el ámbito de responsabilidad y autoridad?
A. Fluxograma
B. Organigrama
C. Reglamento de funciones
D. Objetivos estratégicos

95. Niño de 8 años es llevado al establecimiento para visita odontológica, porque no tiene el hábito de cepillarse los dientes que permite la eliminación de la placa dental relacionada con caries y enfermedad de las encías; su madre preocupada pregunta. ¿Cuántas veces al día como mínimo debe cepillarse los dientes su hijo?
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2

96. Para garantizar el acceso a la atención primaria de salud, desde el enfoque de salud pública en la gestión farmacéutica se debe promover herramientas de gestión de almacén; adquisiciones oportunas y ...
A. gestión de residuos sólidos.
B. uso racional de medicamentos.
C. mejora de servicios de agua.
D. acceso a la electricidad.

97. En el análisis de datos de una investigación, la ..... es uno de los tipos de medidas de tendencia central que informan el valor más representativo de la muestra, definida por el valor de la variable que se repite con más frecuencia.
A. varianza
B. mediana
C. media
D. moda

98. Conjunto de formatos que contiene los datos del jefe de familia, condición socio-económica de cada uno de sus integrantes con enfoque de riesgo y etapas de vida, serán utilizadas en el I nivel de atención con población asignada. Esta definición se refiere a:
A. Carpeta familiar
B. Historia clínica
C. Ficha social
D. Ficha socioeconómica

99. Personal de salud realiza una visita domiciliaria de control y seguimiento a una familia de 8 integrantes, de los cuales 4 reciben tratamiento para TBC porque hicieron la enfermedad por factores predisponentes y desencadenantes; sin embargo los otros miembros a pesar de estar expuestos no tienen la enfermedad. ¿Cuál es el tipo de relación causal?
A. Causa no necesaria ni suficiente
B. Causa suficiente y no necesaria
C. Necesaria pero no suficiente
D. Necesaria y suficiente

100. ¿Quién se encarga de elaborar el plan local de salud, además de establecer las metas sanitarias y sobre los determinantes de la salud, define también la asignación de recursos y la participación de los diferentes actores institucionales y sociales del ámbito territorial?
A. Coordinador de estrategia
B. Promotor de salud
C. La autoridad local de salud
D. Inspector en salud