

Classes	fi	↓Fi	↑Fi	↑Fr	↑Fp	fr	Pm	fr x Pm	(Pm-Med)^2 x fi	fi x Pm
55 □ 60	10	10	300	1,00	100,00	0,03	57,5	1,91667	3.546,9444444	575
60 □ 65	35	45	255	0,85	85,00	0,12	62,5	7,29167	6.697,6388889	2187,5
65 □ 70	45	90	210	0,70	70,00	0,15	67,5	10,12500	3.511,2500000	3037,5
70 □ 75	60	150	150	0,50	50,00	0,20	72,5	14,50000	881,6666667	4350
75 □ 80	45	195	105	0,35	35,00	0,15	77,5	11,62500	61,2500000	3487,5
80 □ 85	40	235	65	0,22	21,67	0,13	82,5	11,00000	1.521,1111111	3300
85 □ 90	30	265	35	0,12	11,67	0,10	87,5	8,75000	3.740,8333333	2625
90 □ 95	20	285	15	0,05	5,00	0,07	92,5	6,16667	5.227,2222222	1850
95 □ 100	10	295	5	0,02	1,67	0,03	97,5	3,25000	4.480,2777778	975
100 □ 105	5	300	0	0,00	0,00	0,02	102,5	1,70833	3.423,4722222	512,5
Total	300		300	1,00	100,00	1,00		76,33333	33,091,6666667	22900

Emd =	150	Média =	76,33333333	Dq =	7,708333
Mediana =	75	s =	10,52019346	K =	0,2715
Mo(P) =	72,33333	e1 =	0,3802211446		
PQ1 =	75	Q1 =	68,33333		
PQ3 =	225	Q3 =	83,75		
PP10 =	30	P10 =	62,85714		
PP90 =	270	P90 =	91,25		

A) Frequência absoluta simples entre 70 (inclusive) a 95 (exclusive)? 195

B) Frequência absoluta acumulada baixo de 90? 265

C) Frequência percentual acumulada acima de 65 (inclusive)? 85%

D) Classifique a Distribuição dada quando à assimetria, utilizando-se do Primeiro Coeficiente de Assimetria de Pearson (e1) 0,380221144680 Distribuição assimétrica positiva ou desviada à direita

E) Classifique a Distribuição dada quando à curtose (obtenha o valor de k com 3 casas decimais). 271 Como k > 0,263, a dist. é placúrtica

