

2011 年数值分析期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 填空题.

(1) 设 $f(0) = 0$, $f(1) = 6$, $f(2) = 26$, 则 $f[0, 1] =$ _____, $f[0, 1, 2] =$ _____; $f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为_____.

(2) 设 $h = \frac{b-a}{2m}$, $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, 2m$. 计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合 Simpson 公式为_____;
它是_____阶收敛的, 代数精度为_____.

(3) 设 $x_i = i$ ($i = 0, 1, \dots, n$), $l_i(x)$ 是相应的 n 次 Lagrange 插值基函数, 则

$$\sum_{i=0}^n x_i^{n+1} l_i(0) = \text{_____}.$$

(4) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} \left[2f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) \right]$ 的代数精度为_____.

(5) 设 $f(x) = 7x^7 + 5x^5 + 4$, 则 $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] =$ _____, $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] =$ _____.

(6) Romberg 序列可达到_____阶收敛速度.

(7) 求解非线性方程 $f(x) = 0$ 的 Newton 迭代公式为_____. 对单根情形, Newton 法的收敛阶数是_____.

二. (10 分) 设 $f(x)$ 为 x 的 k 次多项式, $x_1, x_2, \dots, x_m$ 为互不相同的实数, 且 $k > m$. 试证明 $f[x_1, x_2, \dots, x_m]$ 为 x 的 $k - m$ 次多项式. 又当 $k = m$ 和 $k < m$ 时, $f[x_1, x_2, \dots, x_m]$ 值为多少?

三. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-h, h]$ 上充分可导. 试推导求积公式

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2} [3f(0) - f(-h)],$$

以及该积分公式的余项和收敛阶.

四. (10 分) 对区间 $[a, b]$ 作等距剖分, 基点为 $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b$, $h = \frac{b-a}{n}$, 即 $x_i = a + ih$,

$i = 0, 1, \dots, n$, 试证明当 n 为偶数, $\int_a^b w_{n+1}(x) dx = 0$, 其中 $w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$.

进一步, 利用证到的结论说明当 n 为偶数时闭 Newton-Cotes 型求积公式的代数精度为 $n + 1$.

五. (10 分) 对于积分 $\int_0^1 x^5 dx$, 若采用复合梯形公式需要使用多少个求积基点才能使积分近似值的误差不超过 10^{-8} ?

六. (10 分) 试确定常数 A, B, C 及正数 β , 使求积公式

$$\int_{-2}^2 f(x) dx \approx Af(-\beta) + Bf(0) + Cf(\beta)$$

有尽可能高的代数精确度, 并指出代数精确度是多少, 该公式是否为 Gauss 型求积公式?

七. (10 分) 证明 Chebyshev 多项式满足关系:

$$T_m(x)T_n(x) = \frac{1}{2}\{T_{m+n}(x) + T_{m-n}(x)\}.$$

八. (10 分) 作适当变换, 把积分

$$\int_1^3 x\sqrt{4x - x^2 - 3} dx$$

化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式. 当 n 为何值时能得到积分的准确值? 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算它的准确值.

九. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有四阶连续导数, 试构造三次多项式 $H_3(x)$, 使其满足插值条件:

$$H_3(a) = f(a), \quad H_3(b) = f(b), \quad H_3(c) = f(c), \quad H_3'(c) = f'(c),$$

其中 $c = \frac{a+b}{2}$, 并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.