

### Урок 3.

1. Даны значения зарплат из выборки выпускников: **100, 80, 75, 77, 89, 33, 45, 25, 65, 17, 30, 24, 57, 55, 70, 75, 65, 84, 90, 150**. Посчитать (желательно без использования статистических методов наподобие std, var, mean) *среднее арифметическое, среднее квадратичное отклонение, смещенную и несмещенную оценки дисперсий* для данной выборки.

№	X	n	n-1	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$	$\sigma^2_{\text{смещ}}$	$\sigma^2_{\text{несмещ}}$	$\sigma$
1	100	20	19	65,3	34,7	1204	950,1	1000,1158	30,824
2	80				14,7	216,1			
3	75				9,7	94,09			
4	77				11,7	136,9			
5	89				23,7	561,7			
6	33				-32,3	1043			
7	45				-20,3	412,1			
8	25				-40,3	1624			
9	65				-0,3	0,09			
10	17				-48,3	2333			
11	30				-35,3	1246			
12	24				-41,3	1706			
13	57				-8,3	68,89			
14	55				-10,3	106,1			
15	70				4,7	22,09			
16	75				9,7	94,09			
17	65				-0,3	0,09			
18	84				18,7	349,7			
19	90				24,7	610,1			
20	150				84,7	7174			
Σ	1306					19002			

2. В первом ящике находится **8 мячей**, из которых **5 - белые**. Во втором ящике - **12 мячей**, из которых **5 белых**. Из первого ящика вытаскивают случайным образом **два мяча**, из второго - **4**. Какова вероятность того, что 3 мяча белые?

**РЕШЕНИЕ:**

1) 1 белый мяч из первого ящика, 2 – из второго:

$$P_1 = \frac{c_5^1 \cdot c_3^1}{c_8^2} \cdot \frac{c_5^2 \cdot c_7^2}{c_{12}^4} = 0,227273$$

2) 2 белых мяча из первого ящика, 1 – из второго:

$$P_2 = \frac{c_5^2}{c_8^2} \cdot \frac{c_5^1 \cdot c_7^3}{c_{12}^4} = 0,126263$$

3) 3 белых мяча из второго:

$$P_3 = \frac{c_3^2 \cdot c_5^3 \cdot c_7^1}{c_8^2 \cdot c_{12}^4} = 0,015$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 0,227 + 0,126 + 0,015 = 0,367$$

3. На соревнованиях по биатлону один из трех спортсменов стреляет и попадает в мишень. Вероятность попадания для первого спортсмена равна **0.9**, для второго — **0.8**, для третьего — **0.6**. Найти вероятность того, что выстрел произведен: а). первым спортсменом б). вторым спортсменом в). третьим спортсменом.

**РЕШЕНИЕ:**

Формула Байеса для вероятности события В при условии, что событие А уже произошло:

$$P(B|A) = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(A)}$$

Событие А – попадание. а события  $B_1$ ,  $B_2$  и  $B_3$  — что выстрел совершил первый, второй или третий спортсмен:

$$P(A|B_1)=0.9$$

$$P(A|B_2)=0.8$$

$$P(A|B_3)=0.6$$

$$P(B_1) = P(B_2) = P(B_3) = 1/3 - \text{вероятность произвести выстрел спортсменами}$$

$$P(A) = 1/3(0.9+0.8+0.6) - \text{полная вероятность попадания}$$

Тогда:

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{1}{3} * 0.9}{\frac{1}{3} * (0.9 + 0.8 + 0.6)} = \frac{0.9}{2.3} = 0.391$$

$$P(B_2|A) = \frac{0.8}{2.3} = 0.348$$

$$P(B_3|A) = \frac{0.6}{2.3} = 0.26$$


---

4. В университет на факультеты А и В поступило равное количество студентов, а на факультет С студентов поступило столько же, сколько на А и В вместе. Вероятность того, что студент факультета А сдаст первую сессию, равна 0.8. Для студента факультета В эта вероятность равна 0.7, а для студента факультета С - 0.9. Студент сдал первую сессию. Какова вероятность, что он учится: а). на факультете А б). на факультете В в). на факультете С?

**РЕШЕНИЕ:**

Формула Байеса для вероятности события В при условии, что событие А уже произошло:

$$P(B|A) = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(A)}$$

Событие А – сдача сессии. а события  $B_1$ ,  $B_2$  и  $B_3$  — что сдал студент факультета А, В и С соответственно:

$$P(A|B_1)=0.8$$

$$P(A|B_2)=0.7$$

$$P(A|B_3)=0.9$$

$$P(B_1) = P(B_2) = 1/4, \text{ вероятность, что на сдаче присутствует студент факультета А и В}$$

$$P(B_3) = 2/4 - \text{вероятность, что на сдаче присутствует студент факультета С}$$

$$P(A) = 1/4 * 0.8 + 1/4 * 0.7 + 2/4 * 0.9 - \text{полная вероятность сдачи сессии}$$

Тогда:

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{1}{4} * 0.8}{\frac{1}{4} * (0.8 + 0.7) + \frac{2}{4} * 0.9} = \frac{0.8}{3.3} = 0.24$$

$$P(B_2|A) = \frac{0.7}{3.3} = 0.21$$

$$P(B_3|A) = \frac{2 * 0.9}{3.3} = 0.545$$


---

5. Устройство состоит из трех деталей. Для первой детали вероятность выйти из строя в первый месяц равна 0.1, для второй - 0.2, для третьей - 0.25. Какова вероятность того, что в первый месяц выйдут из строя:

**а) все детали:**

$$P_3 = 0.1 * 0.2 * 0.25 = 0.005$$

**б) только две детали:**

$$P = 0.1 * 0.2 * 0.75 + 0.1 * 0.25 * 0.8 + 0.9 * 0.2 * 0.25 = 0.08$$

**в) хотя бы одна деталь:**

Вероятность, что ни одна деталь не выйдет из строя:

$$P_0 = 0.9 * 0.8 * 0.75 = 0.54$$

$$P = 1 - P_0 = 1 - 0.54 = 0.46$$

**г) от одной до двух деталей?**

$$P = 1 - P_0 - P_3 = 1 - 0.54 - 0.005 = 0.455$$