

第二章 λ -矩阵与矩阵的Jordan标准形

λ -矩阵的基本概念

定义： 设 $a_{ij}(\lambda) (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 为数域 F 上的多项式，则称

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & \cdots & a_{1n}(\lambda) \\ a_{21}(\lambda) & a_{22}(\lambda) & \cdots & a_{2n}(\lambda) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}(\lambda) & a_{m2}(\lambda) & \cdots & a_{mn}(\lambda) \end{bmatrix}$$

为多项式矩阵或 λ -矩阵.

$a_{ij}(\lambda)(i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n)$ 中最高的次数为 $A(\lambda)$ 的次数。

特例：数字矩阵，特征矩阵 $\lambda E - A$.

定义 如果 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 中有一个 r 阶 ($r \geq 1$) 子式不为零，而所有 $r+1$ 阶子式(如果有的话)全为零，则称 $A(\lambda)$ 的秩为 r ，记为

$$\text{rank } A(\lambda) = r$$

零矩阵的秩为0。

定义 下列各种类型的变换，叫做 λ -矩阵的初等变换：

- (1) 矩阵的任二行(列)互换位置；
- (2) 非零常数 c 乘矩阵的某一行(列)；
- (3) 矩阵的某一行(列)的 $\varphi(\lambda)$ 倍加到另一行(列)上去，其中 $\varphi(\lambda)$ 是 λ 的一个多项式。

对单位矩阵施行上述三种类型的初等变换便得相应得三种 λ 矩阵得初等矩阵

$$P(i, j), P(i(c)), P(i, j(\varphi))$$

$$P(i,j)=\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & 1 \\ & & & \ddots & \\ & 1 & & 0 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}, \quad P(i(c))=\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & c & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$



i 列

$$P(i,j(\varphi))=\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \varphi(\lambda) & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

i 行
j 行

定理 对一个 $m \times n$ 的 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的行作初等**行**变换，相当于用相应的 m 阶初等矩阵**左乘** $A(\lambda)$ 。对 $A(\lambda)$ 的列作初等**列**变换，相当于用相应的 n 阶初等矩阵**右乘** $A(\lambda)$ 。

$$P(i, j)^{-1} = P(i, j), \quad P(i(c))^{-1} = P(i(c^{-1})),$$

$$P(i, j(\varphi))^{-1} = P(i, j(-\varphi)).$$

定义 如果 $A(\lambda)$ 经过有限次的初等变换之后变成 $B(\lambda)$ ，则称 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ **等价**，记之为

$$A(\lambda) \simeq B(\lambda)$$

λ 矩阵的等价关系满足:

(1) 自反性: $A(\lambda) \simeq A(\lambda)$;

(2) 对称性: $A(\lambda) \simeq B(\lambda)$ 则 $B(\lambda) \simeq A(\lambda)$;

(3) 传递性: 若 $A(\lambda) \simeq B(\lambda)$, $B(\lambda) \simeq C(\lambda)$, 则 $A(\lambda) \simeq C(\lambda)$.

λ -矩阵Smith标准形的存在性

定理 任意一个非零的 $m \times n$ 型的 λ -矩阵都等价于一个“**对角矩阵**”，即

$$A(\lambda) \simeq \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & & & \\ & d_2(\lambda) & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & d_r(\lambda) & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

其中 $r \geq 1$, $d_i(\lambda)$ 是首项系数为1的多项式且

$$d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda) \quad (i = 1, 2, \dots, r-1)$$

称这种形式的 λ -矩阵为 $A(\lambda)$ 的 **Smith标准形**。

$d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的 **不变因子**。

例 1

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$$

将其化成Smith标准形。

解:

$$\begin{aligned} A(\lambda) &= \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 1 & \lambda^2 + \lambda & 0 \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix} \\ &\simeq \begin{bmatrix} 1 & \lambda^2 + \lambda & 0 \\ 0 & -\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda & -\lambda \\ 0 & -\lambda^4 - \lambda^3 - \lambda & -\lambda^2 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda & -\lambda \\ 0 & -\lambda^4 - \lambda^3 - \lambda & -\lambda^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\simeq \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda & -\lambda \\ \mathbf{0} & -\lambda^4 - \lambda^3 - \lambda & -\lambda^2 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -\lambda & -\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda \\ \mathbf{0} & -\lambda^2 & -\lambda^4 - \lambda^3 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\simeq \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & -\lambda & -\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & -\lambda^2 - \lambda \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \lambda & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \lambda(\lambda + \mathbf{1}) \end{bmatrix}$$

练习题:

$$(1) \quad A(\lambda) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - \lambda & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda^2 - \lambda & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(2) \quad A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & \lambda + 1 & 0 & 0 \\ -6 & -1 & \lambda - 2 & -1 \\ 14 & 5 & 1 & \lambda \end{bmatrix}$$

将其化为 Smith 标准形。

λ -矩阵标准形的唯一性 (了解)

定义： $A(\lambda)$ 为一个 λ -矩阵且 $\text{rank}(A(\lambda)) = r$ ，对于任意的正整数 k ， $1 \leq k \leq r$ ， $A(\lambda)$ 必有非零的 k 阶子式， $A(\lambda)$ 的全部 k 阶子式的最大公因式 $D_k(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子(首1)。

显然，如果 $\text{rank}(A(\lambda)) = r$ ，则行列式因子一共有 r 个。

例 1 求

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$$

的各阶行列式因子。

解： 由于 $(1-\lambda, \lambda) = 1$, $D_1(\lambda) = 1$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 \\ \lambda & \lambda \end{vmatrix}$$

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$$

$$= \lambda(-\lambda^2 - \lambda + 1) = f(\lambda)$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 \\ \lambda^2+1 & \lambda^2 \end{vmatrix} = \lambda^3(-\lambda-1) = g(\lambda)$$

显然 $(f(\lambda), g(\lambda)) = \lambda$, 而且其余的各2 阶子式也都包含 λ 作为公因子, 所以 $D_2(\lambda) = \lambda$.

另外

$$|A(\lambda)| = -\lambda^3 - \lambda^2$$

$$\Rightarrow D_3(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2$$

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$$

注意： 观察 $D_1(\lambda), D_2(\lambda), D_3(\lambda)$ 三者之间的关系。

定理2.1.5： 等价 λ 矩阵有相同的各阶行列式因子，从而有相同的秩。

P.82

设 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的 Smith 标准形为

$$A(\lambda) \simeq \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & & & \\ & d_2(\lambda) & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & d_r(\lambda) & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

容易计算上面的标准形的各阶行列式因子为

$$D_1(\lambda) = d_1(\lambda)$$

$$D_2(\lambda) = d_1(\lambda)d_2(\lambda)$$

$$\vdots$$

$$D_r(\lambda) = d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_r(\lambda)$$

显然有

$$d_1(\lambda) = D_1(\lambda)$$

$$d_2(\lambda) = \frac{D_2(\lambda)}{D_1(\lambda)}$$

$$\vdots$$

$$d_r(\lambda) = \frac{D_r(\lambda)}{D_{r-1}(\lambda)}$$

由于 $A(\lambda)$ 与上面的Smith标准形具有相同的各阶行列式因子，所以 $A(\lambda)$ 的各阶行列式因子为

$$D_1(\lambda), D_2(\lambda), \dots, D_r(\lambda)$$

而 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$

又是由这些行列式因子唯一确定的，于是

定理2.1.6: $A(\lambda)$ 的Smith标准形是唯一的。

定理2.1.7 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价的充要条件是对任何的 k ，它们的 k 阶行列式因子相同。

定理2.1.8 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价的充要条件是 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 有相同的不变因子。

$$(1) \begin{bmatrix} \lambda - a & c_1 & & & \\ & \lambda - a & c_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda - a & c_{n-1} \\ & & & & \lambda - a \end{bmatrix}$$

首先观察此矩阵的元素排列规律，显然

$$D_n(\lambda) = (\lambda - a)^n$$

下面看 $n-1$ 阶行列式因子。有一个 $n-1$ 阶子式要注意，即

$$\begin{vmatrix} c_1 & & & \\ \lambda - a & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda - a & c_{n-1} \end{vmatrix} = c_1 c_2 \cdots c_{n-1}$$

容易计算出 $D_{n-1}(\lambda) = 1$ 从而

$$D_1(\lambda) = D_2(\lambda) = \cdots = D_{n-1}(\lambda) = 1$$

$$\Rightarrow d_1(\lambda) = 1, d_2(\lambda) = 1, \cdots, d_{n-1}(\lambda) = 1,$$

$$d_n(\lambda) = (\lambda - a)^n$$

原 λ -矩阵的Smith标准形为

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & (\lambda - a)^n \end{bmatrix}$$

初等因子和矩阵的相似

设 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的不变因子为

$$d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$$

在复数域内将它们分解成一次因式的幂的乘积：

$$d_1(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{e_{11}} (\lambda - \lambda_2)^{e_{12}} \dots (\lambda - \lambda_s)^{e_{1s}}$$

$$d_2(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{e_{21}} (\lambda - \lambda_2)^{e_{22}} \dots (\lambda - \lambda_s)^{e_{2s}}$$

.....

$$d_r(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{e_{r1}} (\lambda - \lambda_2)^{e_{r2}} \dots (\lambda - \lambda_s)^{e_{rs}}$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是互异的复数, e_{ij} 是非负整数。因为 $d_i \mid d_{i+1}(\lambda) (i=1, \dots, r-1)$, 所以满足如下关系

$$0 \leq e_{11} \leq e_{21} \leq \dots \leq e_{r1}$$

$$0 \leq e_{12} \leq e_{22} \leq \dots \leq e_{r2}$$

.....

$$0 \leq e_{1s} \leq e_{2s} \leq \dots \leq e_{rs}$$

定义 在上式中, 所有指数大于零的因子

$$(\lambda - \lambda_j)^{e_{ij}}, e_{ij} > 0, i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s$$

称为 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的初等因子。

定理2.2.1 n 阶 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价的充要条件是它们有相同的秩且有相同的初等因子。

数字矩阵的相似与 λ -矩阵的等价

定理2.2.5: 设 A, B 是两个 n 阶的数字矩阵, 那么 A 与 B 相似的充分必要条件为它们的特征矩阵 $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 等价。

对于任何一个数字矩阵 A , $|\lambda I - A| \neq 0$, 所以,

$$\text{rank}(\lambda I - A) = n$$

于是可得下面两个定理

定理2.2.6: 两个同阶的方阵 A, B 相似的充分必要条件是 $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 有相同的初等因子。

定理2.2.7: 两个同阶的方阵 A, B 相似的充分必要条件是 $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 有相同的行列式因子（或不变因子）。