

# Rozwiązania zadań z logiki klasycznej i operatorów sterowania

Wojciech Kołowski

15 stycznia 2019

Zad. 1

- (a) Chcemy ze specjalnego przypadku prawa Peirce'a ( $P\perp$ ) oraz prawa eliminacji fałszu ( $\perp E$ ) wyprowadzić prawo Peirce'a ( $P$ ). W tym celu w systemie z regułami ( $P\perp$ ) oraz ( $\perp E$ ) udowodnimy  $\vdash ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi$ .

$$\frac{\frac{\frac{(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \varphi \rightarrow \perp, \varphi \vdash \varphi \rightarrow \perp}{(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \varphi \rightarrow \perp, \varphi \vdash \varphi} \text{Ass} \quad \frac{\frac{(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \varphi \rightarrow \perp, \varphi \vdash \perp}{(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \varphi \rightarrow \perp, \varphi \vdash \psi} \perp\text{E}}{(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \varphi \rightarrow \perp \vdash \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{I}}{\frac{(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \varphi \rightarrow \perp \vdash \varphi \rightarrow \psi}{(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi, \varphi \rightarrow \perp \vdash \varphi} \rightarrow\text{E}} \text{Ass}$$

- (b) Chcemy ze specjalnego przypadku prawa Peirce’a  $P\perp$  oraz prawa eliminacji fałszu  $\perp E$  wyprowadzić prawo eliminacji podwójnej negacji  $\neg\neg E$ . W tym celu pokażemy w systemie z tymi regułami, że  $\vdash ((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi$ .

$$\frac{\frac{\frac{(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp, \varphi \rightarrow \perp \vdash (\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp}{(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp, \varphi \rightarrow \perp \vdash \perp} \text{Ass} \quad \frac{(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp, \varphi \rightarrow \perp \vdash \varphi \rightarrow \perp}{\vdash ((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi} \text{Ass}}{\vdash ((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi} \rightarrow E$$

- (c) Chcemy z prawa eliminacji podwójnej negacji  $\neg\neg E$  wyprowadzić szczególny przypadek prawa Peirce’a  $P \perp$  oraz prawo eliminacji fałszu  $\perp E$ .

$$\frac{\frac{\frac{}{\perp, \varphi \rightarrow \perp \vdash \perp} \text{Ass}}{\perp \vdash \varphi} \neg\neg\text{E}}{\vdash \perp \rightarrow \varphi} \rightarrow\text{I}$$

$$\frac{\frac{(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi, \varphi \rightarrow \perp \vdash \varphi \rightarrow \perp}{\text{Ass}} \quad \frac{\frac{(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi, \varphi \rightarrow \perp \vdash (\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi}{\text{Ass}} \quad \frac{(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi, \varphi \rightarrow \perp \vdash \varphi \rightarrow \perp}{\text{Ass}}}{(\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \varphi, \varphi \rightarrow \perp \vdash \varphi} \rightarrow E$$

Zad. 2

Udowodnijmy najpierw (w systemie z  $\neg\neg E$ ) prawo wyłączonego środka  $\varphi \vee \neg\varphi$ .

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp, \varphi \vdash (\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp}{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp, \varphi \vdash \perp} \text{Ass} \quad \frac{\frac{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp, \varphi \vdash \varphi}{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp, \varphi \vdash \varphi \vee \neg\varphi} \text{Ass} \quad \frac{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp, \varphi \vdash \varphi \vee \neg\varphi}{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp, \varphi \vdash \perp} \vee I_1}{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp, \varphi \vdash \perp} \rightarrow E \\
 \frac{\frac{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp, \varphi \vdash \perp}{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp \vdash \neg\varphi} \rightarrow I \quad \frac{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp \vdash \neg\varphi}{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp \vdash \varphi \vee \neg\varphi} \vee I_2}{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp \vdash \varphi \vee \neg\varphi} \rightarrow E \\
 \frac{\frac{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp \vdash \varphi \vee \neg\varphi}{\vdash \varphi \vee \neg\varphi} \text{Ass} \quad \frac{(\varphi \vee \neg\varphi) \rightarrow \perp \vdash \perp}{\vdash \varphi \vee \neg\varphi} \neg\neg E}{\vdash \varphi \vee \neg\varphi} \neg\neg E
 \end{array}$$

Rzut okiem na termy i ich reguły typowania pozwala stwierdzić, że termem odpowiadającym temu dowodowi jest (anotacje typów pozwolę sobie pominąć)  $EM_\varphi \equiv \Delta x.x(\iota_2(\lambda y.x(\iota_1 y)))$ , zaś rzut okiem na reguły redukcji  $\rightarrow_\Delta$  pozwala stwierdzić, że term ten jest w postaci normalnej (reguły 1 i 3 nie pasują, zaś w regule 2 nie jest spełniona przesłanka dotycząca zmiennej wolnej).

Chcemy teraz znormalizować term  $\lambda t.\lambda f.\text{case}(EM_\varphi, x_1.t, x_2.f)$ . Normalizujemy więc:

$$\begin{aligned}
 \lambda t.\lambda f.\text{case}(EM_\varphi, x_1.t, x_2.f) &\equiv \lambda t.\lambda f.\Delta k.(\Delta x.x(\lambda x_1.\lambda x_2.(\lambda y.x(\lambda z_1.\lambda z_2.z_1 y))))(\lambda x_1.kt)(\lambda x_2.kf) \rightarrow_\Delta \\
 &\lambda t.\lambda f.\Delta k.(\Delta z.(\lambda w.z(w(\lambda x_1.kt)))(\lambda x_1.\lambda x_2.x_2(\lambda y.(\lambda w.z(w(\lambda x_1.kt)))(\lambda z_1.\lambda z_2.y))))(\lambda x_2.kf) \rightarrow_\beta \\
 \lambda t.\lambda f.\Delta k.(\Delta z.(\lambda w.z(w(\lambda x_1.kt)))(\lambda x_1.\lambda x_2.x_2(\lambda y.z(\lambda z_2.kt))))(\lambda x_2.kf) &\rightarrow_\beta^* \lambda t.\lambda f.\Delta k.(\Delta z.z(\lambda x_2.x_2(\lambda y.z(\lambda z_2.kt))))(\lambda x_2.kf) \rightarrow_\Delta \\
 &\lambda t.\lambda f.\Delta k.\Delta w.(\lambda a.w(a(\lambda x_2.kf)))(\lambda x_2.x_2(\lambda y.(\lambda a.w(a(\lambda x_2.kf)))(\lambda z_2.kt)))) \rightarrow_\beta^* \\
 \lambda t.\lambda f.\Delta k.\Delta w.(\lambda a.w(a(\lambda x_2.kf)))(\lambda x_2.x_2(\lambda y.w(kt))) &\rightarrow_\beta \lambda t.\lambda f.\Delta k.\Delta w.w((\lambda x_2.x_2(\lambda y.w(kt)))(\lambda x_2.kf)) \rightarrow_\beta \\
 \lambda t.\lambda f.\Delta k.\Delta w.w((\lambda x_2.kf)(\lambda y.w(kt))) &\rightarrow_\beta \lambda t.\lambda f.\Delta k.\Delta w.w(kf) \rightarrow_\Delta \lambda t.\lambda f.\Delta k.kf \rightarrow_\Delta \lambda t.\lambda f.f
 \end{aligned}$$

Jak widać, wychodzi funkcja stale zwracająca drugi argument (czyli fałsz).