

Trygonometria

Wiktor Persak

I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy im. Cypriana Kamila Norwida

Spis treści


1	Tożsamości Trygonometryczne	2
1.1	Sinus sumy dwóch kątów	2
1.2	Cosinus sumy dwóch kątów	3
1.3	Tangens sumy dwóch kątów	3
1.4	Cotangens sumy dwóch kątów	3
1.5	Sinus różnicy dwóch kątów	4
1.6	Cosinus różnicy dwóch kątów	4
1.7	Tangens różnicy dwóch kątów	4
1.8	Cotangens różnicy dwóch kątów	4
1.9	Sinus dwukrotności kąta	5
1.10	Cosinus dwukrotności kąta	5
1.11	Tangens dwukrotności kąta	5
1.12	Cotangens dwukrotności kąta	5
1.13	Sinus trzykrotności kąta	6
1.14	Cosinus trzykrotności kąta	6
1.15	Tangens trzykrotności kąta	6
1.16	Cotangens trzykrotności kąta	7
1.17	Sinus kąta połówkowego	7
1.18	Cosinus kąta połówkowego	7
1.19	Tangens kąta połówkowego	8
1.20	Cotangens kąta połówkowego	8
2	Podsumowanie	9

1 Tożsamości Trygonometryczne

1.1 Sinus sumy dwóch kątów

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

Dowód:



$$[ABC] = \frac{1}{2}ab \sin(\alpha + \beta)$$

$$[ADC] = \frac{1}{2}bh \sin \alpha$$

$$[DBC] = \frac{1}{2}ah \sin \beta$$

Z $\triangle ADC$ i $\triangle BDC$:

$$\cos \alpha = \frac{h}{b} \text{ oraz } \cos \beta = \frac{h}{a}$$

Stąd

$$h = b \cos \alpha \text{ i } h = a \cos \beta$$

Czyli

$$[ABC] = [ADC] + [BDC]$$

$$\frac{1}{2}ab \sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{2}bh \sin \alpha + \frac{1}{2}ah \sin \beta$$

$$\frac{1}{2}ab \sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{2}ba \cos \beta \sin \alpha + \frac{1}{2}ab \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.$$

c.n.d.

1.2 Cosinus sumy dwóch kątów

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \beta) &= \sin(90^\circ - (\alpha + \beta)) = \\ &= \sin(90^\circ - \alpha - \beta) = \\ &= \sin((90^\circ - \alpha) + (-\beta)) = \\ &= \sin(90^\circ - \alpha)\cos(-\beta) + \cos(90^\circ - \alpha)\sin(-\beta) = \\ &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.3 Tangens sumy dwóch kątów

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(\alpha + \beta) &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \\ &= \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} = \\ &= \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \\ &= \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 + \frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \\ &= \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.4 Cotangens sumy dwóch kątów

$$\operatorname{ctg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta - 1}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta}$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\operatorname{ctg}(\alpha + \beta) &= \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} = \\ &= \frac{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta} = \\ &= \frac{\frac{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \sin \beta}}{\frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \sin \beta}} = \\ &= \frac{\frac{\cos \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta} - 1}{\frac{\cos \beta}{\sin \beta} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}} = \\ &= \frac{\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta - 1}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta}.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.5 Sinus różnicy dwóch kątów

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha - \beta) &= \sin(\alpha + (-\beta)) = \\ &= \sin \alpha \cos(-\beta) + \cos \alpha \sin(-\beta) = \\ &= \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.6 Cosinus różnicy dwóch kątów

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\cos(\alpha - \beta) &= \cos(\alpha + (-\beta)) = \\ &= \cos \alpha \cos(-\beta) - \sin \alpha \sin(-\beta) = \\ &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.7 Tangens różnicy dwóch kątów

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(\alpha - \beta) &= \operatorname{tg}(\alpha + (-\beta)) = \\ &= \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg}(-\beta)}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg}(-\beta)} = \\ &= \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.8 Cotangens różnicy dwóch kątów

$$\operatorname{ctg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta + 1}{-\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta}$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\operatorname{ctg}(\alpha - \beta) &= \operatorname{ctg}(\alpha + (-\beta)) = \\ &= \frac{\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg}(-\beta) - 1}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg}(-\beta)} = \\ &= \frac{-\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta - 1}{\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{ctg} \beta} = \\ &= \frac{\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta + 1}{-\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta}.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.9 Sinus dwukrotności kąta

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= \sin(\alpha + \alpha) = \\ &= \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = \\ &= 2 \sin \alpha \cos \alpha.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.10 Cosinus dwukrotności kąta

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\cos 2\alpha &= \cos(\alpha + \alpha) = \\ &= \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha = \\ &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.11 Tangens dwukrotności kąta

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} 2\alpha &= \operatorname{tg}(\alpha + \alpha) = \\ &= \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \alpha} = \\ &= \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.12 Cotangens dwukrotności kąta

$$\operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{ctg} \alpha}$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\operatorname{ctg} 2\alpha &= \operatorname{ctg}(\alpha + \alpha) = \\ &= \frac{\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \alpha - 1}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha} = \\ &= \frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{ctg} \alpha}.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.13 Sinus trzykrotności kąta

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\sin 3\alpha &= \sin(2\alpha + \alpha) = \\ &= \sin 2\alpha \cos \alpha + \cos 2\alpha \sin \alpha = \\ &= (2 \sin \alpha \cos \alpha) \cos \alpha + (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \sin \alpha = \\ &= 2 \sin \alpha \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha \sin \alpha - \sin^3 \alpha = \\ &= \cos^2 \alpha (3 \sin \alpha) - \sin^3 \alpha = \\ &= (1 - \sin^2 \alpha)(3 \sin \alpha) - \sin^3 \alpha = \\ &= 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.14 Cosinus trzykrotności kąta

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\cos 3\alpha &= \cos(2\alpha + \alpha) = \\ &= \cos 2\alpha \cos \alpha - \sin 2\alpha \sin \alpha = \\ &= (2 \cos^2 \alpha - 1) \cos \alpha - (2 \sin \alpha \cos \alpha) \sin \alpha = \\ &= (2 \cos^2 \alpha - 1) \cos \alpha - 2 \sin^2 \alpha \cos \alpha = \\ &= (2 \cos^2 \alpha - 1) \cos \alpha - 2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha = \\ &= 2 \cos^3 \alpha - \cos \alpha - 2 \cos \alpha + 2 \cos^3 \alpha = \\ &= 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.15 Tangens trzykrotności kąta

$$\operatorname{tg} 3\alpha = \frac{3 \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} 3\alpha &= \operatorname{tg}(2\alpha + \alpha) = \\ &= \frac{\operatorname{tg} 2\alpha + \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg} 2\alpha \operatorname{tg} \alpha} = \\ &= \frac{\frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} + \operatorname{tg} \alpha}{1 - \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} \operatorname{tg} \alpha} = \\ &= \frac{\frac{2 \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}}{\frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha - 2 \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}} = \\ &= \frac{3 \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 \alpha}.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.16 Cotangens trzykrotności kąta

$$\operatorname{ctg} 3\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^3 \alpha - 3 \operatorname{ctg} \alpha}{3 \operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\operatorname{ctg} 3\alpha &= \operatorname{ctg}(2\alpha + \alpha) = \\&= \frac{\operatorname{ctg} 2\alpha \operatorname{ctg} \alpha - 1}{\operatorname{ctg} 2\alpha + \operatorname{ctg} \alpha} = \\&= \frac{\frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{ctg} \alpha} \operatorname{ctg} \alpha - 1}{\frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{ctg} \alpha} + \operatorname{ctg} \alpha} = \\&= \frac{\frac{(\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1) \operatorname{ctg} \alpha - 2 \operatorname{ctg} \alpha}{2 \operatorname{ctg} \alpha}}{\frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1 + 2 \operatorname{ctg}^2 \alpha}{2 \operatorname{ctg} \alpha}} = \\&= \frac{(\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1) \operatorname{ctg} \alpha - 2 \operatorname{ctg} \alpha}{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1 + 2 \operatorname{ctg}^2 \alpha} = \\&= \frac{\operatorname{ctg}^3 \alpha - \operatorname{ctg} \alpha - 2 \operatorname{ctg} \alpha}{3 \operatorname{ctg}^2 \alpha - 1} = \\&= \frac{3 \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 \alpha}.\end{aligned}$$

c.n.d.

1.17 Sinus kąta połówkowego

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\cos 2\alpha &= 1 - 2 \sin^2 \alpha \\ \sin \alpha &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}}\end{aligned}$$

Zatem

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}.$$

c.n.d.

1.18 Cosinus kąta połówkowego

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

Dowód:

$$\begin{aligned}\cos 2\alpha &= 2 \cos^2 \alpha - 1 \\ \cos \alpha &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}}\end{aligned}$$

Zatem

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

c.n.d.

1.19 Tangens kąta połówkowego

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

Dowód:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} &= \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \\ &= \frac{\pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}}{\pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}} = \\ &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}. \end{aligned}$$

c.n.d.

1.20 Cotangens kąta połówkowego

$$\operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}}$$

Dowód:

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} &= \frac{\cos \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}} = \\ &= \frac{\pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}}{\pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}} = \\ &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}}. \end{aligned}$$

c.n.d.

2 Podsumowanie

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta - 1}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta}$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta + 1}{-\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

$$\operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{ctg} \alpha}$$

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$$

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

$$\operatorname{tg} 3\alpha = \frac{3 \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

$$\operatorname{ctg} 3\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^3 \alpha - 3 \operatorname{ctg} \alpha}{3 \operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

$$\operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}}$$