

安徽大学 2022—2023 学年第二学期

《高等数学 A (二)》期末考试试卷 (B 卷)

考试试题参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、 0 2、 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$ 3、 $\frac{\pi}{2}ae^a$ 4、 $[-1,1]$ 5、 $\frac{\pi^2}{2}$

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6、 C 7、 A 8、 B 9、 A 10、 D

三、计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

11、 【解】 设 $F(x,y,z) = \cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z - 1$, 则

$$F'_x(x,y,z) = -2 \cos x \sin x = -\sin 2x, \quad F'_y(x,y,z) = -2 \cos y \sin y = -\sin 2y,$$

$$F'_z(x,y,z) = -2 \cos z \sin z = -\sin 2z.$$

由隐函数求导公式可得:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{\sin 2x}{\sin 2z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{\sin 2y}{\sin 2z}.$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = -\frac{\sin 2x}{\sin 2z} dx - \frac{\sin 2y}{\sin 2z} dy = -\frac{1}{\sin 2z} (\sin 2x dx + \sin 2y dy)$$

..... 10 分

12、【解】先求出函数在 D 上的所有驻点和偏导数不存在的点, 解方程得:

$$\begin{cases} f'_x(x,y) = 2xy(4-x-y) - x^2y = 0 \\ f'_y(x,y) = x^2(4-x-y) - x^2y = 0 \end{cases}$$

得到区域 D 内的唯一驻点 $(2, 1)$, 且 $f(2,1) = 4$. 再求 $f(x,y)$ 在 D 的边界上的最值.

在边界 $x=0$ 和 $y=0$ 上 $f(x,y)=0$. 在边界 $x+y=6$ 上, 即 $y=6-x$, 于是 $f(x,y)=-2x^2(6-x)$,

故有: $f_x = 4x(x-6)+2x^2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 4 \Rightarrow y = 6 - x|_{x=4} = 2, f(4,2) = -64$

比较后得到 $f(2,1) = 4$ 为最大值, $f(4,2) = -64$ 为最小值.

..... 10 分

13、【解】令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 利用极坐标系, 积分区域表示为

$$D' = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, \pi \leq r \leq 2\pi\}, \text{ 则:}$$

$$\iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \iint_{D'} \sin r \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi}^{2\pi} \sin r \cdot r dr = -6\pi^2$$

..... 10 分

14、【解】因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2a \sin(ax+by) \cos(ax+by) = a \sin 2(ax+by)$, 所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = a \cos 2(ax+by) \bullet 2a = 2a^2 \cos 2(ax+by)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = a \cos 2(ax+by) \bullet 2b = 2ab \cos 2(ax+by)$$

..... 10 分

15、【解】由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} 3 dx dy dz \\ &= 3 \iiint_{\Omega} 1 dx dy dz \\ &= 3 \times \frac{4}{3} \pi a^3 \\ &= 4\pi a^3 \end{aligned}$$

..... 10 分

16、【解】先求幂级数得收敛域, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n+2)x^{2n+1}}{2nx^{2n-1}} \right| = x^2 < 1$, 则:

$-1 < x < 1$ 。当 $x = \pm 1$ 时, 级数发散, 故级数得收敛域为 $(-1, 1)$ 。设和函数为

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2nx^{2n-1}, x \in (-1, 1), \text{ 两边同时求积分可得:}$$

$$\int_0^x s(x) dx = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} 2nx^{2n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x 2nx^{2n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2}, x \in (-1, 1),$$

求导可得:

$$s(x) = \left(\frac{x^2}{1-x^2} \right)' = \frac{2x}{(x^2-1)^2}, x \in (-1,1)$$

..... 10 分

四、证明题（每小题 10 分，共 10 分）

17、【证明】因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} < 1$ ，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 收敛。

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n}$ 绝对收敛

..... 10 分