

Def.:

El conjunto de dobleces posibles es $D = \{a_i, b_j, c_k | i, j \in J_{17}, k \in J_{30}\}$, un conjunto de segmentos de rectas.

Obs.:

Los dobleces que se harán al manifold son elementos del conjunto $D - \{a_1, b_1, a_{17}, b_{17}\}$.

Obs.:

Se ocupan 16 dobleces horizontales y verticales por la configuración 5 y similares.

Obs.:

Todo triángulo de una configuración queda atrapado por exactamente 3 dobleces (trivialmente).

Def.:

Definimos el conjunto de triángulos de un manifold

$$M = \{(a_i, c_j, c_k), (b_i, c_j, c_k), i \in J, j \in J, k = 16 \dots, a_i \cap c_j \neq D, a_i \cap c_j \neq \phi, c_j \cap c_k \neq D, b_i \cap c_j \neq \phi, b_i \cap c_k \neq \phi\}$$

Obs.:

$$M \subseteq D^3$$

Def.:

Consideremos el conjunto de vértices $V = M$ y hacemos que para cada par de vértices adyacentes exista una arista

$$|\pi_1(b) \cap \pi_1(e)| > 1$$

$$|\pi_i(a) \cap \pi_i(e)| \leq 1$$

$$|\pi_1(c) \cap \pi_1(i)| > 1$$

$$|\pi_i(e) \cap \pi_i(f)| \leq 1$$

$$|\pi_3(a) \cap \pi_3(d)| > 1$$

$$|\pi_i(b) \cap \pi_i(d)| \leq 1$$

$$|\pi_i(a) \cap \pi_i(k)| \leq 1$$

$$|\pi_3(b) \cap \pi_3(c)| > 1$$

$$|\pi_2(c) \cap \pi_2(d)| > 1$$

$$E = \{\{u, v\} : |\pi_i(u) \cap \pi_i(v)| > 1, \text{ para algún } i\} \\ \subseteq \{\{u, v\} : u, v \in M\}$$

ese el grafo $G = (V, E)$ que describe la forma de todos los manifolds.

Def.:

Sea $G = (V, E)$ el grafo anterior. Definimos una configuración de un manifold como una función $c : V \rightarrow J_3$ donde los elementos de J_3 representan lo siguiente:

- a) El color 1 se interpreta como blanco
- b) El color 2 se interpreta como negro
- c) El color 3 se interpreta como transparente

tal que $c = 1$ en 32 triángulos, $c = 2$ en 32 y $c = 3$ en 64.

ALGORITMO

1. Se tiene el grafo coloreado

Obs.:

del mismo color representan unión de triángulos

2. Identificar todos los triángulos de cada color.

3. Identificar todos los triángulos de un mismo color conectado.

Def.:

En un grafo $G = (V, E)$ decimos que $u \in V$ es vecino de $v \in V$ si $\exists (u, v) \in E$. decimos que u, v son adyacentes

Def.:

Decimos que el grafo G es conexo si $\forall u \in V, \exists v \in V$ tal que u y v son vecinos

Def.:

Dado un grafo $G = (V, E)$, un subgrafo G' es un par $V' \subseteq V \wedge E' \subseteq E$ con $G' = (V', E')$.

Def.:

Un área o región de un manifold es un subgrafo $G' \subseteq G$ tal que $c(G')$ tiene un solo elemento.

Obs.:

Todos los nodos de un área tienen el mismo color.

Def.:

Un nodo frontera es un $a \in M$ tal que $c(a) \neq c(b)$ para algún nodo $b \in M$ adyacente a a

Def.:

Definimos

$$B = \{b \in M | c(b) = 1\},$$

$$N = \{n \in M | c(n) = 2\},$$

$$T = \{t \in M | c(t) = 3\}$$

Obs.:

B es el conjunto de triángulos blancos, N los negros y T los transparentes.

Obs.: $\{B, N, T\}$ es una partición de M

Def.:

Denotaremos como

$$E_1 = \{\{u, v\} : u, v \in B \wedge |\pi_i(u) \cap \pi_i(v)| > 1, \text{ para algún } i\}$$

$$E_2 = \{\{u, v\} : u, v \in N \wedge |\pi_i(u) \cap \pi_i(v)| > 1, \text{ para algún } i\}$$

$$E_3 = \{\{u, v\} : u, v \in T \wedge |\pi_i(u) \cap \pi_i(v)| > 1, \text{ para algún } i\}$$

Obs.:

Para resolver el problema hay que considerar las componentes conexas de los grafos

$$G_1 = (B, E_1), G_2 = (N, E_2), G_3 = (T, E_3)$$

y sus fronteras.

Def.:

Un área máxima es un área de G que es una componente conexa de G_i para algún i .

4. identificar las áreas maximales y sus fronteras

5. trazar los dobleces de todas las fronteras.