

Metrische Räume

Metrischer Raum: Sei X eine Menge. Eine Metrik auf X ist eine Abbildung $d : X \times X \rightarrow [0, \infty]$ mit

1. $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$
2. $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$
3. $\forall x \in X : d(x, x) = 0$
4. $\forall x, y \in X : d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$

Das Paar (X, d) ist ein metrischer Raum.

Cauchy-Folge: Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in X heißt Cauchy-Folge

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N : d(a_n, a_m) < \varepsilon$$

offen, abgeschlossen: Sei (X, d) ein metrischer Raum.

$U \subseteq X$ heißt offen

$$\Leftrightarrow \forall x \in U : \exists s > 0 : B(x, s) \subseteq U.$$

$A \subseteq X$ heißt abgeschlossen

$$\Leftrightarrow X \setminus A \text{ offen.}$$

Satz: Sei (X, d) ein metrischer Raum. $A \subseteq X$ abgeschlossen

$$\Leftrightarrow \forall (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ in } A : a_n \rightarrow a \text{ in } X \Rightarrow a \in A$$

□

vollständig: Sei (X, d) ein metrischer Raum. X heißt vollständig

$$\Leftrightarrow \text{jede Cauchy-Folge in } X \text{ konvergiert.}$$

Stetigkeit

Stetigkeit: Seien (X, d) und (Y, e) metrische Räume, $f : X \rightarrow Y$, $a \in X$. Dann ist f stetig in a

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x \in X : d(a, x) < \delta \Rightarrow e(f(a), f(x)) < \varepsilon.$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : f(B_X(a, \delta)) \subseteq B_Y(f(a), \varepsilon).$$

Satz: Zwischenwertsatz Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt:

$$\forall A \in \mathbb{R} : f(a) \leq A \leq f(b) \text{ oder } f(b) \leq A \leq f(a) \Rightarrow \exists x \in [a, b] : f(x) = A$$

□

Folgenkompakt: Sei (X, d) ein metrischer Raum. X heißt folgenkompakt

\Leftrightarrow Jede Folge in X besitzt eine konvergente Teilfolge.

Lipschitz-Stetigkeit und gleichmäßige Stetigkeit: Seien (X, d) und (Y, e) metrische Räume, $f : X \rightarrow Y$, $a \in X$. Dann heißt f gleichmäßig stetig

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, x' \in X : d(x, x') < \delta \Rightarrow e(f(x), f(x')) < \varepsilon.$$

Lipschitz-stetig

$$\Leftrightarrow \exists L > 0 : \forall x, x' \in X : e(f(x), f(x')) \leq L \cdot d(x, x').$$

Differentiation

Differenzierbar: Sei $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in D$. f heißt in x differenzierbar

$$\Leftrightarrow \exists f'(x) := \lim_{\xi \rightarrow x, \xi \in D \setminus \{x\}} \frac{f(\xi) - f(x)}{\xi - x}.$$

Satz: von Rolle Sei $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $f(a) = f(b) = 0$, f in (a, b) differenzierbar. Dann gilt:

$$\exists x \in (a, b) : f'(x) = 0.$$

□

Satz: Mittelwertsatz Sei $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, f in (a, b) differenzierbar. Dann gilt:

$$\exists x \in (a, b) : f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

□