

수학 및 연습 2

내용 요약

이재호

jaeho.lee@snu.ac.kr

마지막 수정: 2018년 10월 7일

10 다변수함수

1 그래프와 등위면

1.1 다변수함수

정의 1.1.1. n -공간의 부분집합 U 에서 정의된 함수

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}$$

가 주어졌다고 하자. 즉, U 의 각 점 $X = (x_1, \dots, x_n)$ 에 대하여 실수 $f(X) = f(x_1, \dots, x_n)$ 이 대응된다고 하자. 이때 함수 f 를 n 변수함수라 하고, $n \geq 2$ 이면 다변수함수라고도 한다.

1.2 함수와 그래프

정의 1.2.1. n -공간의 부분집합 U 에서 정의된 다변수함수 f 의 그래프는

$$\{(x_1, \dots, x_n, z) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid (x_1, \dots, x_n) \in U, z = f(x_1, \dots, x_n)\}$$

으로 정의한다.

1.3 일차함수의 기울기

정의 1.3.1. 이변수 일차함수 $z = ax + by + c$ 의 기울기는 기울기 벡터

$$(a, b) = ai + bj$$

로 나타낸다.

정리 1.3.1. 단위벡터 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ 에 대하여, 일차함수

$$z = \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} + c = a_1x_1 + \dots + a_nx_n + c$$

의 \mathbf{v} -방향 기울기는

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} = a_1v_1 + \dots + a_nv_n$$

이다.

Proof. 일차함수 z 의 \mathbf{v} -방향 기울기는

$$\frac{z(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) - z(\mathbf{x})}{t} = \frac{(\mathbf{a} \cdot (\mathbf{x} + t\mathbf{v}) + c) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} + c)}{t} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{v}$$

이다. □

1.4 등위면

정의 1.4.1. n -공간의 한 부분집합 U 에서 정의된 다변수함수 $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ 와 실수 c 에 대하여, f 에 대한 c 의 역상(inverse image)

$$f^{-1}(c) := \{X \in U \mid f(X) = c\}$$

를 f 의 c -등위면(level surface) 또는 c -등가면이라고 부른다. 즉, 등위면은 함숫값이 같은 점들의 모임이다.

2 연속함수

정의 2.0.1. n -공간의 부분집합 U 에서 정의된 함수 $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ 와 U 의 한 점 P 에 대하여

$$\lim_{X \rightarrow P} f(X) = f(P)$$

일 때, f 는 점 P 에서 연속이라고 정의한다. 달리 쓰면,

$$\lim_{X \rightarrow P} |f(X) - f(P)| = 0$$

이다.

2.1 연속함수

정의 2.1.1. 함수 $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ 가 정의역 U 의 모든 점에서 연속이면, f 를 연속함수라고 한다.

2.2 최대최소 정리

2.2.1 유계인 닫힌 집합

정의 2.2.1. 양수 r 에 대하여 n -공간의 한 점 P 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 열린 공(open ball)은

$$\mathbb{B}^n(P, r) := \{X \in \mathbb{R}^n \mid |X - P| < r\}$$

를 뜻한다. 또 n -공간의 한 점 P 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 닫힌 공(closed ball)은

$$\overline{\mathbb{B}}^n(P, r) := \{X \in \mathbb{R}^n \mid |X - P| \leq r\}$$

를 뜻한다.

열린 공 또는 닫힌 공을 그냥 공이라고 하고, 1차원 공은 구간, 2차원 공은 원판이다.

정의 2.2.2. n -공간의 부분 집합 U 가 유계(bounded)라는 것은 U 를 포함하는 공이 존재한다는 뜻이다. 이는 함수

$$U \rightarrow \mathbb{R}, \quad X \mapsto |X|$$

가 유계 함수라는 것과 동치이다.

정의 2.2.3. n -공간에서 경계를 포함하는 부분집합을 닫힌 집합이라고 부른다.

정리 2.2.1 (최대최소 정리). n -공간의 유계인 닫힌 집합에서 정의된 연속함수는 최댓값과 최솟값을 가진다.

3 방향미분과 편미분

정의 3.0.1. n -공간의 열린 집합 U 에서 정의된 함수 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ 와 U 의 한 점 P 및 벡터 v 에 대하여, 극한값

$$D_v f(P) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(P + tv) - f(P)}{t} = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 f(P + tv)$$

가 존재하면 이 값을 점 P 에서 f 의 v -방향미분계수 또는 v -방향 순간변화율이라고 한다. 단위벡터 v 에 대하여 v -방향미분계수의 기하학적 의미는 함수 f 의 그래프를 직선 $P + tv$ 위에 한정하여 그렸을 때, 점 $(P, f(P))$ 에서 f 의 그래프의 기울기를 뜻한다.