

# Álgebra

## Andrey

**Definição 1.**  $\alpha$  e  $\beta$  são conjugados quando, se  $P \in \mathbb{Q}[x]$ , então  $P(\alpha) = 0 \iff P(\beta) = 0$ .

**Definição 2.** Seja  $I_\alpha = \{P \in \mathbb{Q}[x] : P(\alpha) = 0\}$ . O elemento mônico de menor grau em  $I_\alpha$  é o polinômio minimal de  $\alpha$ ,  $P_\alpha$ .

**Definição 3.** Podemos redefinir  $\alpha$  e  $\beta$  conjugados como  $P_\alpha(\beta) = 0$ .

**Lema 1.**  $P_\alpha$  é irredutível.

**Lema 2.**  $Q(\alpha) = 0$  e  $Q$  irredutível  $\implies Q = c \cdot P_\alpha$ .

**Definição 4.**  $P \in \mathbb{Q}[x_1, x_2, \dots, x_n]$  é simétrico se  $P(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \dots, x_{\pi(n)})$ , para toda permutação  $\pi$  de  $\{1, 2, \dots, n\}$ .

**Teorema 3.**  $x_1, x_2, \dots, x_n$ .  $\sigma_k := \sum_{i \in \text{elem}} x_i$ .  $P$  é simétrico  $\iff$  existe  $Q \in \mathbb{Q}[y_1, y_2, \dots, y_n]$   $P(x_1, x_2, \dots, x_n) = Q(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ .

**Corolário.**  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  são conjugados, então  $\sigma_i \in \mathbb{Q}$ .

**Teorema 4.**  $\alpha$  e  $\beta$  são algébricos, então  $\alpha + \beta$ ,  $\alpha\beta$ ,  $\alpha^{-1}$  e  $\alpha^2$  são algébricos.  
Tem muitos jeitos de provar.

**Definição 5.** (Extensão de Corpo)

**Definição 6.** (Grau de uma Extensão) Dimensão de  $K$ , visto como espaço vetorial em  $\mathbb{R}$

**Problema 1.** (OBM 2017) Seja  $a$  inteiro positivo e  $p$  um divisor primo de  $a^3 - 3a + 1$ , com  $p \neq 3$ . Prove que  $p$  é da forma  $9k + 1$  ou  $9k - 1$ , sendo  $k$  um inteiro.

**Teorema 5.**  $\Phi_n$  é irredutível.

**Lema 6.**  $\Phi_p$  é irredutível.

**Lema 7.** (Critério de Eisenstein)

**Lema 8.**  $\Phi_{2^n}$  é irredutível.

*Demonstração.* Vamos mostrar que, se  $\omega$  é raiz de  $x^{2^{n-1}} + 1$ , então  $P_\omega = P_{\omega^3} = P_{\omega^5} = P_{\omega^7}$ .

**Lema 9.** Seja  $a \in \mathbb{Z}_{2^n}^\times$ , existe  $m$  tal que  $a \equiv 3^m$  ou  $a \equiv 5^m$  ou  $a \equiv 7^m$ .

**Problema 2.** Seja  $f \in \mathbb{Q}[x]$  não constante. Se  $\alpha^3 - 3\alpha + 1 = f(\alpha)^3 - 3f(\alpha) + 1 = 0$ . Prove que  $(f^n(\alpha))^3 - 3f^n(\alpha) + 1 = 0$ .

**Problema 3.** Seja  $n$  ímpar e  $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$  distintos. Prove que  $(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1$  é irredutível em  $\mathbb{Q}[x]$ .

**Lema 10.** (Lema de Gauss)

**Problema 4.** (IMO 1993) **Problema math/imo/1993/1 não encontrado!**

**Problema 5.** Existe  $P \in \mathbb{Z}[x]$ , irredutível em  $\mathbb{Z}[x]$ , mas redutível em  $\mathbb{Z}_q[x]$ , para todo  $q$  primo.

*Solução.*  $P(x) = x^4 - 10x^2 + 1$ .

**Problema 6.** Prove que, para todo  $n$ , existe  $f \in \mathbb{Z}_p[x]$  irredutível tal que o grau de  $f$  é  $n$ .

**Problema 7.** Prove que, se  $d$  divide  $a^4 + a^3 + 2a^2 - 4a + 3$ , então  $d \equiv x^4 \pmod{13}$ .