

Se  $f_1, f_2 \in A$ , então existe  $f_3 \in A$  tq:

$$f_1(f_2(y) - x) + 2x = f_3(x+y).$$

Prove que,  $\forall f \in A, x \in \mathbb{R}$ .

$$f(x - f(x)) = 0.$$

Solução parcial:

Primeiramente, note que temos não apenas a solução trivial  $A = \{x\}$ , como também

$$A = \{x+c, c \in \mathbb{R}\} \text{ ou } A = \{x+c, c > 0\}.$$

Tomando  $f_1 = f_2$  e  $x=0$ , vemos que

$$f_1 \circ f_1 = f_3 \in A.$$

Mais geralmente por indução

$$\forall f \in A, f \circ f \circ \dots \circ f \in A.$$

Além disso, tomando  $x=0$  na equação original, ficamos com  $f_3 = f_1 \circ f_2$  e

Nosso problema se torna

$$\forall f_1, f_2 \in A:$$

$$f_1(f_2(y) - x) + 2x = f_3(x+y) \subseteq f_1 \circ f_2 \in A.$$

Então temos uma equação funcional fixada.

Além disso, tomando

$$x = \frac{f_1(f_2(0))}{2} \text{ e } y = -x,$$

vemos que toda função  $f \in A$  possui zero.

Suponha que  $\exists f \in A$  não injetiva. Então

$$f(y) = f(\tilde{y}) \text{ e } \exists f_3 \in A \text{ tq}$$

$$f_3(x+y) = f(f(y) - x) + 2x$$

$$= f(f(\tilde{y}) - x) + 2x$$

$$= f_3(x+\tilde{y}).$$

$\therefore f_3$  é periódica

$$f_3(x) = f_3(x+k)$$

$$f_1 \circ f_2 = f_3. \quad p(-x, x):$$

$$f(f(x) + x) - 2x = f(f(0))$$

$$f(0) = 2x + f(f(0))$$

todos os reais

$\Rightarrow f$  é sobrejetora.

$$\underbrace{f \circ f(f_2(y) - x)}_{\text{periódico}} + 2x = \underbrace{f_3(x+y)}_{\text{Periódico}}$$

$$x = ak.$$

$$\underbrace{f_3(f_2(y))}_{cte} + \underbrace{2ak}_{\text{varia}} = \underbrace{f_3(y)}_{cte}$$

Algo legal:

$$\textcircled{1} f_1 = f; \quad f_2 = f \circ f$$

$$f(f(f(y)) - x) + 2x = f(f(f(x+y)))$$

$$\textcircled{2} f_1 = f \circ f \quad f_2 = f$$

$$f(f(f(y) - x) + 2x = f(f(f(x+y)))$$

$$\Rightarrow f(f(t) - x) = f(f(t-x)),$$

$$\forall t \in \text{Im}, x \in \mathbb{R}.$$

SE  $f$  INJETORA:

$$f(t) - x = f(t-x),$$

$$\forall t \in \text{Im}, x \in \mathbb{R}.$$

$$x = f(t):$$

$$0 = f(t - f(t)), \forall t \in \text{Im}$$

$$f_3(x) = f_1(f_2(x))$$

$$x = -y \rightarrow f_1(f_2(y) + y) - 2y = f_1(f_2(0))$$

$$x = f_2(y):$$

$$f_1(0) + 2f_2(y) = f_3(f_2(y) + y)$$

$$\rightarrow f_3(f_2(y) + y) = 2y + f_3(f_2(0))$$

$$\text{Logo } f_2(y) = y + b, \quad b \in \mathbb{R}$$