





## Problemas sabor Combinatória

**Aviso aos alérgicos:** Pode conter Álgebra, Geometria e Teoria dos Números. Não contém glúten.

Guilherme Zeus Dantas e Moura  
zeusdanmou@gmail.com

- (2017 Miklós Schweitzer, 1 )** É possível dividir um quadrado em finitos triângulos de forma que nenhum par de triângulos compartilhe um lado? (Os interiores de qualquer par de triângulos não se intersectam, e a união de todos os triângulos é o quadrado.)
- (2020 Miklós Schweitzer, 1 )** Seja  $\mathbb{N}$  o conjunto dos inteiros positivos. Seja  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  o conjunto de todas as seqüências  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots)$  de inteiros positivos. Dizemos que duas seqüências  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  são *completamente diferentes* se  $x_n \neq y_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Seja  $F: \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{N}$  uma função tal que:
  - $F(\mathbf{x}) \neq F(\mathbf{y})$  para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  completamente diferentes;
  - $F((k, k, \dots)) = k$  para qualquer  $k \in \mathbb{N}$ .
 Prove que existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $F(\mathbf{x}) = x_n$  para todas seqüências  $\mathbf{x}$ .
- (Banco IMO 2009, C5)** Cinco baldes vazios idênticos de 2 litros de capacidade estão localizados nos vértices de um pentágono regular. Bean e Dagmær passam por uma seqüência de rodadas: no início de cada rodada, Dagmær pega um litro de água do rio próximo e distribui arbitrariamente nos cinco baldes. Bean escolhe um par de baldes vizinhos, esvazia-os no rio e os coloca de volta em suas posições. Então a próxima rodada começa. Dagmær quer fazer um desses baldes transbordar. Dagmær consegue forçar que isso aconteça?
- (Putnam 2020, B2 )** Sejam  $k$  e  $n$  inteiros com  $1 \leq k < n$ . Elfo e Luci jogam um jogo com  $k$  bolas e uma seqüência de  $n$  buracos. No começo do jogo, as bolas ocupam os  $k$  buracos mais à esquerda. Um movimento legal consiste em mover uma única bola para qualquer buraco vazio à direita da posição original da bola. Os jogadores alternam os movimentos, com Elfo jogando primeiro. O jogo termina quando as bolas estão nos  $k$  buracos mais à direita, de forma que o próximo jogador não pode jogar e portanto perde o jogo. Para quais valores de  $n$  e  $k$  Elfo possui uma estratégia vencedora?

## Problemas para os que estão entediados

- (Banco IMO 2014, C2)** Temos  $2^m$  folhas de papel. Em cada folha, o número 1 está escrito. A seguinte operação é definida: duas folhas distintas são escolhidas; se os números nas folhas são  $a$  e  $b$ , então apagamos esses números e escrevemos o número  $a + b$  em ambas as folhas. Prove que após  $m2^{m-1}$  operações, a soma dos números em todas as folhas é pelo menos  $4^m$ .
- (Banco IMO 2014, C4)** Construa um tetrominó anexando dois dominós  $2 \times 1$  ao longo de seus lados mais longos, de forma que o ponto médio do lado mais longo de um dominó seja um canto do outro dominó. Esta construção produz dois tipos de tetrominós com orientações opostas. Vamos chamá-los de S- e Z-tetrominós.  
Suponha que um polígono reticulado  $P$  pode ser particionado por S-tetrominós. Prove de qualquer modo que particionarmos  $P$  usando somente S- e Z-tetrominós, sempre usaremos um número par de Z-tetrominós.
- (Banco IMO 2009, C4)** Seja  $m \geq 1$  um inteiro positivo. Considere as partições de um tabuleiro de xadrez  $2^m \times 2^m$  em retângulos formados por quadradinhos do tabuleiro, nas quais cada um dos  $2^m$  quadradinhos da diagonal formam um retângulo isolado na partição. Determine a menor soma de perímetros dos triângulos dentre tais partições.
- (2008 Miklós Schweitzer, 3 )** Um grafo bipartido, com  $\{x_1, \dots, x_n\}$  e  $\{y_1, \dots, y_n\}$  sendo os conjuntos de vértices (ou seja, as arestas são da forma  $x_i y_j$ ) é *domesticado* se não possui caminho  $x_i y_j x_k y_l$  ( $i, j, k, l \in \{1, \dots, n\}$ ) em que  $j < l$  e  $i + j > k + l$ . Calcule o ínfimo do conjunto dos reais  $\alpha$  para os quais existe uma constante  $c = c(\alpha) > 0$  tal que, para todos os grafos domesticados e  $\leq cn^\alpha$ , onde  $e$  é o número de arestas e  $n$  é metade do número de vértices.