Questões Variadas (ou não tão variadas assim) Guilherme Zeus Moura

zeusdanmou@gmail.com

As questões **não** estão em ordem de dificuldade. Aproveite para treinar a escrever as soluções de maneira organizada. Faça os desenhos de geometria com *réqua e compasso*.

Problema 1 (Reino Unido 2017, Fase 1) Os inteiros 1, 2, 3, ..., 2016 são escritos na base 10, cada um aparecendo exatamente uma vez. Cada um dos algarismos de 0 a 9 aparece várias vezes nessa lista. Quantos algarismos dessa lista são ímpares? Por exemplo, 8 dígitos ímpares aparecem na lista 1, 2, 3, ..., 11.

Problema 2 (Reino Unido 2017, Fase 1) Para cada real positivo x, definimos $\{x\}$ como o maior dos números x e 1/x, com 1 = 1. Ache todos os reais positivos y tais que:

$$5y\{8y\}\{25y\} = 1.$$

Problema 3 (Reino Unido 2019, Fase 2) Seja ABC um triângulo. Seja ℓ a reta por B perpendicular a AB. A reta perpendicular a BC que passa por A encontra ℓ no ponto D. A mediatriz de BC encontra ℓ no ponto P. Seja E o pé da perpendicular de D em AC. Prove que BPE é isósceles.

Problema 4 (Reino Unido 2017, Fase 1) Determine todos os pares (m, n) de inteiros positivos que satisfazem a equação:

$$n^2 - 6n = m^2 + m - 10.$$

Problema 5 (Reino Unido 2017, Fase 1) Naomi e Tom jogam um jogo, Naomi começando. A cada turno, cada um escolhe um inteiro entre 1 e 100, cada vez escolhendo um inteiro que ninguém escolheu antes. Um jogador perde se, no fim de seu turno, a soma de todos os inteiros escolhidos desde o começo do jogo (por ambos os jogadores) não pode ser escrito como diferença de quadrados. Determine se um dos jogadores tem uma estratégia vencedora, e caso tenha, qual é.

Problema 6 (Reino Unido 2019, Fase 2) Seja n um inteiro. n^2 peças mágicas de xadrez se organizam num tabuleiro $n^2 \times n^2$ composto por n^4 quadradinhos unitários. Após um sinal, todas as peças de xadrez se teleportam para outro quadradinho do tabuleiro, tal que a distância entre os centros do novo e do antigo quadrado é exatamente n. As peças de xadrez ganham, se e somente se, antes e após o sinal, não tem duas peças na mesma linha ou na mesma coluna. Para quais valores de n, as peças de xadrez ganham?

Problema 7 (Reino Unido 2017, Fase 1) Seja ABC um triângulo com $\angle A < \angle B < 90^\circ$ e seja Γ o círculo que passa por A, B e C. As tangentes a Γ por A e C se intersectam em P. As retas AB e PC se intersectam em Q. É dado que

$$[ACP] = [ABC] = [BQC].$$

Prove que $\angle BCA = 90^{\circ}$.

Problema 8 (Reino Unido 2017, Fase 1) Inteiros positivos consecutivos m, m+1, m+2 e m+3 são divisíveis por inteiros positivos ímpares consecutivos n, n+2, n+4 e n+6, respectivamente. Determine o menor m possível em termos de n.

Problema 9 (Reino Unido 2019, Fase 2) Seja p um primo ímpar. Quantos subconjuntos não-vazios de $\{1, 2, 3, \dots, p-2, p-1\}$ tem soma divisível por p?

Problema 10 (Reino Unido 2019, Fase 2) Ache todas as funções $f: \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) \leq f(y)$ sempre que $x \leq y$ e

$$f(x^4) + f(x^2) + f(x) + f(1) = x^4 + x^2 + x + 1$$

para todo x > 0.