

# **Geometria no Plano Projetivo**

# Sumário

<b>I. Abordagem Axiomática</b>	<b>4</b>
<b>1. A reta real não tem harmonia</b>	<b>5</b>
1.1. Divisão Harmônica . . . . .	5
<b>2. Definindo o Plano Projetivo</b>	<b>6</b>
2.1. Plano Euclidiano . . . . .	6
2.2. Plano Projetivo . . . . .	7
2.2.1. Plano Projetivo Real . . . . .	8
<b>II. Abordagem com Álgebra Linear</b>	<b>9</b>
<b>3. Álgebra Linear</b>	<b>10</b>
3.1. Algumas definições . . . . .	10
3.2. Até que enfim Espaço . . . . .	11
3.2.1. Coisas relacionadas com base . . . . .	12
<b>4. Reta Projetiva</b>	<b>15</b>
<b>5. Plano Projetivo</b>	<b>16</b>
<b>6. Projeções e Projetividades</b>	<b>17</b>
<b>7. Cônicas e Polaridades</b>	<b>18</b>

# Preâmbulo

Este livro de geometria projetiva é um compilado do aprendizado dos autores em diversos cursos de geometria projetiva lecionados pelo Prof. Luciano Guimarães Monteiro de Castro, tanto na Academia Matematicamente, quanto na Escola Eleva. É uma tentativa de continuação do artigo [\[1\]](#).

O foco desse livro é explorar as aplicações de geometria projetiva sobre espaços reais para resolver problemas de olimpíadas, para isso é necessário que o leitor tenha alguma familiaridade com álgebra linear.

**Parte I.**

**Abordagem Axiomática**

# 1. A reta real não tem harmonia

## 1.1. Divisão Harmônica

**Exercício 1.1.** *Dados dois pontos  $A$  e  $B$  distintos na reta real, marque, com régua e compasso, todos os pontos  $P$  na reta real tais que  $\frac{AP}{BP} = 2$ .*

Você observará que existem dois pontos, digamos  $P$  e  $Q$  — um dentro do segmento  $AB$  e o outro fora do segmento  $AB$  — tais que  $\frac{AP}{BP} = \frac{AQ}{BQ} = 2$ .

Por terem essa propriedade, dizemos que  $P$  e  $Q$  dividem  $A$  e  $B$  harmonicamente, na razão 2.

Não há nada especial com o número 2; *parece* que, dado qualquer  $\lambda$  real positivo, existem sempre dois pontos que dividem  $A$  e  $B$  harmonicamente na razão  $\lambda$ ... Na verdade, tem um valor de  $\lambda$  para o qual isso não é verdade.

**Exercício 1.2.** *Dados dois pontos  $A$  e  $B$  distintos na reta real, marque, com régua e compasso, todos os pontos  $P$  na reta real tais que  $\frac{AP}{BP} = 1$ .*

Você observará que somente um ponto possui a propriedade acima; o ponto médio do segmento  $AB$ . Não existe ponto fora do segmento  $AB$  com essa propriedade — de fato, um dos segmentos  $AP$  ou  $BP$  estará contido no outro, e portanto um será menor que o outro.

## 2. Definindo o Plano Projetivo

### 2.1. Plano Euclidiano

Você talvez esteja acostumado com a noção do Plano Euclidiano. Essa estrutura envolve muitos conceitos, incluindo (mas não limitado a):

- pontos,
- retas,
- segmentos de reta,
- distância,
- ângulos,
- polígonos (triângulos, quadriláteros, ...),
- circunferências,
- transformações (rotações, translações, reflexões, ...).

Apesar de todas esses conceitos estarem empacotados no Plano Euclidiano, parece que os conceitos mais fundamentais são os primeiros dessa lista. Em outras palavras, os conceitos de *pontos* e *retas* parecem ser mais simples e mais relacionados à definição de Plano Euclidiano, do que os conceitos de *ângulos* e *transformações*.

Nós poderíamos gastar algumas folhas formalizando a definição de Plano Euclidiano (usando o que os matemáticos chamam de *axiomas*) e nos convencer de que, de fato, *pontos* e *retas* são intimamente relacionados ao que realmente o Plano Euclidiano é. Porém, nós preferimos não fazer isso. Na verdade, vamos listar duas propriedades que o Plano Euclidiano *parece* ter:

- (i) Para cada par de pontos distintos, existe uma única reta passando por ambos.
- (ii) Para cada par de retas distintas, existe um único ponto que está em ambas.

**Exercício 2.1.** *Descubra se as propriedades acima são verdades ou não no Plano Euclidiano.*

## 2.2. Plano Projetivo

No Exercício 2.1, você talvez tenha notado que, embora a propriedade (i) seja verdadeira, (ii) não é. Existe até um nome especial para um par de retas que não se encontra em nenhum ponto: dizemos que essas retas são *retas paralelas*.

Mas... as propriedades (i) e (ii) são tão bonitas (pelo menos pra nós). É tão triste que elas não são verdadeiras. Bem, nós somos matemáticos! Nós podemos fazer o que quisermos com nossas definições (apesar de ter que viver com suas consequências).

**Proposta de Definição 2.1.** Um *plano projetivo* é uma estrutura que consiste em três coisas:

- um conjunto  $\mathcal{P}$  de pontos,
- um conjunto  $\mathcal{L}$  de retas, e
- uma noção de incidência, i.e., se  $P$  é um ponto e  $\ell$  é uma reta, nós poderemos dizer se  $\ell$  passa (ou não) pelo ponto  $P$ .

Adicionalmente, precisamos das seguintes propriedades:

- (i) Para cada par de pontos distintos, existe uma única reta passando por ambos.
- (ii) Para cada par de retas distintas, existe um único ponto que está em ambas.

Essa proposta de definição é muito boa, porém ela aceita noções de planos projetivos bastante distintos do plano euclidiano.

**Exemplo 1.** Considere  $\mathcal{P}$  um conjunto qualquer de pontos, e  $\mathcal{L} = \{\ell\}$  um conjunto contendo uma única reta  $\ell$ . Defina a noção de incidência de modo que qualquer ponto esteja na reta  $\ell$ . Ambas as propriedades (i) e (ii) são satisfeitas; portanto essa estrutura é um plano projetivo pela Definição 2.1.

**Exemplo 2** (Plano de Fano). Seja  $\mathcal{P} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  e  $\mathcal{L} = \{\ell_0, \ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4, \ell_5, \ell_6\}$ . Defina a noção de incidência de modo que

$$\begin{aligned}\ell_0 &= \{0, 1, 3\} \\ \ell_1 &= \{1, 2, 4\} \\ \ell_2 &= \{2, 3, 5\} \\ \ell_3 &= \{3, 4, 6\} \\ \ell_4 &= \{0, 4, 5\} \\ \ell_5 &= \{1, 5, 6\} \\ \ell_6 &= \{0, 2, 6\}.\end{aligned}$$

Você consegue verificar que ambas as propriedades (i) e (ii) são satisfeitas; portanto essa estrutura é um plano projetivo pela Definição 2.1.

### 2.2.1. Plano Projetivo Real

Considere  $\mathcal{P}$  consistindo de todos os pontos do plano euclidiano; vamos também adicionar um ponto (que não está no plano euclidiano) para cada feixe de retas paralelas do plano euclidiano; isto é, além dos pontos convencionais do plano euclidiano, para cada direção, existe um ponto novo — que chamaremos de ponto no infinito relacionado a essa direção.

Considere  $\mathcal{L}$  consistindo de todas as retas do plano euclidiano, com a diferença que essa reta também irá incidir no ponto do infinito relacionado a sua direção. Além disso, também adicionaremos uma reta em  $\mathcal{L}$  que contém todos os pontos do infinito — que chamaremos de reta do infinito.

Apesar de ser confuso, vamos tentar verificar as condições (i) e (ii).

Para a condição (i), vamos dividir nas possibilidades para os pares de pontos.

- Dados dois pontos  $P$  e  $Q$  do plano euclidiano, sabemos que há uma única reta que passa por eles no plano euclidiano; a mesma reta passará por eles na nova estrutura proposta.
- Dado um ponto  $P$  do plano euclidiano, e um ponto  $Q_\infty$  do infinito, sabemos que há uma única reta que passa por  $P$  e está na direção relacionada ao ponto  $Q_\infty$ . A reta análoga a esta passará por  $P$  e  $Q_\infty$  na nova estrutura proposta.
- Dados dois pontos  $P_\infty$  e  $Q_\infty$  do infinito, a chamada reta do infinito é a única reta que passa por ambos na estrutura proposta.

Para a condição (ii), vamos dividir nas possibilidades para os pares de retas.

- Dadas duas retas  $\ell_1$  e  $\ell_2$  concorrentes no plano euclidiano, sabemos que há um único ponto em ambas no plano euclidiano; o mesmo ponto estará em ambas as retas na nova estrutura proposta.
- Dadas duas retas  $\ell_1$  e  $\ell_2$  paralelas no plano euclidiano, o ponto do infinito relacionado a sua direção estará em ambas as retas na nova estrutura proposta.
- Dadas uma reta  $\ell_1$  no plano euclidiano e a reta  $\ell_\infty$  do infinito, o ponto do infinito relacionado a direção de  $\ell_1$  estará em ambas as retas na nova estrutura proposta.

Portanto, essa nova estrutura é um plano projetivo, é muito similar ao plano euclidiano — de fato, é o plano euclidiano mais alguns pontos e uma reta. Chamamos essa estrutura de plano projetivo real.



**Parte II.**

## **Abordagem com Álgebra Linear**

## 3. Álgebra Linear

### 3.1. Algumas definições

Antes de partirmos para o tópico principal é necessário que algumas definições estejam claras.

**Definição 3.1.**  $f$  é uma função do conjunto  $A$  no conjunto  $B$  (denota-se  $f : A \rightarrow B$ ) se:

$$f \subset A \times B \text{ tal que } \forall a \in A \exists! b \in B \mid (a, b) \in f$$

Denotamos  $f(a) = b \iff (a, b) \in f$

**Definição 3.2.** Uma operação binária "*estrela*" em um conjunto  $A$  é, por definição, uma função de  $A$  cartesiano  $A$  em  $A$ , ou em matematicas:

$$\star : A \times A \rightarrow A$$

Denotamos  $a \star b = c \iff \star(a, b) = c$

Vale uma observação que pela nossa definição de função seria justo que estivesse escrito  $\star((a, b))$ , já que o elemento no qual aplicamos a função é o  $(a, b)$ , mas por uma certa comodidade ou talvez preguiça omitimos um dos parenteses.

**Definição 3.3.** Um corpo  $\mathbb{K}$  é um conjunto e duas operações, usualmente chamadas de adição e multiplicação, ou seja  $\mathbb{K} = \{C, +, \cdot\}$ . Essas operações tem que ter algumas propriedades, sendo elas, para  $a, b, c \in C$ :

1. Associativa:

$$a + (b + c) = (a + b) + c \quad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c = a \cdot b \cdot c$$

2. Comutativa:

$$a + b = b + a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

### 3. Álgebra Linear

3. Elemento neutro:

$$\exists e \in C \mid \forall a \in C, a + e = e + a = a$$

$$\exists e' \in C \mid \forall a \in C, a \cdot e' = e' \cdot a = a$$

4. Inverso:

$$\forall a \in C \exists a' \in C \mid a + a' = a' + a = e$$

$$\forall a \neq e \in C \exists a' \in C \mid a \cdot a' = a' \cdot a = e'$$

5. Distributiva

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + a \cdot b$$

É usual chamar o  $e$  de 0, o  $e'$  de 1, o inverso aditivo de  $a$  de  $-a$  e o multiplicativo de  $a^{-1}$  mesmo quando não estamos falando dos números reais. Além disso também é usual denotarmos  $a \in \mathbb{K}$  ao invés de  $a \in C$ .

Dadas essas definições são bons exercícios mostrar que, para  $a, b, c \in \mathbb{K}$ :

1.  $a \cdot (-1) = -a$

2.  $a \cdot 0 = 0$

### 3.2. Até que enfim Espaço

**Definição 3.4.** Um espaço vetorial  $V$  sobre o corpo  $\mathbb{K}$  é um conjunto munido de duas operações,  $\oplus$  e  $\odot$ . Sendo  $\oplus : V \times V \rightarrow V$  e  $\odot : \mathbb{K} \times V \rightarrow V$

Sendo que estas possuem algumas propriedades, para  $v, u, w \in V$  e  $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ , temos:

1. Associativa em  $\oplus$  e  $\odot$

$$v \oplus (u \oplus w) = (v \oplus u) \oplus w$$

$$\alpha \odot (\beta \odot v) = \beta \odot (\alpha \odot v) = (\alpha \cdot \beta) \odot v$$

2. Comutativa em  $\oplus$

$$v \oplus u = u \oplus v$$

3. Elemento neutro

$$\exists e \in V \mid \forall v \in V, v \oplus e = e \oplus v = v, \text{ usualmente denotamos esse elemento como } 0.$$

$$1 \odot v = v, \text{ sendo } 1 \text{ o elemento neutro da multiplicação em } \mathbb{K}.$$

4. Inverso

$$\forall v \in V, \exists v' \in V \mid v \oplus v' = e \text{ usualmente denotamos } v' \text{ por } -v$$

### 3. Álgebra Linear

#### 5. Distributiva

$$(\alpha + \beta) \odot v = \alpha \odot v \oplus \beta \odot v$$

$$\alpha \odot (v \oplus u) = \alpha \odot v + \alpha \odot u$$

Vale observar, que como em corpos, também é usual simplificarmos um pouco a notação, usando o mesmo símbolo para soma (+) e o produto por escalar é usualmente denotado apenas pela justaposição dos elementos do corpo e do espaço ( $\alpha v$ ), ainda no produto vale ressaltar que só está definido  $\alpha v$ , logo sempre que estiver escrito  $v\alpha$ , queremos dizer  $\alpha v$ .

Em resumo, tudo que der pra escrever menos, nós vamos escrever menos.

São bons exercícios mostrar que:

1.  $0v = 0$
2.  $(-1)v = -v$

**Definição 3.5.** Chamamos o espaço vetorial  $V'$  de um subespaço de  $V$  se:

1.  $V'$  está definido sobre o mesmo corpo.
2.  $\forall v \in V', v \in V$
3. As operações de  $V'$  são as operações de  $V$  com o domínio e contradomínio restritos à  $V'$ .

#### 3.2.1. Coisas relacionadas com base

As definições a seguir podem parecer um pouco desconexas separadas, contudo após elas todas estarem claras, o motivo da existência de cada uma fica mais claro também.

**Definição 3.6.** Falamos que o vetor  $u$  é uma combinação linear entre os vetores  $v_1, v_2, \dots, v_n$ , quando quando existe  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$  tal que  $u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ .

**Definição 3.7.** Chamamos os vetores  $v_1, v_2, \dots, v_n$  de linearmente independentes quando nenhum deles podem ser escritos como uma combinação linear dos outros vetores.

**Corolário 3.8.**  $v_1, v_2, \dots, v_n$  são LI (linearmente independentes)  $\iff \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ .

**Definição 3.9.** Um espaço  $V'$  gerado pelos vetores  $v_1, v_2, \dots, v_n$  de  $V$  é o menor subespaço de  $V$  que contém  $v_1, v_2, \dots, v_n$ .

Obs.: "Menor" significa que não existe nenhum subespaço que contenha esses vetores e esteja contido em  $V'$ , tirando o próprio  $V'$ .

### 3. Álgebra Linear

**Lema 3.10.** *O espaço gerado pelos vetores  $v_1, v_2, \dots, v_n$  é o conjunto de todas as possíveis combinações lineares entre eles.*

*Demonstração.* Como  $V'$  é um subespaço, ele é fechado na operação, com isso temos que  $\alpha v_i \in V'$  para todo  $\alpha \in \mathbb{K}$ , e como se  $v, u \in V'$  então  $v + u \in V'$  temos que os vetores da forma  $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$  tem que estar em  $V'$ , como isso configura um espaço pois satisfaz todas as propriedades, como por exemplo ter 0 e ter inverso, e como todo subespaço que contém  $v_1, v_2, \dots, v_n$  contém as combinações lineares deles,  $V'$  é necessariamente o menor.  $\square$

Vale observar que se eu adicionar ao conjunto de vetores  $v_1, v_2, \dots, v_n$  algum vetor  $u$  tal que  $u$  é uma combinação linear entre os  $v$ 's temos que o espaço gerado por  $v_1, v_2, \dots, v_n$  e  $v_1, v_2, \dots, v_n, u$  é o mesmo pois adicionamos alguém que já estava lá. Com isso temos:

**Definição 3.11.** Chamamos de base de  $V$  qualquer conjunto de vetores LI de  $V$  tal que o espaço gerado por esse conjunto é  $V$ .

**Lema 3.12.** *Se  $v_1, v_2, \dots, v_n$  é uma base de  $V$  então  $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n, v_2, \dots, v_n$  também é uma base de  $V$  se  $\alpha_1 \neq 0$*

*Demonstração.* Primeiro vamos mostrar que  $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n, v_2, \dots, v_n$  são linearmente independentes:

Suponha que existem  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$  tal que  $\beta_1 \cdot (\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) + \beta_2 \cdot v_2 + \dots + \beta_n \cdot v_n = 0$ , ou seja  $(\beta_1 \cdot \alpha_1) \cdot v_1 + (\beta_1 \cdot \alpha_2 + \beta_2) \cdot v_2 + \dots + (\beta_1 \cdot \alpha_n + \beta_n) \cdot v_n = 0$ , como  $v_1, v_2, \dots, v_n$  são linearmente independentes temos que  $\beta_1 \cdot \alpha_1 = \beta_1 \cdot \alpha_2 + \beta_2 = \dots = \beta_1 \cdot \alpha_n + \beta_n = 0$ , como  $\alpha_1 \neq 0$  temos que  $\beta_1 = 0$  o que implica  $\beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_n = 0$ , e assim temos que  $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n, v_2, \dots, v_n$  são linearmente independentes.

Agora vamos mostrar que esses vetores  $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n, v_2, \dots, v_n$  geram o espaço inteiro:

Queremos mostrar que para todo vetor  $u$  em  $V$ ,  $u$  é gerado pelos vetores, ou seja, existe  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$  elementos do corpo  $\mathbb{K}$ , tal que  $u = \gamma_1(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n) + \gamma_2 v_2 + \dots + \gamma_n v_n$ , arrumando a equação temos  $u = (\gamma_1 \cdot \alpha_1) v_1 + (\gamma_1 \cdot \alpha_2 + \gamma_2) v_2 + (\gamma_1 \cdot \alpha_3 + \gamma_3) v_3 + \dots + (\gamma_1 \cdot \alpha_n + \gamma_n) v_n$ , contudo como  $v_1, v_2, \dots, v_n$  é uma base temos que existe  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$  tal que  $\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n = u$ , com isso temos que  $\gamma_1 = \beta_1 \cdot \alpha_1^{-1}$  e  $\gamma_i = \beta_i - \beta_1 \cdot \alpha_1^{-1} \cdot \alpha_i$  para  $i > 1$ .

Como  $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n, v_2, \dots, v_n$  geram o espaço todo e além disso são linearmente independentes, temos que eles formam uma base.  $\square$

### 3. Álgebra Linear

**Teorema 3.13.** *Dado um espaço vetorial  $V$  sobre  $\mathbb{K}$ , todas as suas bases possuem o mesmo número de vetores.*

*Demonstração.* Suponha que existem duas bases com tamanhos distintos, seja  $v_1, v_2, \dots, v_n$  a menor base de  $V$  e  $u_1, u_2, \dots, u_m$  outra base de  $V$ , com isso  $m > n$ . Como  $v_1 \in \mathbb{K}$ , temos que existe  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$  tal que  $v_1 = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n$ . Como  $v_1$  é não nulo, temos que para algum  $i$ ,  $\alpha_i$  é diferente de 0, sem perda de generalidade suponha  $\alpha_1 \neq 0$  pelo lema 3.12, temos que  $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n, u_2, \dots, u_m$  é uma base, ou seja,  $v_1, u_2, \dots, u_m$  é uma base.

Como  $v_2 \in V$  temos que existem  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$  tal que  $\beta_1 v_1 + \beta_2 u_2 + \dots + \beta_n v_n = v_2$ . Se  $\beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n$  forem todos nulos, então temos que  $v_1, v_2, \dots, v_n$  são linearmente dependentes. Isso é um absurdo pois eles formariam uma base, logo existe  $i > 1$  com  $\beta_i \neq 0$ . Suponha, sem perda de generalidade, que  $\beta_2 \neq 0$ . Pelo lema 3.12, temos que  $v_1, \beta_1 v_1 + \beta_2 u_2 + \dots + \beta_n v_n, u_3, \dots, u_m$  é uma base, ou seja  $v_1, v_2, u_3, \dots, u_m$  é uma base.

Podemos continuar esse processo indutivamente assim obtemos que  $v_1, v_2, \dots, v_n, u_{n+1}, \dots, u_m$  é uma base, contudo como  $v_1, v_2, \dots, v_n$  é uma base, temos que eles geram  $u_m$ , com isso  $v_1, v_2, \dots, v_n, u_{n+1}, \dots, u_m$  são linearmente dependentes. Com isso temos um absurdo pois eles formam uma base, logo temos que as bases não podem ter tamanhos diferentes.  $\square$

## 4. Reta Projetiva

Inicialmente definiremos o que são os pontos projetivos a partir do  $\mathbb{R}^2$ :

**Definição 4.1** (Ponto Projetivo). Vamos definir uma relação de equivalência  $\sim$  entre vetores do  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ , onde dizemos que  $(a, b) \sim (c, d)$  se, e somente se, existe real não nulo  $\lambda$  tal que

$$(a, b) = \lambda(c, d).$$

Denotaremos então um ponto projetivo na reta por sua classe de equivalência  $[a, b]$  induzida pelo ponto euclidiano  $(a, b)$ .

Em termos de algebra linear, cada uma dessas classes de equivalência é um subespaço de dimensão 1 do  $\mathbb{R}^2$ .

Assim, estamos fazendo uma correspondência entre um ponto projetivo e uma reta que passa pela origem do  $\mathbb{R}^2$ .

Note que, em termos de coordenadas, só estamos interessados na razão entre as coordenadas de um ponto euclidiano (exceto quando uma delas é zero, o que é fácil de lidar).

**Exemplo 3.** De acordo com a nossa definição, os pontos projetivos  $[1, 0]$ ,  $[0, 1]$ ,  $[1, 1]$  e  $[2, 1]$  correspondem respectivamente ao eixo  $x$ , ao eixo  $y$ , à reta  $y = x$  e à reta  $y = \frac{1}{2}x$  do plano euclidiano.

(inserir desenho)

**Definição 4.2** (Reta Projetiva). Definimos a reta projetiva como o conjunto de todos os pontos projetivos como definidos acima e a denotaremos por  $\mathbb{P}(\mathbb{R})$ .

Mas por que chamamos esse conjunto de "reta"? Uma maneira de responder essa pergunta é tomando uma reta  $r$  arbitrária (que não passa pela origem) do plano euclidiano e considerando as suas interseções com o feixe de retas que passa pela origem. Isso nos faz escolher um representante para cada ponto projetivo, com exceção do ponto correspondente à reta paralela a  $r$ , que denotaremos por ponto do infinito.

(inserir desenho)

Dessa forma, se tomarmos  $r$  como sendo a reta de equação  $y = 1$ , podemos escrever

#### 4. Reta Projetiva

$$\mathbb{P}(\mathbb{R}) = \{[x, 1] \mid x \in \mathbb{R}\} \cup [1, 0]$$

Veja que essa definição de ponto do infinito é compatível àquela dada na primeira parte deste livro.



## **5. Plano Projetivo**

## **6. Projeções e Projetividades**

## **7. Cônicas e Polaridades**

## Bibliografia

- [1] Luciano Guimarães Monteiro de Castro. “Introdução à Geometria Projetiva”. Em: *Eureka!* 8 (2000), pp. 16–27. URL: <https://www.obm.org.br/content/uploads/2017/01/eureka8.pdf>.