

## CHAPTER 2 随机变量

ZEYU XIE<sup>1</sup>

[1]

### 1. 随机变量

**Definition 1** (随机变量). 设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为概率空间,  $\xi = \xi(\omega) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , 若

$$(1) \quad \{\omega : \xi(\omega) < x\} \in \mathcal{F}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

则称  $\xi$  为随机变量

注:  $\xi(\omega)$  可简写为  $\xi$ ,  $\xi(\omega) < x$  可简写为  $\xi < x$

随机变量的逆变换有如下性质

**Proposition 1.** 设  $\xi$  为随机变量, 其逆变换为  $\xi^{-1}$ , 则

$$(a) \quad \xi^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega$$

$$(b) \quad \forall B \subseteq C \Rightarrow \xi^{-1}(B) \subseteq \xi^{-1}(C)$$

$$(c) \quad \xi^{-1}(\overline{B}) = \overline{\xi^{-1}(B)}$$

(d)  $\xi$  的 Borel 函数仍为随机变量

**Proposition 2** (随机变量的结构). (a)  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  中  $E \in \mathcal{F}$  的示性函数  $\mathbb{1}_E(\omega)$  为随机变量

(b) 设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为 R.V.  $\Leftrightarrow \exists$  简单随机变量列  $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$  s.t.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega), \forall \omega \in \Omega$  (此处极限为逐点收敛)

### 2. 随机分布 (分布)

**Definition 2** (分布).  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为概率空间,  $\mathbb{F}(B) = P\{\xi^{-1}(B)\} = P\{\xi \in B\}, \forall B \in \mathcal{B}$ , 则  $\mathbb{F}$  为一个概率测度, 称作  $\xi$  的概率分布

$\mathbb{F}$  刻画了  $\xi$  的分布规律

**Definition 3** (相空间).  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mathbb{F})$  为  $\xi$  的相空间,  $\mathbb{F}$  与  $\xi$  有关

**Definition 4** (分布函数).  $F(x) = \mathbb{F}((-\infty, x]) = P\{\xi \leq x\}, \forall x \in \mathbb{R}$ , 称  $F(x)$  为  $\xi$  的分布函数

---

<sup>1</sup> DEPARTMENT OF MATHEMATICS, TSINGHUA UNIVERSITY, BEIJING, CHINA.

E-mail address: xie.zeyu20@gmail.com.

Date: 2024 年 4 月 15 日.

分布函数具有以下性质

**Proposition 3.** (a)  $F(x)$  单调不减, 即  $x_1 \leq x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$

(b)  $F(x)$  左连续, 即  $x_0 \in \mathbb{R} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} F(x) = F(x_0)$

(c)  $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

**Definition 5** (离散型).  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为概率空间,  $\xi$  为随机变量, 若  $\exists \{x_k\}, \{p_k\}$  使得

$$(2) \quad p_k \geq 0, \sum_k p_k = 1, P\{\xi = x_k\} = p_k, \forall k$$

则称  $\xi$  为离散型随机变量, 其密度阵

$$(3) \quad \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix}$$

**Definition 6** (连续型).  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为概率空间,  $\xi$  为随机变量, 若  $\exists p(x)$  使得

$$(4) \quad p(x) \geq 0, \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1, P\{\xi = a\} = 0, \forall a$$

则称  $\xi$  为连续型随机变量, 其密度函数为  $p(x)$

不管是什么类型的随机变量, 我们都有

**Proposition 4** (Lebesgue 分解). 任意分布函数  $F(x)$  可分解为

$$(5) \quad F(x) = c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x) + c_3 F_3(x)$$

其中  $F_1(x)$  为纯条约分布函数,  $F_2(x)$  为连续型分布函数,  $F_3(x)$  为奇异分布函数

### 3. 一些典型分布

#### 3.1. 二项分布. $\xi \sim B(n, p)$

**Definition 7** (二项分布). 设  $n$  次独立重复试验, 每次试验成功的概率为  $p$ , 失败的概率为  $1-p$ , 则  $\xi$  为成功次数,  $\xi \sim B(n, p)$

**Proposition 5** (二项分布的分布函数).

$$(6) \quad P\{\xi = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

#### 3.2. 几何分布. $\xi \sim G(p)$

**Definition 8** (几何分布). 设独立重复试验, 每次试验成功的概率为  $p$ , 失败的概率为  $1-p$ , 则  $\xi$  为第一次成功所需的试验次数,  $\xi \sim G(p)$

**Proposition 6** (几何分布的分布函数).

$$(7) \quad P\{\xi = k\} = (1-p)^{k-1} p$$

3.3. Pascal 分布 (负二项分布).  $\xi \sim F(n, p)$ 

**Definition 9** (Pascal 分布). 设独立重复试验, 每次试验成功的概率为  $p$ , 失败的概率为  $1 - p$ , 则  $\xi$  为第  $n$  次成功所需的试验次数,  $\xi \sim F(n, p)$

**Proposition 7** (Pascal 分布的分布函数).

$$(8) \quad P\{\xi = k\} = \binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}$$

3.4. Poisson 分布.  $\xi \sim P(\lambda)$ 

**Definition 10** (Poisson 分布). 设独立重复试验, 每次试验成功的概率为  $\lambda/n$ , 失败的概率为  $1 - \lambda/n$ , 则  $\xi$  为成功次数,  $\xi \sim P(\lambda)$

**Proposition 8** (Poisson 分布的分布函数).

$$(9) \quad P\{\xi = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

3.5. 正态分布.  $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$ 

**Definition 11** (正态分布). 设  $\xi$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ , 则其密度函数为

$$(10) \quad p(\xi) = \varphi_{\mu, \sigma}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\xi-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

**Proposition 9** (正态分布的分布函数).

$$(11) \quad F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

3.6. Gamma 分布.  $\xi \sim \Gamma(\lambda, r)$ 

**Definition 12** (Gamma 分布). 设  $\xi$  服从 Gamma 分布  $\Gamma(\lambda, r)$ , 其中  $\lambda > 0, r > 0$ , 则其密度函数为

$$(12) \quad p(\xi) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} \xi^{r-1} e^{-\lambda\xi}$$

**Proposition 10** (Gamma 分布的分布函数).

$$(13) \quad F(x) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} \int_0^x t^{r-1} e^{-\lambda t} dt$$


3.7. 指数分布. Gamma 分布中  $r = 1$  的情形,  $\xi \sim E(\lambda)$ 

**Definition 13** (指数分布). 设  $\xi$  服从指数分布  $E(\lambda)$ , 则其密度函数为

$$(14) \quad p(\xi) = \lambda e^{-\lambda\xi}$$

**Proposition 11** (指数分布的分布函数).

$$(15) \quad F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt$$



连续型:

正态分布  $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$

Gamma 分布  $\xi \sim \Gamma(\lambda, r)$  (一般)

指数分布  $\xi \sim \Gamma(\lambda, 1)$  (特殊)

无记忆性:  $P\{\xi > s+t | \xi > s\} = P\{\xi > t\} \quad (s, t > 0)$

图 1. 各种分布的关系

### 3.8. 各种分布的关系.

## 4. 多维概率分布

### REFERENCES

- [1] 杨振明. 概率论 (第二版). 北京: 科学出版社, 2007.